40219/B

Pharmacopoeia — Lille

Different t.p. with price included
Woodcut headpiece to dedication (re set)
Last (blank) leaf wanting

1) PHARMACOPOEIAS, Lille

2) PHARMACOPOEIAS, France, Hospitals

PHARMACOPŒA

INSULENSIS.


PHARMACOPŒA
JUSSU
SENATUS
INSULENSIS

TERTIO EDITA.

Prix 9 liv. cartonné.

INSULIS FLANDRORUM,
Typis J. B. HENRY.

M. DCC. LXXII.



NOBILISSIMO AMPLISSIMOQUE URBIS INSULENSIS SENATUI.

QUAM provida sit vestra, NOBILISSIMI AMPLISSIMIQUE DOMINI in promovendâ publicâ hujusce civitatis salutecura, vel sola nostra res medica loquitur abunde: Collegium namque nostrum opus vestrum est, vestrisque faustis auspiciis non minori laude quam fructu studia Anatomica vigent & Botanica florent. Novum addidistis summi hujus studii vestri documentum, dùm

omnibus Pharmacopææ hujus urbis, jussu vestro olim editæ, exhaustis exemplaribus, de novâ editione ageretur: toti huic negotio animum non modo dedistis, sed auctoritate vestrâ illud sustentastis, & ad exoptatam maturitatem deduxistis. Crescet inde & medentium certitudo & ægrotantium solamen: rem promovebunt experti omnes civitatis nostræ in Pharmaciâ Magistri, & vestris pro utilitate publicâ curis planè respondebunt. In nostris nunc est votis, NOBILISSIMI, AMPLISSIMIQUE DOMINI, ut quam sub vestris auspiciis exaravimus oppellam, quam jussu vestro, Medici rerum Pharmaceuticarum scientissimi, & Pharmacopæi solertissimi, pro rei necessitate emendarunt rescinderunt & amplificarunt, faventer amplectimini & contra omnes malevolos tueri dignemini.

Ita vovent,

JOANNES-BAPTISTA LESTIBOUDOIS, Medicus, Botanices Professor, à Senatu delegatus.

PETRUS-JOSEPHUS RICQUET, Medicus, à Senatoribus collegii Medicorum pro tempore Assessor.

CATALOGUS

Medicorum Collegii Insulensis, 3ª. die Aprilis 1771.

Petrus-Josephus BOUCHER.
Claudius DIRAT.
Petrus-Antonius-Josephus CARBONNELLE.
Josephus-Servatius VANGRAEFSCEPE DE CYSSAU.
Jacobus-Antonius DEHENNE.
Andreas-Vesien DESOMBRAGES.
Joannes-Baptista LESTIBOUDOIS.
Jacobus-Josephus FAUVEL.
Petrus-Josephus RICQUET.
Elegius-Franciscus DUTEL.
Nicolaus-Josephus SALADIN.
Philippus-Josephus MERLIN.
Joannes-Laurentius DAMBROISE.
Ludovicus-Augustus DE HENNION
Paulus-Josephus MARTIN.
Antonius-Franciscus DESMILLEVILLE.
Leo-Angelus-Franciscus CORROYEZ.
Franciscus-Josephus SIFFLET.
Jocobus-Philippus-Annulphius SALMON.
Franciscus-Josephus LEROUX.
Ludovicus-Franciscus-Ernestus SAVARIN.
Constantius-Fidelis COPLO.

RATIO OPERIS.

PHARMACOPŒA INSULENSIS anno 1640, primùm in-4.° edita, anno 1694, Typis iterùm mandata fuit in-folio, & jam dudum editionis hujus penitùs exhaustæ nulla prostabant exemplaria.

ALIUNDE, remedia olim quidem usitata, at nunc obsoleta, in officinis asservare tenebantur hujus urbis Pharmacopœi, qui plurium & laude dignorum à Medicis neoreticis inventorum remediorum formulas desiderabant.

AD hæc, detecta nova in Naturali Historiâ, ars Galenica feliciter hodiè reformata, inventa nostri sæculi in arte Chymicâ, & applicatio horum omnium ad materiam Medicam, causæ erant cur à Medicis & Pharmacopœis, non modo hujus urbis, sed & totius provinciæ, exoptaretur hæc tertia Pharmacopœæ nostræ Editio.

HUJUS operis utilitas, necessitas, viros materiæ Medicæ studiosos, theoricâ ac practicâ Pharmaceutice peritos, medicamenta in curandis hujus provinciæ morbis expertos, exigebant.

CLAM & confidenter Domini LESTIBOUDOIS & RICQUET, Medici hujus urbis operi nisus suos adhibuerunt, & manuscriptum novæ Pharmacopœæ codicem SENATUI mense augusto anni 1770 obtulerunt; sed candidè assensi sunt aliqua in hoc opere esse mutanda, emendanda, addenda.

NOS autem à SENATU delegati, hoc diù scrutati sumus mutantes, rescindentes & addentes, maximè curando ut

& civibus utilem & SENATU noſtro dignam concinnaremus Pharmacopœam.

AT viribus noſtris non confidentes, non modo à Pharmacopœis à SENATU deſignatis nova quædam remedia præparari curavimus, ut certior formularum ratio evaderet; ſed cum cæteris Collegis noſtris pluries communicavimus, & non ſine fructu.

TANDEM, ſic redactum opus, auſpicium SENATUS AMPLISSIMI & civium benevolentiam mereri credimus.

PETRUS-JOSEPHUS BOUCHER, collegii Medicorum Decanus, urbis Scabinus, è Regiâ Scientiarum Academiâ Pariſienſis, Academiæ Regiæ Chirurgicæ Socius, Anatomes & Chirurgiæ Profeſſor à Senatu delegatus.

PETRUS-ANTONIUS-JOSEPHUS CARBONNELLE, collegii Medicorum à Senatoribus pro tempore Aſſeſſor, & curiæ Pharmacopœorum Præfectus.

NICOLAUS-JOSEPHUS SALADIN, collegii Medicorum Syndicus, Matheſeos Profeſſor à Senatoribus delegatus.

PAULUS-JOSEPHUS MARTIN, à Senatoribus collegii Medicorum pro tempore Aſſeſſor.

ADJUNCTI erant Pharmacopœi,

ANTONIUS-SIMON GHESQUIERE, Decanus.

PETRUS-FRANCISCUS DE BRIGODE, Inſpector & Juratus antiquior.

LUDOVICUS-JOSEPHUS DECROIX.

PETRUS-JOSEPHUS BOUDIN.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT DU LIBRAIRE.

LE retard de la publication de cet Ouvrage, eſt dû à des cauſes dont le détail intéreſſeroit peu le Public. La multiplicité des *remaniemens*, pour parler le langage de l'Art Typographique, les contradictions qu'ont éprouvées les premières copies des Auteurs, les additions fréquentes qu'on y a faites, ſont les principales raiſons qui ont empêché la Pharmacopée de paroître dans le temps déterminé par la Souſcription. Si le Public cependant a ſouffert de ces retards, il y gagne ſûrement du côté de l'Ouvrage, qui revu par des perſonnes choiſies dans le Corps de MM. les Médecins de cette Ville, a dû acquérir un nouveau degré de mérite en paſſant par leurs mains. Comme nous ſommes comptables envers le Public, & que tout ce qui pourroit altérer la confiance qu'il doit avoir en nous, eſt de conſéquence dans un moment ſur-tout, où nous ouvrons une Souſcription pour le *Recueil d'Arrêts du Parlement de Flandres*, nous ne pouvons pas laiſſer ignorer que quelques gens en place, ont paru deſirer que nous faſſions paſſer à MM. DE JUSSIEU & MACQUER, de l'Académie des Sciences, une copie imprimée de la Pharmacopée, avant de la rendre publique. Le ſuffrage de deux hommes auſſi célèbres doit donner à cet Ouvrage toute l'authenticité qu'il mérite, & y mettre le ſceau de l'utilité que s'efforceroient en vain de rompre les gens mal-intentionnés. On trouvera ici la partie de leurs Lettres que l'on peut publier; quant à leurs Obſervations, on a cru devoir les conſerver en entier; tout ce qui vient de pareilles mains eſt toujours précieux.

Il ne nous reſte qu'à rendre compte au Public des ſoins que s'eſt donné M. SALADIN, Médecin, qui a veillé à l'impreſſion de cet Ouvrage; on lui doit d'autant plus de reconnoiſſance qu'il lui a fallu un travail ſuivi pour combiner les différentes corrections qu'on lui a fait paſſer, & ſuivre la meilleure route.

OBSERVATIONS

Sur la Pharmacopée de Lille, par M. DE JUSSIEU, *de l'Académie des Sciences, Médecin de la Faculté de Paris, Démonſtrateur des Plantes au Jardin du Roi, & de la Société Royale de Londres, &c.* (a)

Page 18, *au mot* Anacardium.

LINNÆUS a eu tort de citer l'*Anacardium orientale*, comme ſynonyme de ſon *Bontia germinans*. Ce ſont deux plantes très-différentes. Il faut ſupprimer ici la dernière phraſe.

Page 20, *au mot* Aniſum.

La *Badiane* ou *Anis* étoilé de la Chine, eſt citée dans le *Species* de LINNÆUS, ſous le nom de *Illicium Aniſum*. Sp. ed. 2, p. 664.

Page 29, *au mot* Benzoïnum.

Ce n'eſt pas le *Laurus Benzoin* qui fournit la vraie *Réſine* de Benjoin. Nous ne connoiſſons point encore l'Arbre d'où elle découle; cet Arbre ne croît que dans les Indes Orientales. Le *Laurus Benzoin* ne vient que dans la Virginie & autres pays d'Amérique; ſes feuilles froiſſées ont une odeur approchante de celle du *Benjoin*, ce qui avoit fait croire à BOERHAVE que c'étoit le vrai *Benjoin*.

Page 40, *au mot* Catechu.

C'eſt ſur le témoignage de M. ALBERT, Chirurgien-Major de Pon-

---

[a] *Copie de la Lettre de M.* DE JUSSIEU *à J. B.* HENRY.

M.

. . . .
J'aurois deſiré pouvoir vous renvoyer tout de ſuite........ la Pharmacopée de Lille, que vous m'aviez fait remettre par M......., pour l'examiner & vous faire part de mes obſervations. Je n'y ai trouvé que peu de choſes à changer dans les citations des phraſes Botaniques, & j'ai eu ſoin de les noter à la marge. Cet Ouvrage me paroît bien fait, bien préſenté, & propre à remplir ſon objet. La ſuite qui traitera des Compoſitions, demande beaucoup de préciſion, & doit être ſoumiſe à la critique des Gens de l'Art. C'eſt à eux qu'il faudra vous adreſſer pour avoir un jugement ſûr. Mes avis ne peuvent être reçus que ſur les articles qui traitent de Botanique ou d'Hiſtoire naturelle.......... J'apprendrai avec plaiſir la réuſſite de votre Ouvrage, parce que je m'intéreſſe à tout ce qui contribue à l'utilité publique............
J'ai l'honneur d'être....... DE JUSSIEU.

tichery, que l'on avoit avancé que le *Cachou* étoit tiré du fruit de l'*Areque*, mais des notions plus exactes, fournies par M. DUPLEIX, certifient que cette substance est une fécule que l'on retire d'un Arbre nommé *Cat-ché*.

Page 55, *au mot* Eruca Sylvestris.

Le *Sinapi Erucæ folio P.* est bien le *Sisymbrium tenuifolium* LINN. Ainsi on peut supprimer l'interrogation. TOURNEFORT les avoit regardé comme différens, mais LINNÆUS & VAILLANT les confondent.

Page 66, *au mot* Hermodactylus.

L'*Hermodactylus folio quadrangulo. T.* n'est point le vrai *Hermodacte* des boutiques. La plante qui fournit ce dernier, n'est point ou peu connue. Par son Bulbe elle paroît être une espèce de *Colchique*, du moins elle ressemble beaucoup au Bulbe du *Colchique* ordinaire.

Page 68, *au mot* Hypocistis.

LINNÆUS dans son *Nov. Systema*, a séparé l'*Hypociste* du genre de l'*Asarum*, dont il différe en effet beaucoup. Il en a fait un genre particulier sous le nom de *Cytinus Hypocistis*.

Page 69, *au mot* Ipecacuanha.

Il n'est par sûr que l'*Ipecacuanha* que nous employons, soit celui que PISON indique. Nous savons seulement que le nôtre est la racine d'une espèce de *Violette*, qui croît en divers lieux de l'Amérique, & en particulier à Cayenne, où BARRERE la cite.

Page 97, *au mot* Rhabarbarum.

La vraie *Rhubarbe* de la Chine, est le *Rheum palmatum.* LINN. & non celle qui est citée ici.

Page 100, *au mot* Sagu.

Le *Cycas circinalis* est un Arbre très-différent de celui qui fournit le *Sagou*. Ce dernier est cité & figuré dans l'*Herbarium amboinense*, *tom.* 1, *p.* 72, *t.* 17. sous le nom de *Sagus seu Palma farinaria*. On y parle très-au long de ses usages & de la manière de retirer le *Sagou*. Les Habitans d'Amboine le nomme *Sagoë*. Il est aussi figuré dans *Seba*, *tom.* 1, *t.* 25.

Page 102, *au mot* Sanguis.

Le *Draco arbor Clus.* qui fournit le vrai *Sang-Dragon* des Canaries, est nommé dans le *Novum Systema Linnæi*, *Drakæna Draco*. Le *Sang-*

Dragon des Indes, qui eſt en larmes, vient de l'Arbre nommé dans KÆMPFER *Dsjerenang*, qui paroît être un eſpèce de *Calamus*, ſelon le caractère de LINNÆUS.

Page 108, *au mot* Simarouba.

Il faut ſupprimer ici la citation de *Burſera gummifera*: c'eſt un Arbre très-différent du vrai *Simarouba*, qui fait un genre à part. Il n'eſt pas encore décrit, mais on connoît ſon caractère, & il ſera publié dans la ſuite des Plantes de Cayenne, qui doit paroître bientôt.

Page 110, *au mot* Styrax.

On a cru juſqu'à préſent que le *Storax calamite* ſe retiroit du *Styrax folio Mali Cotonei*, parce qu'on avoit trouvé ſur cet Arbre quelques grains d'une réſine analogue: mais il eſt conſtaté que le *Storax* découle du *Liquidambar* oriental, dont parle M. DUHAMEL dans ſon traité des Arbres & Arbuſtes.

Page idem, *au mot* Tacamahaca.

Ce n'eſt point l'eſpèce de Peuplier appellé *Tacamahaca*, qui fournit la Gomme de *Tacamahaca*. L'Arbre d'où elle découle, croît dans les Indes Orientales, & nous eſt abſolument inconnu.

OBSERVATIONS

Sur la Pharmacopée de Lille, par M. MACQUER, Médecin de la Faculté de Paris, de l'Académie Royale des Sciences de Paris, de Suéde, de la Société Royale de Londres & de Thurin, &c. (a)

Page 164, Gummi purificatio.

CEs fortes d'évaporations doivent fe faire à feu très-doux, & pour le mieux au bain-marie.

Page 165, Ari Fecula.

Il eft bon que dans les Pharmacies il y ait de ces fécules lavées, & non lavées.

Page 166, Catechu purificatio.

Même obfervation que pour le procédé de la purification des Gommes Réfines.

Page 169, Purificatio Nitri.

Le *Nitre* ne fe criftallife à proprement parler que par refroidiffement, & par cette raifon il ne forme point de pellicule, qui n'eft due qu'à la cryftallifation par évaporation. Le vrai moyen de reconnoître fi une diffolution de *Nitre* eft au point de cryftallifation lorfqu'elle eft chaude, c'eft d'en faire refroidir promptement une petite quantité.

Le *Nitre* de la troifième cuite, tel qu'il eft demandé dans le procédé, ne peut fournir qu'une quantité infiniment petite d'eau-mère.

Page 170, Seri Lactis præparatio.

Le petit *Lait* fe clarifie beaucoup mieux en lui faifant prendre quel-

[a] *Copie de la Lettre de M. MACQUER à J. B. HENRY.*

M.

. . . .

. . . .

J'ai revu avec tout le foin & toute l'attention dont je fuis capable, la partie Chymique de la nouvelle Pharmacopée qu'on fe propofe de publier inceffamment. Je puis vous dire, fans flatterie, MONSIEUR, que cet Ouvrage m'a paru en général très-bien fait, & que je regarderois comme une grande injuftice, de ne pas ratifier bien fincèrement le jugement avantageux & équitable qu'en a déjà porté le célébre M. DE JUSSIEU; j'ai mis comme lui mes obfervations à la marge; elles ne font pas toutes également importantes; il y en a même qui le font fort peu. Le bien public étant le but du petit travail que j'ai fait à ce fujet, je me trouve affurément plus que récompenfé, fi je puis me flatter d'y avoir contribué par-là en quelque chofe.

J'ai l'honneur d'être........ MACQUER.

ques bouillons avec le blanc d'œuf: d'ailleurs l'ébullition ne cauſe aucune altération au petit *Lait*, & la quantité de crême de Tartre preſcrite ici, peut lui donner une ſaveur acide.

Page 170, Succorum defecatio.

Il n'y a guère que les Sucs acides ou très-aqueux qui puiſſent ſe clarifier ainſi d'eux-mêmes par réſidence, tous les autres ont beſoin, les uns d'un certain degré de chaleur, les autres de l'ébullition, & la plus part même avec le blanc d'œuf, ſans quoi ils ne paſſeroient point par le philtre, ou paſſeroient troubles.

Page 182, *ligne dernière.*

Mollioris, n'auroit-il pas été mieux que *liquidi*?

Page 184, Sal Kinæ-kinæ.

Il eſt bon de détacher cet extrait de deſſus les aſſiettes lorſqu'il eſt encore un peu chaud, à cauſe de la promptitude avec laquelle il s'humecte à l'air.

Page 196, Syrupus hordeatus.

Le Sirop d'*Orgeat* eſt plus agréable ſans décoction d'*Orge*.

Page 206, Canon II.

On bannit de plus en plus les Mortiers de cuivre ou de bronſe des bonnes Pharmacies, & on leur ſubſtitue ceux de marbre, de verre ou de fer, ſuivant la nature des ſubſtances qu'on a à piler.

Page 260, Spiritus Vini rectificatus.

L'épreuve de l'inflammation de la poudre par l'*eſprit de Vin*, eſt infidelle, car comme le meilleur *eſprit de Vin* fournit de ſon eau principe lorſqu'il eſt décompoſé par l'inflammation, il arrive que ſi l'on brûle ſur une petite quantité de poudre beaucoup d'*eſprit de Vin* le mieux rectifié, la poudre n'eſt point enflammée, tandis qu'au contraire un *eſprit de Vin* fort médiocre pourra enflammer la poudre, ſi l'on n'en met qu'une petite quantité ſur beaucoup de poudre.

Page 263, Spiritus Aceti.

Les premières portions de la liqueur qui montent à une chaleur douce, ſont à la vérité très-peu acides, mais ce ſont les plus ſuaves & les plus ſpiritueuſes. Le véritable acide du vinaigre monte enſuite, mais ce n'eſt qu'à un degré de chaleur plus fort, & tel que le vinaigre diſtillé

en contracte néceſſairement une odeur d'empyreume, qu'il paroît par cette raiſon preſque impoſſible d'éviter entièrement.

Page idem, Spiritus vitrioli.

Cette opération ne ſe pratique plus, depuis qu'on a trouvé le moyen d'obtenir l'acide vitriolique du *Soufre*, par un procédé beaucoup moins pénible, moins diſpendieux & moins embarraſſant.

Page 264, *ligne dernière.*

Si l'on veut obtenir de l'*Ether* bien pur, il faut avant cette rectification l'agiter avec un peu d'*Alkali* du *Tartre*, pour le débarraſſer d'un peu d'acide ſulfureux, dont il eſt rarement exempt, ce qui ſeroit un grand inconvénient pour la liqueur d'*Hoffmann*.

Page 265, Spiritus Nitri dulcificatus.

Pluſieurs bons Auteurs preſcrivent de diſtiller ce mélange, dans lequel on fait même entrer une plus grande quantité d'*eſprit de Vin*, & l'acide nitreux en eſt beaucoup plus dulcifié. D'ailleurs lorſque l'*eſprit de Nitre* n'a été ainſi dulcifié que par la ſimple digeſtion, il s'en dégage tant d'air, que tôt ou tard il fait caſſer les bouteilles dans leſquelles on le conſerve, & l'on évite cet inconvénient en le faiſant diſtiller.

Page 266, Spiritus Salis dulcificatus.

Même remarque que pour l'*eſprit de Nitre* dulcifié ci-deſſus, excepté pour le dégagement de l'air.

Page 268, *à la note*, *de* Spiritus Salis ammoniaci cum Calce.

Noms impropres, mais à la vérité uſités.

Page 274, Mercurius ſublimatus.

M. BEAUMÉ a reconnu par beaucoup d'expériences que le *Mercure doux*, ſublimé tant de fois qu'on voudra, n'en devient pas plus doux pour cela, parce que par ces ſublimations il ſe décompoſe toujours une portion de *Mercure doux*, qui devient Sublimé corroſif, d'où il ſuit que quand une fois le *Mercure doux* a été préparé par une ſeule ſublimation, le meilleur moyen de le rendre encore plus doux, c'eſt de le porphiriſer & de le laver, en verſant deſſus de l'eau bouillante, juſqu'à ce que cette eau n'ait plus de ſaveur métallique. L'effet de ce lavage eſt d'enlever une portion de Sublimé corroſif que contient toujours le *Mercure doux*. Ces lavages font prendre au *Mercure doux* une nuance un peu griſe : ſi l'on veut qu'il reſte très-blanc, il faut ajouter environ un gros de ſel *Ammoniac* dans l'eau du lavage, pour une livre de *Mer-*

cure

cure doux, & même plus ; ce Sel d'ailleurs ne change point l'état du *Mercure doux*. Voyez l'*Avant-Coureur*, année 1771.

Page 283, *ligne* 12.

Les *Alkalis* ne verdiſſent pas ſenſiblement la teinture de *Tourneſol*.

Page 288, Tartarum Emeticum.

Il eſt bon d'être prévenu que lorſque le verre d'*Antimoine* & la crême de *Tartre* ſont en poudre fine, l'efferveſcence qui ſe produit pendant leur combinaiſon, eſt ſi prompte & ſi grande, qu'une bonne partie du mêlange peut ſortir de la baſſine ſi elle eſt bien pleine.

Page 290, Sal mirabile Glauberi.

Ce procédé eſt très-incommode à cauſe des vapeurs de l'acide marin concentré : d'ailleurs ſi on veut le pratiquer, il eſt abſolument inutile que le *Sel marin* ſoit *décrépité*. Il ſemble qu'il auroit mieux valu preſcrire de combiner de l'acide vitriolique, juſqu'au point de ſaturation avec du *Sel de Soude* ; ou prendre le réſidu de quelque opération qui contint le *Sel de Glauber* tout fait, tel que le *caput mortuum* de la diſtillation de l'*eſprit de Sel*, par l'intermede de l'acide vitriolique, ou même la liqueur dont on a retiré le *Sel ſédatif*, par le procédé qui ſuit immédiatement celui-ci.

Page idem, Sal ſedativum.

Aucun acide ne fait la moindre efferveſcence avec le *Borax*, l'eſpéce de bouillonnement qu'on apperçoit lorſqu'on verſe de l'acide vitriolique concentré dans la diſſolution de ce *Sel*, ne dure qu'un inſtant, & n'eſt que l'effet de ſon mêlange avec l'eau, car il produit un ſemblable bouillonnement avec l'eau pure, & ce bouillonnement eſt très-différent d'une véritable efferveſcence : de plus, il faut une légère ſurabondance d'acide pour que le *Sel ſédatif* puiſſe ſe bien ſéparer & cryſtalliſer.

Page 299, Aqua Calcis.

Les eaux de *Chaux*, première & ſeconde, & même troiſième & quatrième, ſont auſſi fortes les unes que les autres ; ſi l'on veut de l'eau de *Chaux* plus foible, le vrai moyen c'eſt de mêler avec l'eau de *Chaux* ordinaire, la quantité d'eau commune qu'on juge à propos.

AUCTORES CITATI.

ACT. SCIENT. Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de Paris, in-4.
ADV. LOB. Math. de Lobel, Stirpium Adversaria nova, Antverpiæ, 1576, in-fol.
ARTED. Petri Artedi, Bibliotheca ichthyologica, Lugduni Batavorum 1738, in-8.
ALDROVAN. Ulisses Aldrovandus, Libri 7, de animalibus insectis, Bononiæ, 1638, in-fol.
BUFFON. Histoire naturelle, par M. de Buffon, Paris, 1769, in-12.
BOT. MONSP. Petri Magnol, Botanicum Monspeliense, Monspelii, 1686, in-8.
BREYN. Jacobi Breynii, Gedanensis Prodromus, Gedani, 1680 & 1689, in-4.
ejusdem Centuriæ Plantarum, Gedani, 1678, in-fol.
BOERH. Hermanni Boerhaavii, de Viribus Medicamentorum, Parisiis, 1740, in-12.
BRUNF. Othonis Brunfelsii, Herbarum vivæ Icones, Argentorati, 1530, in-fol.
BARRELIER. Plantæ per Hispaniam, Italiam & Galliam observatæ, *édidit. Anton. de Jussieu*, Parisiis, 1714, in-fol.
BRISS. Ornithologia à D. Brisson, Parisiis, 1740, in-4.
Le Regne animal, divisé en neuf classes, Paris, 1756, *par le même.*
BOMARE. Mineralogie, par M. Valmont de Bomare, Paris, 1762, in-8.
BEL. AQ. Petri Bellonii de Aquatilibus, Libri 2, Parisiis, 1553, in-8.
CÆSALP. Andreæ Cæsalpini, de Plantis, Libri 16, Florentinæ, 1583, in-4.
CAM. Joachimi Camerarii Hortus medicus, & phisosophicus, Francofurti, 1588, in.4.
Mathioli Epitome, Francofurti, 1586, in-4. *ejusdem.*
CATESB. Histoire naturelle de la Caroline, par Catesby, Londres, 1756, in-fol.
CLERCQ. Histoire naturelle de l'homme malade, par M. Clercq, Paris, 1768, in-8.
CLUS. Caroli Clusii, rariarum Plantarum Historia, Antverpiæ, 1601, in-fol.
De exoticis Libri 10, Anverpiæ, 1605, in-fol.
COMM. HORT. Caspari Commelini Horti Medici Amstelodamensis Descriptio, Amstelodami, 1697, & 1701, in-fol
CRANTZ INST. Institutiones Rhei herbariæ, auctore Crantz, Viennæ Austriæ, 1766, in-8.
CORD. IN DIOSC. Valerii Cordi in Dioscoridem Annotationes, Tiguri 1591, in-fol.
DAL. Samuelis Dalei Pharmacologia, Lugduni Batavorum, 1739.
DILL. Dillenii Historia Muscorum, Oxoniis, 1741, in-4.
DOD. Dononei Stirpium Historiæ Pemptades 6, Antverpiæ, 1616, in-fol.
FUCHS. Leonardi Fuchsii Historia Stirpium, Basileæ, 1542, in-fol.
FERMIN. Description de Surinam, par Philippe Fermin, Amsterdam, 1769, in-8.

GEOF. Stephani-Francisci Geoffroy, Tractatus de Materia Medica, Parisiis, 1741, in-8.

GEOF. PL. Vide. PL.

GESN. Conradi Gesneri Tigurini, historiæ Animalium Libri 5, Francofurti, 1503, in-fol.

GRON. J. F. Gronovii Flora virginica, Lugduni-Batav. 1739, in-8.

HERM. PARAD. Pauli Hermanni, Paradisus Batavus, Lugduni Batav. 1698, in-4.

HERN. MEX. Nova Plantarum Animalium & Mineralium Mexicanorum Historia Romæ, 1648 & 1651, in-fol.

HORT. LUG. BAT. Horti Academici Lugduno-batavi Catalogus Plantarum, Auctore P. Hermanno, 1687, in-8.

H. R. P. Hortus regius Parisiensis, Parisiis 1665, in-fol.

J. B. Joannis Bauhini Historia Plantarum universalis, Ebroduni, 1651, in-fol.

JONST. Jonston, Historia naturalis de quadrupedibus, Avibus, &c. Amstelodami, 1657, in-fol.

KÆMPF. Amœnitatum exoticarum, &c. Fasciculi. Lemgoviæ, 1712, in-4.

LAF. Mémoire sur le Gins-eng, par François Lafitau, Paris, 1728, in-12.

LIN. Linnæi, Specis Plantarum, editio 2, Holmiæ, 1763, in-8.
Linnæi Systema Naturæ, editio 12, Holmiæ, 1767, in-8.
Ejusdem Mantissa *ad calcem editionis* 12, *Systematis Naturæ.*
Linnæi Specimen materiæ Medicæ, Holmiæ, in-8.

LUGD. Historia generalis Plantarum, Lugduni, 1587, in-fol.

LISTER. M. Lister Historiæ Animalium Angliæ, Londini, 1678, in-4.

LOB. ICON. Mathiæ Lobelii Plantarum Icones, Antverpiæ, 1581, in-4. oblongo.

LOB. HIST. *Ejusdem* Historia Stirpium, Antverpiæ, 1576, in-fol.

MEAD. Richard Mead, Opera omnia, Paris, 1751, in-8.

MARCG. BRAS. Georgii Marcgravii, Historiæ rerum naturalium Brasiliæ Libri 8, *extant cum G. Pisonis Historiâ Brasiliæ.*

MATTH. Petri Andreæ Matthioli, Commentariiin Dioscoridem, Venetiis, 1565, in-fol.

MERIAN. Mariæ-Sybillæ Merian, Metamorphosis Insectorum Surinamentium, Amstelodami, 1705 & 1709, in-fol.

MICHEL. Petri Antonii Michelii, nova Plantarum Genera, Florentinæ, 1729, in-fol.

MONARD. Nicolai Monardes, de simplicibus Medicamentis ex occidentali Indiâ delatis, Antverp. 1574, in-8.

MORIS. Roberti Morison, Plantarum Historia universalis, Oxonii, 1680, in-fol. & Plantarum umbelliferarum Distributio nova, Oxonii, 1672, in-fol.

MUNTING. Abrahami Muntingii Phytographia curiosa, Amstelodami, 1727, in-fol.

P. Caspari Bauhini, Pinax Theatri Botanici, Basileæ, 1671, in-4.

PARK. Joannis Parkensonii, Theatrum Botanicum, Londini, 1649, in-fol. *ejusdem* Paradisus terrestris, Londini, 1629.

PIS. Guillelmi Pisonis Historia naturalis Brasiliæ, Amstelodami, 1658, in-fol.

PHYTANT. Joh. Wilh. Weinmanni Phytantozeiconographiæ, Ratisbonæ, 1737, in-fol.

POMET. Histoire générale des Drogues, Paris, 1735, in-4.

PROSP. ALP. Prosperi Alpini, de Plantis Ægypti, Venetiis, 1633, in-4.

PL. Description des Plantes & Animaux de la matière Médicale de M. Geoffroy, en 730 Planches, Paris, 1767, in-8.

PLUK. Leonardi Pluknetii Almagestum botanicum, Londini, 1696, in-4. *ejusdem* Almagesti Mantissa, Londini, 1700, in-fol.

PLUM. Plumerii nova Plantarum Americanarum Genera, Parisiis, 1703, in-4. *ejusdem*, Species Plantarum Americanarum, *cum priore extat. Ejusdem*, Icones per Burmannum, Amstelodami, 1755, in-fol.

RAJ. Joannis Ray, Synopsis methodica piscium, Londini, 1713, in-8. *ejusdem*, Synopsis methodica Stirpium britannicarum, Londini, 1724, in-8. *ejusdem*, Historia Plantarum, Londini, 1686, in-fol. *ejusdem*, Historia Insectorum, Londini, 1710, in-4.

REAUM. Mémoires pour servir à l'Histoire des Insectes, par M. de Reaumur, Paris, 1734, in-4.

RHEED. MAL. Hortus malabaricus, Amstelodami, 1678.

RUELLI. Joannis Ruelli de Naturâ Stirpium, Parisiis, 1536, in-fol.

RUMP. Georgii-Everardii Rumphii Herbarium Amboinense, Amstelodami, 1741, in-fol.

SEBA. Alberti Sebæ rerum naturalium Thesauri Descriptio, Amstelodami, 1735, in-fol.

SLOAN. Hans Sloane Catalogus Plantarum quæ in Jamaïcâ spontè proveniunt, Londini, 1696, in-8. *ejusdem*, Historia Plantarum Jamaïcentium, Londini, 1707, in-fol.

T. Josephi Piton de Tournefort Institutiones rei herbariæ, Parisiis, 1700, *cum Corollario.*

Voyage au Levant, par le même, Paris, 1717, in-4.

Histoire des Plantes qui naissent aux environs de Paris, par le même, Paris, 1725, in-12.

TABER. ICON. Jacobi Theodori Tabernemontani Icones Plantarum, Francofurti, 1590.

TRAG. Hieronimi Tragi de Stirpibus, Libri 3, Argentorati, 1552, in-4.

TREW. Christ. Jacobi Trewii, Plantarum selectarum Decuriæ, Norimbergæ, 1750, in-fol.

VAILL. Sebast. Vaillant, Botanicon Parisiense, Parisiis, 1747, in-fol.

WALL. MIN. Wallerii Mineralogia, Stockolm, 1747, in-8.

WILLIS. Thomæ Willis, Opera medica & physica, Lugduni, 1676, in-4.



PHARMACOPŒA
INSULENSIS.

PROŒMIUM.

ARS PHARMACOPŒA de Medicamentis tractat.

MEDICAMENTUM ſimplex eſt aut compoſitum. *Simplicia* à naturâ largiuntur ; *compoſita* verò à Pharmacopœo fabrefacta ſunt.

Tria naturæ, *Regna*, *Vegetabile*, ſcilicet, *Animale* & *Minerale*, tres Medicamentorum ſimplicium *Claſſes* conſtituunt.

Ars Medicamenta conficiendi GALENICA eſt vel CHYMICA. Prior Medicamentorum ſimplicium ſelectionem, præparationem & miſturam, poſterior eorum analyſim & ſyntheſim docet.

PARS PRIMA.

DE MEDICAMENTIS SIMPLICIBUS.

CLASSIS PRIMA.

DE SIMPLICIBUS È VEGETABILI REGNO.

BOTANICA, seu PHYTOLOGIA, Vegetabilium cognitionem tradit. Videant tyrones TOURNEFORTII & LINNÆI opera.

VEGETABILIA vel *Nostratia* sunt & *Indigena*, vel *Exotica* & è longinquis regionibus allata.

Dividuntur in *Arbores*, *Frutices*, *Suffrutices* & *Herbas*. Horum partes sunt *Radices*, *Cortices*, *Ligna*, *Folia*, *Flores*, *Fructus*, *Semina*, *Gummi*, *Resinæ*, *&c.*

GUMMI, inflammationis non capacia, in aquâ solâ sunt solubilia: RESINÆ verò, inflammabiles, in oleo & spiritu vini solvuntur.

Ut materiam medicam cognoscant faciliùs tyrones, methodicas divisiones, Tabularum synopticarum ope, adjicimus.

TABULA SYNOPTICA.

PLANTARUM EXOTICARUM PARTES.

1. RADICES,
Acori veri.
Anchusæ.
Angelicæ.
Aristolochiæ.
Behen.
Capparis.
Chinæ.
Contrayervæ.
Costi arabici.
Curcumæ.
Cyperi.
Dictamni albi.
Galangæ majoris.
Galangæ minoris.
Gentianæ.
Gen-seng.
Glycyrrhizæ.
Hermodactylorum.
Jalappæ.
Ipecacuanhæ.
Ireos florentinæ.
Mechoacannæ.
Pareyræ bravæ.
Pyrethri.
Rhabarbari.
Rhapontici.
Salab.
Sarsæparillæ.
Scillæ.
Senecæ.
Serpentariæ virginianæ.
Spicæ celticæ.
Spicæ indicæ.
Turbith.
Zedoariæ.
Zinziberis.

2. CORTICES,
Cascarillæ.
Cassiæ ligneæ.
Cassiæ caryophyllatæ.
Cinnamomi.
Costi indici.
Kinæ-Kinæ.
Simaroubæ.
Suberis.
Tamarisci.
Winterani.

3. LIGNA,
Aspalathi.
Aloës.
Guajaci.
Nephritici.
Rhodii.
Santalorum.
Sassafras.
Xylobalsami.

4. MEDULLÆ,
Sagu, &c.

5. CULMI,
Calami aromatici, &c.

6. FOLIA,
Apalachinæ.
Botryos.
Dictamni cretici.

Malabathri.
Sennæ.
Theæ.

7. FLORES,
Junci odorati.
Stœchadis arabicæ.

8. PISTILLA,
Croci.

9. SEMINA & GRANA,
Agni casti.
Ammeos.
Amomi racemosi.
Anisi.
Bamiæ moschatæ.
Cardamomi majoris.
Cardamomi minoris.
Carthami.
Carvi.
Cevadillæ.
Coriandri.
Cumini.
Dauci cretici.
Fœniculi dulcis.
Oryzæ.
Petroselini macedonici.
Sesami.
Seseleos massiliensis.
Staphidis agriæ.
Sementinæ.

10. FRUCTUS.
Amygdalæ.
Anacardium.
Badian.
Balanus myrepsica.
Cacao.
Coffea.
Capsicum.
Caryophylli aromatici.
Carpobalsamum.
Cassia fistulata.
Cocculi orientales.
Colocynthis.
Cubebæ.
Dactyli.
Fabæ indicæ.
Ficus siccæ.
Folliculi Sennæ.
Gossypium.
Granata.
Jujubæ.
Baccæ Lauri.
Baccæ Juniperi.
Macis.
Myrobalani.
Nuces Cupressi.
Nuces moschatæ.
Nuces vomicæ.
Olivæ.
Passulæ.
Pinei Nuclei.
Piper nigrum.
Macropiper.
Pistacia.
Ricinoïdes.
Sebesten.
Tamarindi.
Vanilla.

11. SUCCI,
LIQUIDI.
Vinum. *Acetum.*
Oleum Olivarum.
Oleum Palmarum.
CONCRETI.
Acacia vera.
Aloë.
Glycyrrhizæ Succus.
Hypocistis.
Manna.
Catechu.

Opium.
Scammonium.

12. BALSAMA.

Balsamum,
Canadense.
Copaïba.
Peruvianum nigrum.
Peruvianum album.
Tolutanum.
Judaïcum.

Liquidambar.
Terebinthina.

13. GUMMI.

Ammoniacum.
Arabicum.
Assa-fetida.
Euphorbium.
Galbanum.
Gutta Gamba.
Gummi Hederæ.
Opopanax.
Sagapenum.
Sarcocolla.
Tragacanthum.

14. RESINÆ.

Benzoïnum.
Caranna.
Colophonia.
Copal.
Elemi.
Guajaci.
Gummi Anime.
Lacca.
Sandaracha.
Sanguis Draconis.
Styrax calamita.
Styrax liquida.
Tacamahaca.
Thus.
Pix.

15. GUMMI RESINÆ.

Bdellium.
Mastiche.
Myrrha.
Labdanum.

16. SALIA.

ESSENTIALIA.
Saccharum.
Tartarum.

LIXIVIALIA.
Kali.

PLANTÆ INDIGENÆ.

1. MONOPETALÆ REGULARES.

DIANDRÆ, *seu staminib. duobus.*
Veronica.
Beccabunga.

TRIANDRÆ, *seu staminibus 3.*
Valeriana.

TETRANDRÆ, *seu staminib. 4.*
Gallium luteum.
Apparine.
Rubia tinctorum.
Cruciata.

PENTANDRÆ, *seu staminib. 5.*

MONOGYNÆ.

SEMINIBUS 4 *nudis.*
Lithospermum.
Cynoglossum.
Pulmonaria.
Symphytum.

Borrago.
Bugloſſum.

CAPSULA SUPRA RECEPTACULUM.

Menyanthes.
Cyclamen.

FRUCTU INFRA RECEPTACULUM.

Caprifolium.

BACCA SUPRA RECEPTACULUM.

Mandragora.
Alkekengi.
Solanum.
Dulcamara.
Frangula.
Rhamnus catharticus.

STAMINIBUS DECLINATIS.

Verbaſcum.
Stramonium.
Hyoſciamus.
Nicotiana.

DIGYNÆ, *ſeu piſtillis duobus.*

Aſclepias.
Gentiana.

TRIGYNÆ, *ſeu piſtillis 3.*

Sambucus.

OCTANDRÆ, *ſeu ſtaminib. 8.*

Thymelæa.
Mezereum.

DECANDRÆ, *ſeu ſtaminib. 10.*

Uva Urſi.
Lujula.

MONADELPHÆ, *ſeu piſtillo excipiente.*

Althæa.
Alcea.
Malva.

MONŒCÆ, *ſeu flor. maſculin. & femin. ſeparatìm in eâdem plantâ.*

Momordica.
Cucurbita.
Citrulus.
Melo.
Cucumer.
Bryonia.

2. LILIACEÆ.

TRIANDRÆ, *ſeu ſtaminibus 3.*

Iris noſtras.
Colchicum.

HEXANDRÆ, *ſeu ſtaminibus 6.*

HEXAPETALÆ, *ſeu petalis 6.*

SPATHACEÆ, *ſeu membranâ incluſæ.*

Allium.
Allioprаſum.
Cepa.
Porrum.

NUDÆ, *ſeu ſine ſpathâ.*

Lilium album.
Corona imperialis.
Aſparagus.

MONOPETALÆ.

Polygonatum.
Lilium convallium.

3. TETRADYNAMÆ, *ſeu Cruciatæ.*

SILICULOSÆ.

Lepidium.
Naſturtium hortenſe.
Burſa paſtoris.
Thlaſpi.
Cochlearia.
Raphanus ruſticanus.

SILIQUOSÆ.

Cardamine.
Naſturtium aquaticum.
Siſymbrium.
Sophia Chirurgorum.
Eruca.
Eryſimum.
Alliaria.

Barbarea.
Cheiri.
Braſſica rubra.
Napus.
Sinapi.
Glaſtum.

4. LEGUMINOSÆ, *ſeu Papilionaceæ.*

Geniſta.
Galega.
Anonis.
Lupinus.
Colutea.
Faba.
Cicer rubrum.
Lens.
Melilotus.
Orobus.
Fœnugræcum.

5. RINGENTES.

LABIATÆ, *ſeu Gymnoſpermæ.*

DIANDRÆ, *ſeu ſtaminibus* 2.

Verbena.
Roſmarinus.
Salvia.
Horminum.

TETRANDRÆ, *ſeu ſtaminib.* 4.

Bugula.
Polium montanum.
Chamædrys.
Marum.
Chamæpitys.
Satureïa.
Hyſſopus.
Nepeta.
Lavandula.
Scordium.
Betonica.
Sideritis.
Pulegium.
Mentha.
Hedera terreſtris.
Lamium.
Marrubium.
Cardiaca.
Origanum.
Majorana.
Thymus.
Serpillum.
Meliſſa.
Calamintha.
Ocymum.
Brunella.

PERSONATÆ, *ſeu Angioſpermæ.*

DIANDRÆ, *ſeu ſtaminibus* 2.

Gratiola.

TETRANDRÆ, *ſeu ſtaminib.* 4.

COROLLÆ CLAUSÆ.

Euphraſia.
Cymbalaria.
Linaria.

COROLLÆ PATENTES.

Scrophularia.
Digitalis.
Acanthus.

6. POLYPETALÆ REGULARES.

TETRAPETALÆ, *ſeu petalis* 4.

ACALYCINÆ, *ſeu ſine calyce.*

Clematitis.

CALYCE DIPHYLLO, *ſeu duob. foliis.*

Portulaca.
Papaver.

CALYCE TETRAPHYLLO, *ſeu foliis* 4.

Herba Paris.

PENTAPETALÆ, *ſeu petalis* 5.

ACALYCINÆ, *ſeu, ſine calyce.*

Nigella.

Phytolacca.
Helleborus niger.

Calyce monophyllo, *seu integro.*
Grossularia.
Castanea equina.
Caryophyllus ruber.
Behen nostras.
Saxifraga.
Saponaria.
Agrimonia.
Aurantium.
Citreum Malum.

Calyce pentaphyllo, *seu foliis 5.*
Linum.
Pyrola.
Sedum.
Anacampseros.
Spergula.
Ruta.
Tilia.
Pæonia.
Chelidonium minus.
Ranunculus bulbosus.
Geranium.
Hypericum.

Calyce involucro.
Eryngium.

Hexapetalæ, *seu petalis 6.*
Helleborus albus.
Salicaria.
Berberis.

Polypetalæ.
Hepatica nobilis.
Nymphæa alba.

7. ICOSANDRÆ. *Stamina calyci inserta.*

Monogynæ, *seu unico pistillo.*
Myrtus.
Prunus.
Armeniaca Malus.
Cerasus.

Digynæ, *seu duobus pistillis.*
Spina alba.

Pentagynæ, *seu pistillis 5.*
Mespillus.
Pyrus.
Poma.
Cydonium.
Ulmaria.

Polygynæ, *seu pistillis pluribus.*
Rosa.
Rubus.
Fragaria.
Pentaphyllum.
Argentina.
Caryophyllata.

8. UMBELLATÆ.

Involucro duplici.
Sanicula.
Daucus.
Meum.
Crithmum.
Levisticum.
Angelica.
Berula.

Involucro unico.
Chærophyllum.
Myrrhis odorata.

Involucro nullo.
Anethum.
Fœniculum.
Pimpinella alba.
Apium.
Petroselinum.

9. COMPOSITÆ.

Tubipetalæ, *seu Flosculosæ.*
Dipsacus.

Scabiosa.

Scabiosa.
Bardana.
Carduus.
Cinara.
Eupatorium cannabinum.
Conysa major.
Petasites.
Calcitrapa.
Cyanus.
Tanacetum.
Artemisia.
Abrotanum.
Dracunculus esculentus.
Absinthium.

PLANIPETALÆ, *seu Semi-flosculosæ.*

Scorzonera.
Sonchus.
Lactuca.
Dens Leonis.
Pilosella.
Endivia.
Cichorium.

RADIATÆ.

Carlina, *seu* Chamæleon albus.
Tussilago.
Senecio saracenicus.
Virga aurea major.
Enula campana.
Doronicum.
Helianthemum tuberosum.
Bellis.
Matricaria.
Chamæmelum.
Ptarmica Dracunculus.
Ageratum.
Millefolium.
Calendula.

10. APETALÆ, *seu petalo nullo.*

AMENTACEÆ, *seu julo instructæ.*

Betula.
Morus.
Quercus.
Juglans.
Castanea sativa.
Avellana.
Cupressus.
Salix.
Populus.
Sabina.

STAMINEÆ.

TETRANDRÆ, *seu staminibus 4.*
Alchimilla.

PENTANDRÆ, *seu staminibus 5.*
Herniaria.
Bonus Henricus.
Atriplex vulvaria.
Beta.

HEXANDRÆ, *seu staminibus 6.*
Acetosa hortensis.
Lapathum.

OCTANDRÆ, *seu staminibus 8.*
Polygonum.
Persicaria mitis.
Fagopyrum.
Bistorta.

DODECANDRÆ, *seu staminibus 12.*
Asarum.

MONŒCÆ, *seu flor. masculin. & femin. separatìm in eâdem plantâ.*
Lenticula.
Buxus.
Urtica.
Ricinus.
Parietaria.
Atriplex hortensis.

DIŒCÆ, *ſeu flor. maſcul. & femin. in plantis diverſis.*

- Viſcum.
- Myrtus brabantica.
- Cannabis.
- Lupulus.
- Mercurialis.
- Fraxinus.

11. ANOMALÆ, *ſeu Irregulares.*

MONOPETALÆ.

- Tithymalus Cataputia.
- Eſula.
- Ariſtolochia.
- Dracunculus major.

POLYPETALÆ.

- Naſturtium indicum.
- Dictamnus albus.
- Aconitum cæruleum.
- Anthora.
- Aquilegia.
- Fumaria.
- Viola.
- Satyrium.
- Orchis.

12. GRAMINEÆ.

- Gramen dactylon.
- Avena.
- Secale.
- Hordeum.
- Gramen loliaceum.
- Triticum hybernum.

13. CRYPTOGAMÆ, *ſeu fructificationes inconſpicuæ.*

ARBORES.

- Ficus.

HERBÆ.

FILICES.

- Equiſetum.
- Ophioglosſum.
- Filix.
- Ceterach.
- Lingua cervina.
- Adiantum.
- Polypodium.

MUSCI.

- Muſcus vulgaris.
- Adiantum aureum.

ALGÆ.

- Hepatica fontana.
- Lichen.
- Auricula Judæ.

FUNGI.

- Agaricus quernus.
- Crepitus Lupi.

ORDO VEGETABILIUM.

ABIES. *Le Sapin.* Pl. 80.

Abies conis sursùm spectantibus, sive mas. P. 505.
Abies Taxi folio, fructu sursùm spectante. T. 585.
Pinus Picea. Lin. Sp. 1420.

Ex Abiete colligitur in sylvis Tyrolis & Alsatiæ, Terebinthinæ species vulgò *de Vénise ou de Strasbourg* dicta. Est resina Mellis recentis consistentiæ, flavescens, acris, amaricans, odore non ingrata. Eligatur fragrans & translucens.

ABIES PICEA. *La Pesse.*

Abies tenuiore folio, fructu deorsùm inflexo. T. 585.
Pinus Abies. Lin. Sp. 1421.

Pix paratur ex Piceæ tædis accensis, ut & ex aliis arboribus resinosis, per senectutem nimiâ pinguedine strangulatis. *Vide Pinus Sylvestris.*

ABIES CANADENSIS. *Sapinette de Canada.*

Abies minor pectinatis foliis, conis parvis subrotundis. Pluk. Alm. 2.
Pinus balsamea. Lin. Sp. 1421.

Balsamum canadense ex Abiete canadensi fluit.

ABROTANUM MAS. *L'Aurone male. Pl.* 119.

Abrotanum mas angustifolium majus. P. 136. T. 459.
Artemisia Abrotanum. Lin. Sp. 1185.

Herba est in usu.

ABROTANUM FEMINA. *La Garderobe. Pl.* 120.

Abrotanum femina foliis teretibus. P. 136.
Santolina foliis teretibus. T. 459.
Santolina Chamæcyparissus. Lin. Sp. 1179.

Herba est in usu.

ABSINTHIUM MAJUS. *La grande Absinthe*. Pl. 121.

Absinthium vulgare majus. J. B. 3. 168.
Absinthium ponticum, seu romanum officinarum, seu Dioscorid. P. 138. T. 457.
Artemisia Absinthium. Lin. Sp. 1188.

ABSINTHIUM MINUS. *La petite Absinthe*. Pl. 122.

Absinthium ponticum tenuifolium incanum. P. 138. T. 457.
Artemisia pontica. Lin. Sp. 1187.

Herba est in usu.

ABSINTHIUM SANTONICUM. *Barbotine, ou poudre a vers*.

Absinthium Santonicum gallicum. P. 139. T. 458.
Semen sanctum. Lob. Icon. 756.
Semen Zedoariæ Belgarum. Adv. Lob. 337.
Artemisia Santonicum. Lin. Sp. 1185.

Reperitur in Galliâ Narbonensi. Est spurium Semen contra.

ACACIA VERA. *Le vrai Acacia*. Pl. 95.

Acacia ægyptiaca seu vera. Officinarum.
Acacia foliis Scorpioïdis leguminosæ. P. 392.
Acacia vera. J. B. 429. T. 605.
Mimosa nilotica. Lin. Sp. 1506.

Acacia est succus foris nigricans, rufescens intùs; acerbus, austerus & astringens. Eligendus non nimis nigricans nec friabilis; sed tenax atque in totum aquâ solubilis. In Ægypto è fructibus immaturis exprimitur, lento igne inspissatus atque induratus ad nos advehitur.

Verum Gummi arabicum, *La Gomme arabique*, vermiculatum est & vix ad nos adfertur. Post incisionem extillat ex Acacia vera. *Vide* Gummi senegalense.

ACACIA NOSTRAS. L'*Acacia de notre Pays*. Pl. 108.

Prunus sylvestris. P. 444. T. 623.
Prunus spinosa. Lin. Sp. 681.

Acacia nostras, seu Germanica officinarum est extractum è fructibus immaturis Pruni sylvestris, in Germaniâ elaboratum.

ACANTHUS. L'*Acanthe ou branche ursine*. Pl. 123.

Carduus Acanthus, seu Branca ursina. J. B. 3. 75.

Acanthus sativus, vel mollis Vergilii. P. 383. T. 176.
Acanthus mollis. LIN. SP. 891.

Folia in usu.

ACETOSA HORTENSIS. L'*Oseille ronde.* PL. 124.

Acetosa rotundifolia hortensis. P. 114. T. 503.
Rumex scutatus. LIN. SP. 480.

Folia, radices, semina in usu.

ACETOSA PRATENSIS. L'*Oseille longue.* PL. 124.

Oxalis vulgaris, folio longo. J. B. 2. 989.
Acetosa pratensis. P. 114. T. 502.
Rumex Acetosa. LIN. SP. 481.

Folia, radices, semina in usu.

ACONITUM CÆRULEUM. L'*Aconit.* PL. 398.

Aconitum cæruleum seu Napellus primus. P. 183. T. 425.
Aconitum Napellus. LIN. SP. 751.

Folia in usu.

ACORUS VERUS. *Le vrai Acore.* PL. 1.

Acorus verus, seu Calamus aromaticus officinarum. P. 34.
Acorus Calamus vulgaris. LIN. SP. 462.

Radix in usu.

ACORUS ADULTERINUS. *Le faux Acore.* PL. 1.

Acorus adulterinus. P. 34.
Iris palustris lutea. T. 360.
Iris Pseudo-Acorus. LIN. SP. 56.

Radix in usu.

ADIANTUM AMERICANUM. *Le Capillaire de Canada.* PL. 125.

Capillus Veneris canadensis. Officinarum.
Adiantum fruticosum brasilianum. P. 355.
Adiantum americanum, Cornuti. T. 543.
Adiantum pedatum. LIN. SP. 1557.

Herba in usu.

ADIANTUM VERUM. *Le Capillaire de Montpellier.* Pl. 125.

Capillus Veneris monſpeſſulanenſis. *Officinarum.*
Adiantum foliis Coriandri. P. 355. T. 543.
Adiantum Capillus Veneris. Lin. Sp. 1558.
Herba in uſu.

ADIANTUM ALBUM. *Le Capillaire blanc.* Pl. 127.

Filicula fontana major, ſive Adiantum album foliis Filicis. P. 358. T. 542.
Polypodium rhœticum. Lin. Sp. 1552.
Herba in uſu.

ADIANTUM NIGRUM. *Le Capillaire noir ou commun.* Pl. 126.

Adiantum foliis longioribus pulverulentis pediculo nigro. P. 355.
Filicula quæ Adiantum nigrum officinarum pinnulis obtuſioribus. T. 542.
Aſplenium Adiantum nigrum. Lin. Sp. 1541.

ADIANTUM POLYTRICHUM. *Le Polytric.* Pl. 128.

Trichomanes, ſive Polytrichum officinarum. P. 356. T. 539.
Aſplenium Trichomanes. Lin. Sp. 1540.
Herba in uſu.

ADIANTUM RUTA MURARIA. *La Sauve-vie.* Pl. 128.

Salvia vitæ. Officinarum.
Ruta muraria. P. 356. T. 541. Dod. 470.
Aſplenium Ruta muraria. Lin. Sp. 1541.
Herba in uſu.

ADIANTUM AUREUM. *La Perce-Mousse.* Pl. 129.

Polytrichum aureum majus. P. 356.
Muſcus capillaceus major pediculo & capitello craſſioribus. T. 550.
Polytrichum commune. Lin. Sp. 1573.
Herba in uſu.

AGARICUS. L'*Agaric.* Pl. 116.

Agaricus, ſive Fungus Laricis. P. 375. T. 562.
Boletus Abieti Laricis dictæ. Lin. Mat. Med. 497.

AGARICUS eſt excreſcentia arboris Laricis fungoſa, rotundo-anguloſa, & inæqualis. Ejus ſubſtantia interna candida eſt & friabilis; externa corticoſa, cinerea & ſubrufa; ſapor primò ſubdulcis, poſteà amaricans & acris. Sit fragilis, ſplendens, candidus & levis.

AGARICUS QUERNUS. L'*AGARIC DE CHÊNE.*

Agaricus pedis equini facie. T. 562.
Boletus igniarius. LIN. SP. 1645.

Fortiter malleo contuſus & præparatus, ad ſiſtendas hæmorrhagias inſervit.

AGERATUM. L'*EUPATOIRE DE MÉSUÉ.* PL. 130.

Ageratum foliis ſerratis. P. 221.
Ptarmica lutea ſuaveolens. T. 497.
Achillea Ageratum. LIN. SP. 1264.

Folia, flores, ſemina in uſu.

AGNUS CASTUS. L'*AGNUS CASTUS.* PL. 131.

Vitex foliis anguſtioribus, Cannabis modo diſpoſitis. P. 475. T. 603.
Vitex Agnus caſtus. LIN. SP. 890.

Ejus ſemina ſunt grana rotunda, Pipere minora, coloris cinerei, ſaporis ſubaſtringentis & acris.

AGRIMONIA. L'*AIGREMOINE.* PL. 132.

Eupatorium veterum, ſive Agrimonia. P. 321.
Agrimonia officinarum. T. 301.
Agrimonia Eupatoria. LIN. SP. 643.
Folia in uſu.

ALCEA. *LA MAUVE SAUVAGE.* PL. 133.

Alcea vulgaris major. P. 316. T. 97.
Malva Alcea. LIN. SP. 971.
Folia, radices in uſu.

ALCHIMILLA. *LE PIED DE LION.* PL. 134.
Pes Leonis, ſive Alchimilla. J. B. 2. 598.
Alchimilla vulgaris. P. 319. CLUS. *cvij.* T. 58. LIN. SP. 178.
Folia in uſu.

ALKEKENGI. L'*ALKEKENGE ou COQUERET*. PL. 135.

Solanum veſicarium. P. 166.
Alkekengi officinarum. T. 151.
Halicacabum veſicarium. CAM.
Phyſalis Alkekengi. LIN. SP. 262.

Fructus in uſu.

ALLIARIA, L'*ALLIAIRE*. PL. 135.

Alliaria. P. 110. DOD. 886. FUCHS. 104.
Heſperis Allium redolens. T. 222.
Eryſimum Alliaria. LIN. SP. 922.

Herba in uſu.

ALLIUM, L'*AIL*. PL. 136.

Allium ſativum. P. 73. T. 383. LIN. SP. 425.
Radices ſunt in uſu.

ALLIOPRASUM. *LA ROCAMBOLE*. PL. 137.

Allium ſativum alterum ſive Alliopraſum caulis ſummo circumvoluto. P. 73. T. 383.
Allium Scorodopraſum. LIN. SP. 425.
Radices ſunt in uſu.

ALNUS. L'*AUNE*. PL. 138.

Alnus rotundifolia glutinoſa viridis. P. 428. T. 587.
Betula Alnus. LIN. SP. 1394.
Folia, cortices ſunt in uſu.

ALOE SOCCOTRINA, L'*ALOES SUCCOTRIN*. PL. 102.

Aloë ſoccotrina anguſtifolia ſpinoſa flore purpureo. COM. HORT. AMST. *tom*. 1. *pag*. 91. T. 366.
Aloë perfoliata. LIN. SP. 457.

Eſt ſuccus plantæ in inſulâ Soccoterâ inſpiſſatus & indè aſportatus. Eligatur ALOE pura, lucida, coloris dùm teritur, crocei, ſaporis amari, & odoris non ingrati.

ALOE VULGARIS. L'*ALOES HÉPATIQUE*. PL. 103.

Aloë vulgaris. P. 286. T. 366. DOD. 359.

Aloë.

Aloë vera. LIN. SP. 458.

ALOE VULGARIS, seu HEPATICA, fusca foris, intùs hepatis instar flavescit: colligitur in Chinâ & indè advehitur.

ALOE CABALLINA, ab HEPATICA odore nauseoso myrrhato distingui potest. CABALLINA, etiam si multoties aquâ abluatur, rursùsque inspissetur, fetorem ex toto nunquàm amittit.

ALOE BARBADENSIS, in cucurbitis adfertur: SOCCOTRINA non inferior est. Colligitur in Barbados Americæ insulâ.

ALSINE MEDIA. *LA MORGELINE*. PL. 139.

Alsine vulgaris, sive Morsus Gallinæ. J. B. 3. 363.
Alsine media. P. 250. T. 242. LIN. SP. 389.

Herba in usu.

ALTHÆA, *LA GUIMAUVE*, PL. 140.

Althæa Dioscoridis & Plinii. P. 315. T. 97.
Althæa sive Bismalva. J. B. 2. 954.
Althæa Ibiscus. DOD. 655.
Althæa officinarum. LIN. SP. 966.

Tota planta in usu.

AMMI, L'*AMMI*.

Ammi verum officinarum. DAL. 140.
Ammi parvum, foliis fœniculi. P. 159.
Fœniculum annuum, Origani odore. T. 312.
Sison Ammi. LIN. SP. 363.

Semen ammeos est parvum, striatum, è rufo spadiceum, saporis aromatici & acris. Eligendum recens, maturum, saporis acris. Ex Alexandriâ Ægypti advehitur.

AMMONIACUM GUMMI, *LA GOMME AMMONIAC*.

Ammoniacum officinis & gummi Ammoniacum. P. 494.
Gummi Ammoniacum. PARK. 1544.

Est concretum gummosum & resinosum, è magnâ ferulaceâ plantâ Indiæ orientalis extillans, collectum. Eligendum est in granis, instar Olibani condensatum & ab arenâ aliisque quisquiliis liberum, odoris gravis, Castoreum cum Allio redolens, saporis amari, parùm acris, digito tractatum mollescens, exteriùs flavum & candidum intùs.

AMOMUM, L'*Amome*.

Amomum racemosum. P. 413.
Elettari primum. RHEED. MALAB. 11. p. 9. t. 5.

Est fructus siccus, racematim congestus, membranaceus, semina è nigro purpurea, angulosa, rugosa, aromatica, in capsulis pallidis, subovatis, trigonis, includens. Rarò ex Indiâ orientali racemos integros, aut capsulas integras accipimus. PIMENTA vocantur falsò AMOMUM.

AMYGDALUS, L'*Amandier doux*, PL. 141.

AMYGDALUS AMARA, L'*Amandier amer*. PL. 141.

Amygdalus sativa fructu majori. P. 442. T. 627.
Amygdalus sylvestris amara. P. 442. T. 627.
Amygdalus communis. LIN. SP. 677.

AMYGDALUS *arbor* unica reperitur, sed fructûs sapore, vel dulci vel amaro, differt. AMYGDALÆ majores, AMBROSINÆ dictæ, non rancidæ, nec vermiculosæ eligantur. Copiosè in Provinciâ, Occitaniâ & aliis calidis regionibus colitur.

ANACARDIUM, L'*Anacarde*. PL. 60.

Anacardium. P. 511.
Anacardium orientale. JONST. 156.
Œpata. RHEED. MAL. 4. p. 95. t. 45.
Bontia germinans. LIN. SP. 891.

ANACARDIUM OCCIDENTALE, L'*Acajou*. PL. 61.

Anacardii alia species. P. 512.
Anacardium occidentale. JONST. 156.
Arbor Acajou, vulgò Cajou. PISON. 193.
Anacardium occidentale. LIN. SP. 548.

ANACARDIUM est fructus nigricans arboris Indicæ. ANACARDIUM ORIENTALE compressi cordis figuram æmulatur, OCCIDENTALE reniforme est, & *Acajou* vocatur. Sub involucro duplici nucleum solidum albicantem, saporis subdulcis, condit. In involucri meditullio succus oleosus saporis acris & adurentis reperitur.

ANACAMPSEROS, L'*Orpin*, *ou la Reprise*, PL. 142.

Telephium vulgare. P. 287.
Anacampseros, vulgò Faba crassa. J. B. 3. 681. T. 264.

Sedum Telephium. LIN. SP. 616.

Herba in uſu.

ANAGALLIS, *LE MOURON*. PL. 144.

Anagallis flore phœniceo. P. 252. T. 142.
Anagallis mas. DOD. 32.
Anagallis arvenſis. LIN. SP. 211.

Herba in uſu.

ANCHUSA, L'*ORCANETTE*.

Anchuſa monſpeſſulanenſis. Officinarum.
Anchuſa puniceis floribus. P. 255.
Bugloſſum radice rubra, ſive Anchuſa vulgatior floribus cæruleis. T. 134.
Anchuſa tinctoria. LIN. SP. 192.

Radices ANCHUSÆ, ſeu *Alkannæ rubræ*, eligantur parvæ, fibroſæ, quæ purpureæ magis in totâ ſubſtantiâ ſunt; majores enim intùs albicant. Ex Galliæ provinciis & ex Oriente afferuntur.

ANETHUM, L'*ANETH*. PL. 145.

Anethum hortenſe. P. 147. T. 318.
Anethum graveolens. LIN. SP. 377.

Semina in uſu.

ANGELICA, L'*ANGELIQUE DE BOHEME*. PL. 2.

Angelica ſativa. P. 155.
Imperatoria ſativa. T. 317.
Angelica Archangelica. LIN. SP. 360.

Radices, folia, & ſemina in uſu.

ANIME GUMMI, *LA GOMME ANIMÉ*. PL. 82.

Arbor ſiliquoſa ex quâ Gummi Anime elicitur. P. 404.
Courbaril bifolia, fructu pyramidato. PLUM. GEN. 49.
Hymenæa Courbaril. LIN. SP. 537.

Eſt reſina arida, foris albida, intùs palleſcens, aliquatenus tranſlucens, friabilis, ſaporis terebinthinacei. Dùm accenditur odorem ſpargit ſuavem. Ex arbore Novæ Hiſpaniæ & Braſiliæ elicitur, & in fruſtis variæ magnitudinis advehitur.

ANISUM, L'*ANIS*. PL. 146.

Anisum herbariis. P. 159.
Anisum vulgare. DOD. 299.
Apium Anisum dictum, semine suaveolente majori. T. 305.
Pimpinella Anisum. LIN. SP. 379.

Eligenda semina, matura, majora, stipitibus libera, oblonge rotunda, striata, coloris viridiusculi, saporis dulcis & aromatici.

ANISUM INDICUM, L'*ANIS DE LA CHINE*. PL. 76.

Anisum peregrinum. P. 159.
Anisum stellatum, Badian. PHYTANT. N.° 138.
Evonymo affinis philippina Anisum spirans. PLUK. ALM. 140.
Badianifera. LIN. MAT. MED. 510.

Capsula seminalis ANISI INDICI est in usu: stellam fulvo fuscam, in singulo radio granum sæpius condentem, æmulatur. Sapor sit dulcis, Fœniculum & Anisum redolens: capsulæ vel radii sint majores, oleo & sapore prædivites.

ANONIS, L'*ARRÊTE-BŒUF*, *ou* *BUGRANDE*. PL. 147.

Anonis spinosa, flore purpureo. P. 389. T. 408.
Anonis sive Resta Bovis vulgaris purpurea. J. B. 2 395.
Ononis spinosa. LIN. SP. 1006.

Radices in usu.

ANTHORA, L'*ANTHORE*. PL. 3.

Aconitum salutiferum, sive Anthora. P. 184. T. 425.
Aconitum Anthora. LIN. SP. 751.

ANTHORÆ radices sunt bulbi Olivæ magnitudinis, fusci foris, intùs albi coloris. Eligendæ recentes, gustu amaræ, sapore acres, vermibus non exesæ nec cariosæ. In Alpibus & aliis Tirolis & Helvetiæ montibus nascuntur.

APALACHINE, L'*APALACHINE*, *ou* *THÉ DE LA MER DU SUD*.

Cassine vera Floridanorum arbuscula baccifera, Alaterni fermè facie, foliis alternatim sitis, tetrapyrene. CATESB. 57.
Cassine foliis lanceolatis, alternis, semper virentibus, floribus axillaribus. MILL. *t.* 83. *f.* 2.
Prinos glaber. LIN. SP. 471.

Folia APALACHINES intensivè sunt amara: eorum infusio absque

moleſtiâ vomitum ciet; ideò apud Americanos magni æſtimantur. Reperiuntur & in Africâ.

APPARINE, *LE GRATERON*, PL. 148.

Apparine vulgaris. P. 334. T. 114. DOD. 353.
Gallium Apparine. LIN. SP. 157.

Herba in uſu.

APIUM, L'*ACHE*. PL. 149.

Apium paluſtre & Apium officinarum. P. 154. T. 305.
Eleoſelinum. DOD. 695.
Apium graveolens. LIN. SP. 379.

Herba in uſu. *Vide APIUM DULCE.*

APIUM DULCE, *LE CELERI.*

Apium dulce, Celeri Italorum, H. R. P. T. 305.
Apium graveolens. LIN. SP. 379.

APIUM DULCE culturâ tantùm differt ab APIO PALUSTRI. Datur alia ſpecies Apii paluſtris ſed venenata, quæ *Sium alterum* à *DODONEO*, & *Cicuta aquatica* à *GESNERO* vocatur, à priori non niſi foliis anguſtioribus diſcrepans. Ne hanc cum officinali confundas ſecuriùs Apii dulcis radices in uſum vocabis.

AQUIFOLIUM, *LE HOUX*. PL. 150.

Ilex aculeata baccifera folio ſinuato. P. 425.
Aquifolium, ſive Agrifolium vulgò. J. B. 1. 114. T. 600.
Ilex Aquifolium. LIN. SP. 181.

Folia in uſu.

AQUILEGIA, L'*ANCOLIE*. PL. 151.

Aquilegia ſylveſtris. P. 144. T. 428.
Aquilegia vulgaris. LIN. SP. 752.

Semina in uſu.

GUMMI SENEGALENSE, *LA GOMME DU SÉNÉGAL.*

Acacia indica Farneſiana. RAJ. HIST. 977. T. 605.
Mimoſa Farneſiana. LIN. SP. 1506.

GUMMI SENEGALENSE cum GUMMI ARABICO virtutibus convenit.

Eligatur inſtar vitri pellucidum, purum & candidum. Nobis ex Guineâ advehitur.

ARGENTINA, L'*ARGENTINE*, PL. 152.

Potentilla. P. 321.
Argentina. DOD. 600.
Pentaphylloides argenteum alatum, *ſeu Potentilla*. T. 298.
Potentilla anſerina. LIN. SP. 710.

Herba in uſu.

ARISTOLOCHIA LONGA, L'*ARISTOLOCHE LONGUE*. PL. 4.

Ariſtolochia longa vera. P. 307. T. 162. LIN. SP. 1364.

Eligantur radices craſſiores, non carioſæ ſed ponderoſæ. In Hiſpaniæ, vinetis & dumetis creſcit.

ARISTOLOCHIA ROTUNDA, L'*ARISTOLOCHE RONDE*. PL. 4.

Ariſtolochia rotunda flore ex purpurâ nigro. P. 307. T. 162.
Ariſtolochia rotunda. LIN. SP. 1364.

Laudantur radices ponderoſæ, non carioſæ. Advehuntur ex Galliâ & Hiſpaniâ.

ARISTOLOCHIA CLEMATITIS, L'*ARISTOLOCHE DES VIGNES*; *ou SARAZINE*. PL. 5.

Ariſtolochia Clematitis recta. P. 307. T. 162. LIN. SP. 1364.
Ariſtolochia ſaraſenica. DOD. 326.

Eſt radix tenuis, fuſca, multiſque fibris donata, ſaporis amari, acris, ſubaſtringentis, odoris non ingrati. Ex Italiâ & Hiſpaniâ advehitur: naſcitur quoque in Flandriâ.

ARISTOLOCHIA PISTOLOCHIA, L'*ARISTOLOCHE PETITE*. PL. 5.

Ariſtolochia Piſtolochia dicta. P 307. T. 162. LIN. SP. 1364.

Eſt radix ſublutea ex pluribus longis tenuibus filamentoſis radiculis, ab eodem centro prodeuntibus, compoſita, odoris aromatici non ingrati. Ex Galliâ & Hiſpaniâ adfertur. Hæc ARISTOLOCHIÆ ſpecies, *DIOSCORDI* & veteribus Græcis, ignota fuiſſe videtur.

ARMENIACA MALUS, L'*ABRICOTIER*, PL. 153.

Mala Armeniaca majora. P. 442.

Armeniaca fructu majori nucleo amaro. T. 623.
Prunus Armeniaca. LIN. SP. 679.

Nuclei in uſu.

ARTEMISIA, L'*ARMOISE.* PL. 154.

Artemiſia vulgaris major. P. 137. T. 460. LIN. SP. 1188.

Variat colore caulis & floris.

Ex ARTEMISIA CHINENSI paratur illa lanugo quæ MOXA dicitur.

Herba in uſu.

ARUM, *LE PIED DE VEAU.* 155.

Arum vulgare maculatum & non maculatum. P. 195. T. 158.
Arum maculatum. LIN. SP. 1370.

Radices in uſu.

ARUNDO SACCHARIFERA, *LA CANNE DE SUCRE.* PL. 111.

Arundo ſaccharifera. P. 18.
Saccharum officinarum. LIN. SP. 79.

SACCHARUM eſt ſuccus dulcis ex ARUNDINIBUS SACCHARIFERIS expreſſus, concretus, & in Salis formam redactus. Hoc Sal Eſſentiale repetitis ſolutionibus & purificationibus, variat ſacchari ſpecies : hinc *Saccharum Album*, *Regium*, *Candum*, *&c.*

ASARUM, *LE CABARET.* PL. 156.

Nardus ruſtica. Officinarum.
Aſarum. P. 197, T. 501. DOD. 358.
Aſarum Europæum. LIN. SP. 633.

Folia & radices in uſu.

ASCLEPIAS, *LE DOMPT-VENIN.* PL. 157.

Aſclepias flore albo. P. 303. T. 94.
Hirundinaria. TRAG. 180.
Aſclepias Vincetoxicum. LIN. SP. 314.

Radices in uſu.

ASPALATHUS, *LE BOIS D'ASPALAT.*

Aſpalathus cortice cinereo, ligno purpureo. P. 392.

Lignum Aſpalathum. Officinarum.

Eſt lignum arboris exoticæ, reſinoſæ, necdùm ſatis deſcriptæ, ligno Aloës levius, laxius, & pallidius. Ex Indiâ orientali advehitur.

ASPARAGUS, L'*ASPERGE*. PL. 158.

Aſparagus ſativa. P. 489. T. 300.
Aſparagus officinalis. LIN. SP. 448.

Radices in uſu.

ASPERULA, *LE PETIT MUGUET*. PL. 159.

Aſperula ſive Rubeola montana odora. P. 334.
Apparine latifolia montana humilior. T. 114.
Aſperula odorata, flore albo. DOD. 355. LIN. SP. 150.

Herba in uſu.

ASSA FŒTIDA, L'*ASSA FŒTIDA*. PL. 99.

Hingiſch umbellifera, leviſtico affinis, radice Aſſam fœtidam fundente. KEMPF. AMENIT. EXOT. 535.
Ferula Aſſafœtida. LIN. SP. 356.

ASSA FŒTIDA eſt Gummi parùm reſinoſum è grumis albeſcentibus, non numquàm roſei coloris, concretum; fœtor virtutis index, ad Allii odorem accedit, ſapor acris eſt & valdè ingratus, undè *Stercus diaboli* dicitur; è vulneratâ radice manat: recens, candidiſſimum & pingue, ab Aëris & Solis contactu lenteſcit, coloremque ſubrufum induit. Patria ejus ſola eſt Perſia.

ATTRIPLEX, L'*ARROCHE, ou BONNE-DAME*. PL. 160.

Attriplex hortenſis alba ſive pallide virens. P. 119. T. 505.
Attriplex hortenſis. LIN. SP. 1493.

Herba in uſu.

ATTRIPLEX VULVARIA, L'*ARROCHE PUANTE*. PL. 161.

Attriplex fœtida. P. 119.
Chenopodium fœtidum. T. 506.
Chenopodium Vulvaria. LIN. SP. 321.

Herba in uſu.

AVELLANA, L'*AVELINE, ou NOISETTE*. PL. 233.

Nux Avellana, ſive Corylus. DOD. 804.

Corylus

Corylus ſylveſtris. P. 418. T. 582.
Corylus Avellana. LIN. SP. 1417.

Fructus in uſu.

AVENA, L'*AVOINE*, PL. 162.

Avena vulgaris alba aut nigra. P. 23. T. 514.
Avena ſativa. LIN. SP. 118.

Semina in uſu. Ex his fit AVENA EXCORTICATA, *LE GRUAU D'AVOINE.*

AURANTIUM, L'*ORANGER*. PL. 163.

Aurantium, acri medullâ vulgare. T. 620. L'Oranger aigre.
Aurantium, dulci medullâ vulgare. T. 620. L'Oranger doux.
Citrus Aurantium. LIN. SP. 1100.

Fructu acri vel dulci, majori aut minori variat.

AURICULA JUDÆ, L'*OREILLE DE JUDAS*. P. 115.

Fungus membranaceus auriculam referens, ſive ſambucinus. P. 372.
Agaricus Auriculæ formâ. T. 562.
Tremella Auricula. LIN. SP. 1625.
Peziza Auricula. LIN. SYST. NAT. *pag.* 725.

In caudice Sambuci naſcitur. Coloris eſt è cinereo nigricantis. In aquâ molleſcit, & illam mucilaginoſam reddit. Fungis pernicioſis acceнſetur.

BALANUS MYREPSICA, *LA NOIX DE BEN.* PL. 62.

Glans unguentaria. P. 402.
Ben parvum. MONARDI.

Eſt fructus Avellanæ magnitudinis, triangularis, in putamine corticoſo, cinereo, nucleum pinguem condens. Arbor Myricæ ſimilis in Syriâ & Arabiâ naſcitur, & ab incolis montis Sinaï *Pharagon* dicitur.

BALSAMUM COPAIBA, *LE BAUME DE COPAHU.*

Arbor balſamifera braſilienſis, fructu monoſpermo. RAJ. HIST. 1593.
Arbor Copaïba. PISON. 118.
Copaïfera officinalis. LIN. SP. 557.

BALSAMUM COPAIBA est succus resinosus, ex albo flavescens, acris, amarus, aromaticus & fragrans: recens oleosæ consistentiæ, lapsu verò temporis tenax & glutinosus evadit. È Brasiliâ à Lusitanis in Europam advehitur.

BALSAMUM JUDAICUM, *Le Baume de Judée, ou de la Mecque.*

Balsamum syriacum, Rutæ folio. P. 400.
Balsamum. PROSP. ALP. 48.
Balsamum verum. J. B. 1. 298.
Amyris Opobalsamum. LIN. MANT. 65.

BALSAMUM JUDAICUM Resina est liquida, pretiosa, albicans aut leviter flavescens, fragrantiâ ad Citri odorem accedens, sapore acris & aromatica. Probatur recens quæ fluidior est, oleosa magis & fragrans: improbatur tenacior quæ vetustior & Terebinthinâ aut aliis adulterata mangoniis; quod facilè odore & sapore discernes. Arborem hoc Balsamum fundentem producit Arabia. Lignum dicitur XYLOBALSAMUM, fructus CARPOBALSAMUM.

BALSAMUM PERUVIANUM, *Le Baume du Pérou.*

Cabureiba, seu Balsamum Peruvianum. PISON. 119.
Balsamum ex Peru. J. B. 1. 295.

BALSAMUM PERUVIANUM est succus fluidus, tenax, resinosus, facilè flammam concipiens, suavemque spargens fumum, sapore subacris, odore fragrantissimus. Duplex Balsami Peruviani distinguitur species: nempe STYRAX ALBA, seu BALSAMUM PERUVIANUM ALBUM, ex inciso cortice *Cabureibæ* arboris manat, Terebinthinâ tenuius, limpidum, ex albo flavescens, sapore aliquantum amaro, odore ad Styracem accedente. Alia species, scillicet BALSAMUM PERUVIANUM NIGRUM, coctione ligni & foliorum ejusdem arboris elicitur; est Terebinthinæ consistentiæ, colore è rufo ad nigrum vergit, odore ad Benzoïnum accedit: improbatur minus bene olens & empyreuma referens. Ex Hispaniâ novâ hæ duæ Balsami species afferuntur.

BALSAMUM TOLUTANUM, *Le Baume de Tolu.*

Balsamum Tolutanum, foliis Ceratiæ similibus, quod candidum est. P. 401.
Balsamum de Tolu. J. B. 196.
Toluifera Balsamum. LIN. SP. 1. 549.

BALSAMUM TOLUTANUM est succus resinosus, tenax, mediæ inter-

liquidum & denſum conſiſtentiæ; coloris è ſpadiceo ad aureum vergentis; odoris fragrantiſſimi ad Benzoïni & citri odorem accedentis; ſaporis dulcis & grati. Temporis lapſu exſiccatur & indureſcit ita, ut fragile evadat. Advehitur in cucurbitis parvis ex Americâ meridionali. Circa urbem Tolu colligitur.

BAMIA MOSCHATA, *Graine de Musc.*

Alcea ægyptiaca villoſa. P. 317.
Ketmia ægyptiaca, ſemine moſchato. T. 100.
Granum moſchatum. RUMP. 38.
Hibiſcus Abelmoſchus. LIN. SP. 980.

Sunt grana reniformia, puſilla, albicantia, odorem Moſchi & Ambræ ſpirantia. Eligenda probè odorata & recentia. Ex Ægypto advehuntur.

BARDANA, *La Bardane.* PL. 164.

Lappa major, Arctium Dioſcoridis. P. 198. T. 450.
Bardana ſeu Lappa major. DOD. 58.
Arctium Lappa. LIN. SP. 1143.

Cortex radicis & folia in uſu.

BARBAREA, L'*Herbe de Sainte Barbe.* PL. 552.

Eruca lutea latifolia, ſive Barbarea. P. 98.
Siſymbrium Erucæ folio glabro, flore luteo. T. 226.
Eryſimum Barbarea. LIN. 922.

Herba in uſu.

BDELLIUM GUMMI, *Le Bdellium.*

Bdellium. P. 503. RAJ. HIST. 1844.

Eſt lacryma gummoſa, ferruginea, nigricans, ingrana ſeu guttas concreta; ſapore & odore Myrrham æmulans. Præfertur amarum, tranſlucidum, dum frangitur pingue, odoratum, glebulamque hinc indè exſudantem exhibens. Elicitur ex arbore Guineæ, Arabiæ, & Indiæ, non ſatis huc uſque cognitâ nec deſcriptâ.

BECCABUNGA, *Le Becabunga*, PL. 165.

Anagallis aquatica major & minor, folio ſubrotundo. P. 252.
Veronica aquatica major & minor, folio ſubrotundo. T. 145.

Veronica Beccabunga. LIN. 16.

Herba in uſu.

BEHEN ALBUM, *LE BEHEN BLANC.* PL. 6.

Behen album. P. 235.
Jacea orientalis patula Carthami facie, flore luteo magno. T. COR. 32.
Centaurea Behen. L. 1292.

Radices BEHEN, optimæ cenſentur majores, non carioſæ, amarore non ingrato.

BEHEN RUBRUM, *LE BEHEN ROUGE.*

Limonium maritimum majus. P. 192. T. 341.
Limonium majus multis, aliis Behen rubrum. J. B. 3. *App.* 876.
Statice Limonium. LIN. SP. 394.

Radix in uſu.

BEHEN NOSTRAS, *LE BEHEN DU PAYS.*

Lychnis ſylveſtris, quæ Behen album vulgò. P. 205. T. 335.
Cucubalus Behen. LIN. SP. 591.

Herba in uſu.

BELLADONA, *LA BELLE-DAME.* PL. 166.

Solanum melanocerafus. P. 166.
Solanum maniacum multis, ſive Belladona. J. B. 3. 611.
Belladona majoribus foliis & floribus. T. 77.
Solanum lethale. DOD. 456.
Atropa Belladona. LIN. SP. 260.

Folia in uſu.

BELLIS MAJOR, *LA GRANDE MARGUERITTE.* PL. 167.

Bellis ſylveſtris, caule folioſo major. P. 261.
Leucanthemum vulgare. T. 492.
Bellis major. DOD. 265.
Chriſanthemum Leucanthemum. LIN. SP. 1251.

Herba & flores in uſu.

BELLIS MINOR, *LA PAQUERETTE*. Pl. 167.

Consolida minor. Herbariorum.
Bellis sylvestris minor. P. 261. T. 491.
Bellis perennis. LIN. SP. 1248.

Folia & flores in usu.

BENZOINUM, *vel* BELZOINUM, *LE BENZOIN*. PL. 83.

Arbor virginiana, Citri vel Limonii folio, Benzoïnum fundens. COM. HORT. AMST. *tom.* I. *pag.* 189.
Assa dulcis. Officinarum.
Laurus Benzoin. LIN. SP. 530.

BENZOINUM est resina arida & indurata, è Flavescentibus, rutilantibus & albicantibus grumis in massam coacta; saporis acris, resinosi, odorisque suavis. Optimum quod *Amygdaloïdes* vocatur & maculas candidas, Amygdalarum instar, refert, suavissimumque spirat odorem. Heterogeneis inquinatum minùs pretiosum censetur. Ex arbore vulneratâ extillat in insulis Sumatrâ & Javâ, in regno Siam & in Virginiâ.

BERBERIS, L'*ÉPINE VINETTE*. PL. 168.

Berberis dumetorum. P. 454. T. 614.
Spina acida, sive Oxyacantha. DOD. 750.
Berberis vulgaris. LIN. SP. 471.

Fructus & semina in usu.

BERULA, *LA BERLE*. PL. 169.

Sium sive Apium palustre folis oblongis. P. 154. T. 308.
Sium sive Laver Dioscoridis, Olusatri folio, sive Pastinaca aquatica. LOB. ICON. 208.
Sium latifolium. LIN. SP. 361.

Herba in usu.

BETA, *LA BETTE ou POIRÉE*, PL. 170.

Beta alba vel pallescens, quæ Cicla officinarum. P. 118. T. 502.
Beta Cicla. LIN. SP. 322.

Herba in usu.

BETA RUBRA, *LA BETTE-RAVE*.

Beta rubra radice Rapæ. P. 118. T. 502.

Beta radice rubrâ crassâ. J. B. 2. 961.
Beta rubra. LIN. SP. 322.

Radix in usu.

BETONICA, *LA BETOINE.* PL. 171.

Betonica purpurea. P. 235. T. 203.
Betonica officinalis. LIN. SP. 810.

Folia & flores in usu.

BETULA, *LE BOULEAU*, PL. 172.

Betula. P. 427. T. 588. DOD. 839.
Betula alba. LIN. SP. 1393.
Folia in usu.

BISTORTA, *LA BISTORTE.* PL. 172.

Bistorta major, radice magis & minus intortâ. P. 192. T. 511.
Polygonum Bistorta. LIN. SP. 516.
Radix in usu.

BOMBAX, *LE COTON.*

Gossypium frutescens, semine albo. P. 430.
Xylon sive Gossypium herbaceum. J. B. 1. 343. T. 101.
Gossypium herbaceum. LIN. SP. 975.

Semen BOMBACIS coloris è nigro cinerei, Pisi magnitudinis, nucleum album, oleosum, dulcem condit. *Gossypium* seu BOMBAX colitur in Malthâ, Siciliâ & aliis Archipelagi insulis.

BONUS HENRICUS, *LE BON HENRI.* PL. 174.

Lapathum unctuosum. P. 115.
Tota bona. DOD. 651.
Chenopodium folio triangulo. T. 506.
Chenopodium Bonus Henricus. LIN. SP. 318.
Herba in usu.

BORRAGO, *LA BOURRACHE.* PL. 175.

Borrago floribus cæruleis. J. B. 3. 574. T. 133.
Borrago officinarum. LIN. SP. 197.
Folia & flores in usu.

BOTRYS VULGARIS, *LE BOTRYS VULGAIRE.* PL. 176.

Botrys ambrosioïdes vulgaris. P. 138.
Chenopodium ambrosioïdes, folio sinuato. T. 506.
Chenopodium Botrys. LIN. LP. 320.

Herba in usu.

BOTRYS AMERICANA, *LE BOTRYS, ou THÉ DU MEXIQUE.* PL. 177.

Attriplex odora suaveolens americana, seu mexicana. MORIS. 2. 605.
Chenopodium ambrosioïdes mexicanum. T. 506.
Botrys ambrosioïdes mexicana. P. 138. & *App.* 516.
Chenopodium ambrosioïdes. LIN. SP. 320.

Sponte crescit in Mexico & Lusitaniâ. Herba in usu.

BRASSICA RUBRA, *LE CHOU ROUGE.* PL. 178.

Brassica capitata rubra. P. 111. T. 219. DOD. 621.
Brassica oleracea rubra. LIN. SP. 932.

Folia in usu.

BRUNELLA, *LA BRUNELLE.* PL. 180.

Brunella major, folio non dissecto. P. 260. T. 182.
Consolida minor. MATH. 703.
Symphitum petræum. LOB. ICON. 474.
Prunella vulgaris. LIN. SP. 837.

Herba in usu.

BRYONIA, *LA BRYONE.* PL. 181.

Bryonia aspera, sive alba, baccis rubris. P. 297. T. 102.
Vitis alba sive Bryonia. J. B. 2. 143.
Bryonia alba. LIN. SP. 1438.

Radix in usu.

BUGLOSSUM, *LA BUGLOSSE.* PL. 183.

Buglossum angustifolium majus, flore cæruleo. P. 256. T. 134.
Anchusa officinalis. LIN. SP. 191.

Folia & flores in usu.

BUGULA, *LA BUGLE.* PL. 184.

Consolida media pratensis cærulea. P. 260.

Bugula. T. 209. DOD. 135.
Ajuga reptans. LIN. SP. 785.

Herba in uſu.

BUNIAS, *LE NAVET SAUVAGE, LA NAVETTE.*

Bunias ſylveſtris, Napus flore luteo. LOB. ICON. 200.
Napus ſylveſtris. P. 95. T. 229.
Neveta. RUELLII.
Braſſica Napus. LIN. SP. 931.

A NAPO SATIVO qui vernaculè *Rape* vocatur, differt NAPUS SYLVESTRIS noſtratibus *Navette* : oleum è ſeminibus expreſſum, *Huile de Navette*; oleum è ſeminibus BRASSICÆ ARVENSIS *Huile de Colſat* nominatur. NAPUS SYLVESTRIS autumno ſeritur in arvis, vere floret. Ejus ſemina *Theriacam* ingrediuntur.

BURSA PASTORIS, *LE TABOURET.* PL. 185.

Burſa paſtoris, major, folio ſinuato. P. 108. T. 216.
Thlaſpi Burſa paſtoris. LIN. SP. 903.

Herba in uſu.

BUXUS, *LE BUIS.* PL. 186.

Buxus arboreſcens. P. 471. T. 578. LIN. SP. 1395.
Lignum in uſu.

CACAO, *LE CACAO.* PL. 63.

Amygdalis ſimilis guatimalenſis. P. 442.
Cacao Americæ, ſeu Avellana mexicana. J. B. 1. 291.
Arbor cacaviſera americana. PLUK. 268.
Cacao. CLUS. EXOT. 55.
Theobroma Cacao. LIN. SP. 1100.

THEOBROMÆ arboris fructus CACAO dicuntur: eligantur recentes, integri, pingues & ſapidi; rejiciantur mucidi, carioſi aut quoquò modo corrupti. In Americâ meridionali & Antillis ſpontè *Theobroma* creſcit.

COFFEA, *LE CAFÉ.* PL. 70.

Bon, vel Ban. PROSP. ALP. 36.

Jasminum arabicum, Lauri folio, cujus semen apud nos Café *dicitur.* ACT. SCIENT. 1713. *pag.* 291.
Coffea arabica. LIN. SP. 245.

Fructus seu baccæ COFFEÆ semina bina, sibi invicem parte planâ cohærentia, & folliculo membranaceo tecta, continent. Variæ nobis afferuntur COFFEÆ species, quæ ratione qualitatis differunt; optimæ habentur ex Oriente. Arbor COFFEÆ sponte crescit in Oriente, præsertim in Arabiâ & Persiâ; in Americam translata, magnâ in quantitate colitur.

CALAMINTHA ARVENSIS, *LE POULIOT THYM.* PL. 190.

Calamintha arvensis verticillata. P. 229.
Mentha arvensis verticillata hirsuta. J. B. 3. 217. T. 189.
Mentha arvensis. LIN. SP. 806.

Herba in usu.

CALAMINTHA MONTANA, *LE CALAMENT DE MONTAGNE.* PL. 189.

Calamintha magno flore. P. 229. T. 194.
Calamintha montana præstantior. LOB. ICON. 512.
Melissa grandiflora. LIN. SP. 827.

Herba in usu.

CALAMINTHA PULEGII ODORE, *CALAMENT A ODEUR DE POULIOT.* PL. 188.

Calamintha Pulegii odore, sive Nepeta. P. 228. T. 194.
Calamintha flore minore, odore Pulegii. J. B. 3. 229.
Melissa Nepeta. LIN. SP. 828.

Herba in usu.

CALAMINTHA VULGARIS, *LE CALAMENT ORDINAIRE.* PL. 187.

Calamintha vulgaris vel officinarum Germaniæ. P. 228. T. 194.
Calamintha montana vulgaris. LOB. ICON. 513.
Melissa Calamintha. LIN. SP. 827.

Herba in usu. Hæc ultima species ingreditur *Theriacam.*

CALAMUS AROMATICUS, *LE ROSEAU AROMATIQUE.* PL. 40.

Calamus aromaticus verus. Officinarum.

Calamus aromaticus Syriacus. P. 17.
Calamus odoratus Libani. LOB. ICON. 54.
Arundo Syriaca aromatica foliis ex adverso sitis. MORIS. 3. 221.

Est caulis plantæ arundinaceæ instar calami aut tubi cavi tenuis, calami scriptorii crassitie, geniculatus, foris pallidè flavescens, intùs candidus, medullâ fungosâ levi, repletus; sapore acris, suaviter amaricans, odore fragrans: probatur fulvus, densè geniculatus, odoratus. Cùm raro ad nos afferatur, ACORUS VERUS ejus est succedaneus.

CALCITRAPA, *LA CHAUSSE-TRAPE.* PL. 191.

Carduus stellatus foliis Papaveris erratici. P. 387.
Carduus stellatus sive Calcitrapa. J. B. 3. 89. T. 440.
Centaurea Calcitrapa. LIN. SP. 1297.

Radix & herba in usu.

CALENDULA HORTENSIS, *LE SOUCI DE JARDIN.* PL. 192.

Caltha vulgaris. P. 275. T. 498.
Calendula. DOD. 254.
Calendula officinarum. LIN. SP. 1304.

Flores in usu.

CALENDULA SYLVESTRIS, *LE SOUCI SAUVAGE.*

Caltha arvensis. P. 276. T. 499.
Calendula arvensis. TABER. ICON. 335. LIN. SP. 1304.

Hortensis & sylvestris culturâ tantùm differunt. Sola Caltha flore simplici venit in usum.

CAMPHORA, *LE CAMPHRE.* PL. 84.

Camphora officinarum. P. 500.
Arbor camphorifera japonica. BREYN. PROD. 2. *pag.* 16. *icon.* 16.
Laurus camphorifera. KÆMP. AMEN. EXOT. 770.
Laurus Camphora. LIN. SP. 528.

CAMPHORA est substantia volatilis, candicans, pellucida instar glaciei; saporis acris, aromatici; odoris fragrantis, gravis, penetrantissimi. Eligatur sine maculis, quæ deflagrando tota consumitur, & in ipsâ aquâ ardet. Prima extractio seu potiùs distillatio CAMPHORÆ in Japoniâ fit, dein in Europâ ulteriùs purificatur, tandem ad nos venit in panes coacta, figuræ sæpè orbicularis.

CAMPHORATA, *La Camphrée*. Pl. 193.

Camphorata hirsuta. P. 486. Act. Scient. 1705. *pag.* 313.
Camphorata Monspeliaca. Lob. Icon. 403.
Camphorosma monspeliaca. Lin. Sp. 178.

Herba in usu.

CANELLA ALBA, *La Canelle blanche.*

Costus corticosus. Cortex Winteranus spurius. Officinarum.
Cassia cinnamomea, *seu Cinnamomum sylvestre Barbadensium.* Pluk. Alm. 89. *t.* 161. *fol.* 7.
Winterania Canella. Lin. Sp. 636.

Est cortex in oblongos tubos convolutus, tàm foris, quàm intus albicans; sapore aromaticus, acris; odore gratus. Ad nos advehitur ex insulâ Jamaïcâ & aliis Americæ regionibus.

CANNABIS, *Le Chanvre*. Pl. 194.

Cannabis sativa. P. 320. T. 535. Lin. Sp. 1457.

Semina in usu.

CAPPARIS, *Le Caprier*. Pl. 195.

Capparis spinosa, *fructu minore*, *folio rotundo*. P. 480. T. 261.
Capparis spinosa. Lin. Sp. 720.

Cortex & fructus in usu.

CAPRIFOLIUM, *Le Chevre-feuille*. Pl. 196.

Periclymenum non perfoliatum Germanicum. P. 302.
Caprifolium Germanicum. T. 608. Dod. 411.
Lonicera Periclymenum. Lin. Sp. 247.

Folia & flores in usu.

CAPSICUM; *Le Poivre d'Inde*, *ou de Guinée*. Pl. 459.

Capsicum siliquis longis propendentibus. T. 152.
Piper Indicum vulgatissimum. P. 102.
Capsicum annuum. Lin. Sp. 270.

Fructus in usu.

CARANNA GUMMI, *La Gomme caragne.*

Caranna Monardi. P. 503. Clus. Exot. 298.

CARANNA eſt reſina dura & tenax : recens Picis inſtar ductilis ; inveterata fragilis ac dura eſt ; coloris ex viridi nigricantis, ſaporis amari, ingrati ; odoris fragrantis præſertìm dùm accenditur. Ex novâ Hiſpaniâ, in fruſtis cylindraceis, foliis junceis involutis, advehitur.

CARDAMINE, *Le Cresson des Prés.*

Naſturtium pratenſe magno flore. P. 104.
Cardamine pratenſis magno flore purpuraſcente. T. 224.
Flos Cuculi. DOD. 592.
Cardamine pratenſis. LIN. SP. 915.

Folia & ſemina in uſu.

CARDAMOMUM MAJUS, *La Maniguette.* BARREL. ICON. 571.

Cardamomum majus. MATH. 27.
Grana paradiſi officinarum. P. 413.
Mellegetta ſeu Cardamomum piperatum. CORD. IN DIOSC. *lib.* 1. *pag.* 2.
Amomum Grana paradiſi. LIN. SP. 2.

Sunt grana triquetra, parva, foris ſpadicei coloris, intùs albi, ſaporis acris ut Piper : ex Oriente advehuntur. A quibuſdam AMOMUM pro CARDAMOMO MAJORE venditur.

CARDAMOMUM MEDIUM, *Le Cardamomum moyen.* BARREL. ICON. 571.

Cardamomum majus officinarum. P. 413.

CARDAMOMUM MINUS, *Le petit Cardamomum.* PL. 55. BARREL. ICON. 571. *Obſ.* 1396.

Cardamomum ſimpliciter in officinis dictum. P. 414.
Cardamomi cum ſiliquis ſive thecis longis & brevibus. J. B. 2. 205.
Elettari ſecundum. RHEED. MAL. 11. *p.* 9.
Amomum Cardamomum. LIN. SP. 2.

CARDAMOMUM MEDIUM ET MINUS ſunt ſiliquæ triquetræ, pallidæ ; grana anguloſa fuſca continentes. Sint recentes, oleoſæ, ſuave olentes, aromaticæ, ſapore gratæ, ac breviores vel minores. Varia ſiliquarum longitudo ejuſdem plantæ varietas creditur. In Indiis creſcit.

CARDIACA, L'*Agripaume.* PL. 197.

Agripalma. Officinarum.
Marrubium Cardiaca dictum, fortè primum Theophraſti. P. 230.
Cardiaca. T. 186.
Leonurus Cardiaca. LIN. SP. 817.

Tota planta in uſu.

CARDUUS BENEDICTUS, *LE CHARDON BENIT.* PL. 198.

Cnicus ſylveſtris hirſutior, ſive Carduus benedictus. P. 378. T. 450.
Carduus benedictus. DOD. 737.
Centaurea benedicta. LIN. SP. 1296.

Folia & ſemina in uſu.

CARDUUS MARIÆ, *LE CHARDON MARIE.* PL. 200.

Carduus albis maculis notatus, vulgaris. P. 381. T. 440.
Carduus marianus, ſive lacteis maculis notatus. J. B. 3. 52.
Carduus marianus. LIN. SP. 1153.

Radix & ſemina in uſu.

CARDUUS HÆMORRHOIDALIS, *LE CHARDON HÉMORRHOIDAL.*

Carduus vinearum repens, Sonchi folio, floribus albis, caule tuberoſo, qui Hemorrhoïdalis Pariſienſium. H. R. P.
Circium arvenſe, Sonchi folio, radice repente caule tuberoſo. T. 448.
Serratula arvenſis. LIN. SP. 1149.

Tubercula ſeu nodi in caule reperti, aliquandò ſunt in uſu. Hæc tubercula à puncturâ inſecti (*Muſca cardui.* LIN. SYST. NAT. *tom.* 1. 998. REAUM. INSECT. *t.* 3. *p.* 45. *f.* 12. - 14.) & è ſucco nutritio ex læſis fibris exſudante, proveniunt.

CARLINA, SEU CHAMELEON ALBUS, *LA CARLINE, LE CAMÉLÉON BLANC.* PL. 7.

Carlina acaulos magno flore albo. P. 380. T. 500.
Carlina caulifera & acaulis. BOT. MONSP. 292.
Carduus Xerantemos, flore albo ampliore, acaulis. MORIS. 3. 162.
Carlina acaulis. LIN. SP. 1160.

Radix in uſu. Eſt ſaporis & odoris aromatici grati. In Germaniæ montibus apricis reperitur.

CARLINA IXIA, *LE CHAMÉLÉON BLANC DE DIOSCORIDE.* PL. 8.

Carlina acaulis gummifera. P. 380.
Cnicus Carlinæ folio, acaulos, gummifer, aculeatus, flore purpureo. T. COR. 33.
Atractilis gummifera. LIN. SP. 1161.

Oritur in Cretâ & Italiâ. Hæc Carlinæ ſpecies raró nunc eſt in uſu.

CARPOBALSAMUM, *Le fruit du Baumier de Judée.*

Sunt grana, ſeu baccæ oblongæ, pediculo donatæ brevi; cortice rugoſo, fuſco, quatuor coſtis diſtincto; odore & ſapore aromatico grato. In arenoſis ſterilibuſque locis juxtà Mecham & Medinam ſponte creſcunt *Amyris Opobalſami* frutices. Parum vel nihil balſami ex his producitur, ſemina tamen vel fructus ferunt copioſos; ut has frutices balſamo prægnantes reddant, in pingue ſolum transferunt & diligenter colunt Arabiæ Ægyptique incolæ. *Vide* BALSAMUM JUDAICUM.

CARTHAMUS, *Le Saffran batard, la graine de Péroquet.* Pl. 75.

Cnicus ſativus, ſive Carthamus officinarum. P. 378.
Carthamus officinarum flore croceo. T. 457.
Carthamus tinctorius. Lin. Sp. 1162.

Semina & flores in uſu.

CARVI, *Le Carui.* Pl. 202.

Cuminum pratenſe Carvi officinarum. P. 158.
Carvi Cæſalpini. T. 306.
Carum Carvi. Lin. Sp. 378.

Semina in uſu.

CARYOPHYLLATA, *La Benoite.* Pl. 201.

Caryophyllata vulgaris. P. 321. T. 294. Dod. 137.
Geum urbanum. Lin. Sp. 716.

Radix in uſu.

CARYOPHYLLUS AROMATICUS, *Le Girofle.* Pl. 59.

Caryophyllus aromaticus fructu oblongo. P. 410.
Caryophyllus aromaticus Indiæ orientalis, fructu clavato monopyreno. Pluk. Alm. 88. *t.* 155. *fol.* 1.
Caryophyllus aromaticus. Lin. Sp. 735.

Caryophylli, *les cloux de Girofle*, ſunt fructus immaturi, vel potiùs calyces florum, arboris *Caryophylli aromatici*, eligendi ſunt oleoſi, ſaporis fervidi, & odoris ſuavis.

Caryophylli majores, *les Girofles mères*, ſeu Anthophylli, ſunt *Caryophylli aromatici* arboris, fructus maturi; Caryophyllis aromaticis craſſiores, ac tumidiores, odoris & ſaporis penè ejuſdem. Ex his fructibus ſponte arbor propagatur in inſulis Moluccis & Amboïnæ: quare Anthophylli *Caryophyllorum mater dicuntur.*

CARYOPHYLLUS RUBER, L'ŒILLET ROUGE. PL. 203.

Tunica. Officinarum.
Caryophyllus maximus ruber. P. 207. T. 329.
Dianthus Caryophyllus coronarius. LIN. SP. 587.
Flores in uſu.

CASCARILLA, *LA CASCARILLE*, *ou CHACRIL.* PL. 36.

Cortex Eleuterii. Cortex peruvianus aromaticus, ſeu griſeus. Officinarum.
Ricinoïdes Elæagni folio. CATEB. 2. *pag.* 46. *t.* 46. PLUM. *ſpec.* 20. *icon.* 240. *pag.* 1.
Croton Caſcarilla. LIN. SP. 1424.

Cortices CASCARILLÆ, foris coloris ſunt griſei, intus ferruginei; ſaporis acris & amari; odoris, præſertim ſi accendantur, fragrantis quaſi Moſchi: cortices eligantur odorati & reſinoſi. Arbor creſcit in Floridâ & in Peru.

CASSIA, *LA CASSE*, PL. 53.

Caſſia fiſtula alexandrina. P. 403. T. 619.
Caſſia nigra. DOD. 787.
Caſſia fiſtula. LIN. SP. 540.

Eſt ſiliqua longa, cylindracea, corticoſa, nigricans, in loculamenta diviſa; pulpam dulcem nigricantem, cum ſeminibus fulvis, depreſſis, includens. Optima cenſetur Alexandrina, ſive Orientalis: eligatur recens & medullâ gravis. Dantur & ſiliquæ Americanæ quæ craſſiores & breviores ſunt; at pulpam amariuſculam continent.

CASSIA LIGNEA, *LA CASSE LIGNEUSE.*

Arbor canelliforma indica cortice acerrimo, viſcido ſeu mucilaginoſo, quæ Caſſia lignea officinarum vocatur. BREYN. PROD. 2.
Cinnamomum ſeu Canella malabarica, ſeu javanenſis. P. 409.
Laurus Caſſia. LIN. SP. 528.

CASSIA LIGNEA eſt cortex lignoſus inſtar Cinnamomi; odore tamen & ſapore plerumque debiliore, & guſtu mucilaginoſo. Quo magis ad Cinnamomum accedit, eò melior habetur.

CASSIA CARYOPHYLLATA, *LA CANELLE GIROFLÉE.*

Caryophyllus aromaticus fructu rotundo; Garyophyllon Plinii. P. 411. JONST. DENDR. 176.
Caryophyllus folio & fructu rotundo. BREYN. PROD. 2. 26.
Myrtus Caryophyllata. LIN. SP. 675.

CASSIA CARYOPHYLLATA eſt cortex tenuis, è rufo ferrugineus, in modum tubuli convolutus, ſapore & odore caryophyllaceo: eligatur recens, odoratus & ſapidus. Arbor in Cubæ, Jamaicæ ſylvis & aliis Indiæ regionibus naſcitur.

CASTANEA SATIVA, *Le Marronnier.* PL. 204.

Caſtanea ſativa. P. 418. T. 584.
Fagus Caſtanea. LIN. SP. 1416.

Fructus in uſu.

CASTANEA EQUINA, *Le Marronnier d'Inde.*

Caſtanea equina folio multifido. J. B. 1. 128. DOD. 814.
Hippocaſtanum vulgare. T. 612.
Æſculus Hippocaſtanum. LIN. SP. 488.

Fructus in uſu.

CATECHU, *Le Cachou.* PL. 110.

Palma cujus fructus ſeſſilis Fauſel dicitur. P. 510.
Areca Palmæ foliis. J. B. 1. 389.
Areca Catechu. LIN. SP. 1659.

CATECHU, vulgò TERRA JAPONICA, ad vegetabile regnum pertinet. Eſt ſuccus condenſatus è variis vegetabilibus expreſſus. Baſim, ſuccus fructuum *Arecæ* qui *Fauſel* dicuntur, conſtituit. Eligendus reſinoſo-gummoſus, durus purpureo-nigricans, facilè, in aquâ tepidâ ſolubilis; ſaporis aſtringentis, ſubamari, poſtmodùm dulcioris & grati, odoris expers. Advehitur ex Indiâ orientali, Pegu, Malabariâ, Bengalâ, &c.

CENTAURIUM MAJUS, *La grande Centaurée.* PL. 205.

Rhapontica quæ hodie Centaurea major. TRAG. 138.
Centaurium majus, folio in plures lacinias diviſo. P. 117. T. 449.
Centaurea Centaurium. LIN. SP. 1287.

Radix in uſu.

CENTAURIUM MINUS, *La petite Centaurée.* PL. 206.

Centaurium minus. P. 278. T. 122. DOD. 336.
Gentiana Centaurium. LIN. SP. 332.

Summitates florentes in uſu.

CEPA, *L'Oignon.* PL. 207.

Cepa vulgaris floribus & tunicis candidis vel purpuraſcentibus. P. 71. T. 382.

Cepe

Cepe sive Cepa rotunda, alba vel rubra. J. B. 2. 547.
Allium Cepa. LIN. SP. 431.

Bulbi in usu.

CERASUS, *LE CERISIER, LES CERISES ROUGES ORDINAIRES.* PL. 210.

Cerasus sativa, fructu rotundo, rubro & acido. P. 449. T. 625.
Prunus Cerasus. LIN. SP. 679.

Fructus in usu.

CERASUS SYLVESTRIS, *LE MÉRISIER, LES CERISES NOIRES.* PL. 211.

Cerasus major ac sylvestris, fructu subdulci nigro colore inficiente. P. 450. T. 626.
Cerasus sylvestris fructu nigro. J. B. 1. 220.
Cerasa nigra. TABER. ICON. 986.
Prunus avium. LIN. SP. 680.

Fructus in usu.

CETARACH, *LE CÉTÉRAC.* PL. 212.

Ceterach officinarum. P. 354.
Asplenium sive Ceterach. T. 544.
Asplenium Ceterach. LIN. SP. 1538.

Herba in usu.

CEVADILLA, SEU SEBADILLUM, *LA CÉVADILLE.*

Hordeum Causticum. P. 23.
Cevadilla officinarum. MONARDI. 343.
Cevadilla Hispanorum. RAJ. HIST. 1246.

Capsulæ seminales CEVADILLÆ sunt oblongæ, gibbosæ, quasi corniculatæ, triloculares; colore nigricante; saporis fervidi, amari, ingrati ut Staphisagria; odoris nullius. CEVADILLA masticata salivam ciet, fauces afficit, & nauseam excitat. È Mexico advehuntur.

CHÆROPHYLLUM, *LE CERFEUILLE.* PL. 213.

Chærophyllum sativum. P. 152. T. 314.
Cerefolium. MATH. 526.
Scandix Cerefolium. LIN. SP. 368.

Tota planta in usu.

CHAMÆDRYS, *La Germandrée*. Pl. 214.

Chamædrys minor repens. P. 248. T. 205. Dod. 43.
Teucrium Chamædrys. Lin. Sp. 790.

Folia & flores in uſu.

CHAMÆMELUM ROMANUM. *La Camomille romaine*. Pl. 215.

Chamomilla romana. Officinarum.
Chamæmelum nobile, ſive Leucanthemum odoratius. P. 135. T. 494.
Anthemis nobilis. Lin. Sp. 1260.

Folia & ſummitates florentes ſunt in uſu.

CHAMÆMELUM VULGARE, *La Camomille des champs*.

Chamæmelum vulgaris, Leucanthemum Dioſcoridis. P. 135. T. 494.
Matricaria Chamomilla. Lin. Sp. 1256.

Hæ duæ ſpecies indiſcriminatim ſumuntur. Folia & flores ſunt in uſu.

CHAMÆMELUM FETIDUM, *La Camomille fétide*. Pl. 216.

Chamæmelum fetidum. P. 135. T. 494.
Chamæmelum fetidum, ſive Cotula fetida. J. B. 3. 120.
Anthemis Cotula. Lin. Sp. 1261.

Tota planta in uſu.

CHAMÆPITYS, L'*Ivette*. Pl. 217.

Iva arthritica. Officinarum.
Chamæpitys lutea vulgaris ſive folio trifido. P. 249. T. 208.
Teucrium Chamæpitys. Lin. Sp. 787.

Tota planta in uſu.

CHAMÆPITYS MOSCHATA, L'*Ivette musquée*. Pl. 218.

Iva moſchata. Officinarum.
Chamæpitys moſchata, foliis ſerratis, an prima Dioſcoridis? P. 249. T. 208.
Teucrium Iva. Lin. Sp. 787.

Tota planta in uſu.

CHELIDONIUM MAJUS, *LA GRANDE ÉCLAIRE*. PL. 219.

Hirundinaria major. Officinarum.
Chelidonium majus vulgaris. P. 144. T. 231. DOD. 48.
Chelidonium majus. LIN. SP. 723.

Folia & radices in uſu.

CHELIDONIUM MINUS, *LA PETITE ÉCLAIRE*. PL. 220.

Chelidonia rotundifolia minor. P. 309.
Ranunculus vernus, rotundifolius minor. T. 286.
Ranunculus Ficaria. LIN. SP. 774.

Tota planta & tubercula radicis in uſu.

CHINA, *LA SQUINE*. PL. 9.

China radix. P. 296.
Smilax minus ſpinoſa, fructu rubicundo, radice virtuoſa, Kina dicta. KÆMPF. AMŒN. EXOT. 781.
Smilax China. LIN. SP. 1459.

CHINÆ radices ſunt foris fuſcæ, intùs coloris ex albo ruſeſcentis: eligantur recentes, ponderoſæ, reſinoſæ, non carioſæ. In Chinâ & Japoniâ inter Filices & Vepres, in incultis locis luxuriat.

CICERA RUBRA, *LES POIS CHICHES ROUGES*. PL. 221.

Cicer rubrum. Officinarum.
Cicer ſativum, flore ex purpurâ rubeſcente, ſemine rubro. P. 347. T. 389.
Cicer arietinum. DOD. 525. LIN. SP. 1040.

Semina, CICERA RUBRA dicta, ſunt in uſu.

CICHORIUM, *LA CHICORÉE SAUVAGE*. PL. 222.

Cichorium ſylveſtre, ſive officinarum. P. 125. T. 479.
Seris picris. DIOSCORIDIS.
Cichorium intybus. LIN. SP. 1142.

Tota planta ſine caule in uſu.

CICUTA, *LA CIGUE*. PL. 233.

Cicuta major. P. 160. T. 306.
Cicuta major vulgaris. PARK. 933.
Conium maculatum. LIN. SP. 349.

Radices & herba in uſu.

CINARA, L'*Artichaut*. Pl. 225.

Cinara hortensis foliis non aculeatis. P. 383. T. 442.
Scolymus non aculeatus. Taber. Icon. 695.
Cinara Scolymus. Lin. Sp. 1159.

Radices & capita squammosa in usu.

CINNAMOMUM, SEU CANELLA, *La Canelle*. Pl. 35.

Cinnamomum seu Canella zeilanica. P. 408.
Laurus Cinnamomum. Lin. Sp. 528.

Cinnamomum est cortex tenuis, ab exteriore pelliculâ albâ purgatus, canaliculatus, coloris ex flavo rubentis; saporis acris, subdulcis; odoris grati fragrantissimi. Eligendum est Cinnamomum longum, sapidum ac fragrans. In Ceylan colitur.

CITREUM MALUM, *Le Citronier, Le Citron*. Pl. 227.

Malus Medica. P. 435.
Citreum vulgare. T. 621.
Citrus Medica. Lin. Sp. 1100.

Omnes partes fructûs in usu.

CITRULLUS, *La Citrouille*. Pl. 228.

Anguria Citrullus dicta. P. 312. T. 106. Dod. 664.
Cucurbita Citrullus. Lin. Sp. 1435.

Fructus & semina in usu.

CLEMATITIS, L'*Herbe aux gueux*, *La Viorne*. Pl. 625.

Clematitis sylvestris latifolia. P. 300. T. 293.
Vitalba. Dod. 404.
Clematitis Vitalba. Lin. Sp. 766.

Folia & cortex secundus in usu.

COCCULUS, *La Coque du levant*.

Cocculæ officinarum. P. 5111.
Solanum racemosum indicum arborescens, Cocculos Indos ferens. Raj. Dendr. 115.
Menispermum Cocculus. Lin. Sp. 1468.

Cocculus est fructus fusco & rugoso cortice tectus, baccarum Lauri magnitudine, rotundior tamen. Ex Oriente affertur.

COCHLEARIA, L'*Herbe aux cuillers*. Pl. 229.

Cochlearia folio subrotundo. P. 110. T. 215.
Cochlearia officinalis. Lin. Sp. 903.

Tota planta in usu.

COLCHICUM, *Le Colchique*. Pl. 230.

Colchicum commune. P. 67. T. 348.
Colchicum autumnale. Lin. Sp. 485.

Radix in usu.

COLOCYNTHIS, *La Coloquinte*. Pl. 52.

Colocynthis fructu rotundo major & minor. P. 313. T. 107.
Cucumis Colocynthis. Lin. Sp. 1435.

Colocynthidis fructus est Pomi mediocris magnitudinis, in substantiâ fungosâ, semina albicantia & plana includit. Eligatur alba, levis, amara, & à cortice exteriori mundata. È Syriâ & ex aliis orientalibus Regionibus asportatur.

COLOPHONIA, *La Colophone*, *Le Bray sec*.

Colophonia officinarum. P. 504.

Est resina sicca Abietina, lento igne ad consistentiam friabilem cocta. Fit etiam ex residuo Olei Terebinthinæ.

COLUTEA VESICARIA, *Le Baguenaudier*, *ou faux Séné*.

Colutea vesicaria. P. 396. T. 649. Dod. 784.
Senna Mauritanorum. Ruellii. 194.
Colutea arborescens. Lin. Sp. 1045.

Folia in usu.

CONYZA MAJOR, *La Conise*, *La chasse Puce*.

Conyza major vulgaris. P. 265. T. 454.
Conyza major. Math. 870.
Conyza squarrosa. Lin. Sp. 1205.

Tota planta in usu.

CONSOLIDA MAJOR, *La grande Consoude*. Pl. 231.

Symphytum Consolida major. P. 259. T. 138.

Symphytum officinale. LIN. SP. 195.

Radices, folia & flores in ufu.

CONTRAYERVA, *Le Contrayerva.* PL. 10.

Cyperus longus odoratus peruvianus. P. 14.
Contrayerva Hifpanorum, five Drakena. CLUS. EXOT. 83.
Dorftenia Sphondylii folio, Dentariæ radice. PLUM. GEN. 29. *Icon.* 119.
Dorftenia Contrayerva. LIN. SP. 176.

CONTRAYERVÆ radices funt nodofæ & fibrofæ, coloris extùs rufi, intùs pallidi. Optimæ cenfentur recentes, ponderofæ, faporis fubaftringentis, aromatici, præditæ. *Dorftenia*, in novâ Hifpaniâ, Mexico, Peru, Tabago, & infulâ Sancti Vincentii nafcitur.

COPAL GUMMI, *La Gomme copal.*

Rhus obfoniorum fimilis americana non ferrata....... gummi candidum fundens. PLUK. ALM. 318. *t.* 56. *f.* 1.
Rhus Virginianum Lentifci foliis. RAJ. HIST. 1799.
Rhus Copallinum. LIN. SP. 380.

GUMMI COPAL eft refina fragilis, difficilis folutionis, diaphana, ex albo flavefcens, dùm prunis injicitur odorata. Sponte ex arboribus defluit, & non raró ab imbribus ad ripas fluminum abripitur: quod forsàn anfam dedit hanc *Succinum vegetabile* appellandi. Arbor crefcit in Americâ feptentrionali. Americani, omnes ferè refinas tranflucidas fub nomine *Copal*, indigitare folent.

CORALLINA, *La Coralline.* PL. 39.

Ex Mediterraneo Mari colligitur, rupibus, conchis, fub aquâ adhæret. Saporis & odoris eft ingrati, fubfalfi, pifculenti. Præfertur integra, albicans, viridiufcula, grifea, nec fabulo nec conchis commixta.

CORALLIUM ALBUM, *Le Corail blanc.*

CORALLUM feu CORALLIUM ALBUM, RUBRO rarius eft, & folo colore ab eo difcrepat; ejus loco *MADREPORA* plerumquè venditur.

CORALLIUM RUBRUM, *Le Corail rouge.* PL. 39.

CORALLUM RUBRUM eligitur pulchrè rubens & à fordibus liberum. Variis in locis præprimis in Mediterraneo Mari, ad littora Provinciæ,

Cataloniæ, & Siciliæ oras, in fundo Maris & in rupium cavernis reperitur.

NOTA. CORALLINA, CORALLIUM ALBUM & RUBRUM ex obſervationibus clariſſ. DE JUSSIEU (*Act. Acad. Regiæ Scient. Par. anni.* 1742.) POLYPORUM ſpecies ſunt, ſive vaginarum contextus, & receptacula Inſecti cujuſdam marini. Ad Regnum Animale has ſubſtantias pertinere conſtat, cùm omnem animalem calcem, animalium eſſe productum veriſſimum ſit. *Vide* MADREPORA *&* ISIS NOBILIS in Regno Animali.

CORIANDRUM, *LA CORIANDRE.* PL. 232.

Coriandrum majus. P. 158. T. 316.
Coriandrum ſativum. LIN. SP. 367.

Semina in uſu.

CORNUS, *LE CORNOUILLER.* PL. 233.

Cornus hortenſis mas. P. 447. T. 641.
Cornus mas. LIN. SP. 171.

Fructus in uſu.

CORONA IMPERIALIS, *LA COURONNE IMPÉRIALE.*

Lilium ſive Corona imperialis. P. 79.
Corona imperialis. T. 372. DOD. 201.
Fritillaria Imperialis. LIN. SP. 435.

Bulbus in uſu.

CORONOPUS, *LA CORNE DE CERF.*

Coronopus hortenſis. P. 190. T. 128.
Herba ſtellata, ſeu Cornu cervinum. DOD. 109.
Plantago Coronopus. LIN. SP. 166.

Herba in uſu.

CORTEX WINTERANUS, *L'ÉCORCE DE WINTER.* PL. 35.

Laurifolia Magellanica, cortice acri. P. 461.
Periclymenum rectum, foliis laurinis, cortice acri aromatico. SLOAN. PHIL. TRANS. N.° 284.

WINTERANUS cortex eſt craſſus, canaliculatus; foris, integumento

cinereo, fungoso, inæquali, fisso, ac multis rimis hiante, obductus; intùs solidus, densus, pallidus; saporis acris, aromatici; odoris fragrantissimi. È Jamaïcâ, Barbadâ & Terrâ Magellanicâ asportatur.

COSTUS ARABICUS, *Le Costus arabique*. Pl. 11.

Costus arabicus Dioscoridis. P. 36.
Costus indicus, Violæ martiæ odore. Mus. Zeyl. 58.
Chiansou Sinensium, Tsjana-Kua. Rheed. Malab. 2. *t*. 8.
Costus arabicus. Lin. Sp. 2.

Costi arabici radices sunt solidæ, crassæ, oblongæ, interdùm per medium sectæ; buxei extùs, intùs albicantis coloris; odoris ad Iridem florentinam accedentis. Costus, ex Arabiâ & Syriâ olim advectus, Arabicus & Syriacus dicebatur: jam in Malabariæ, Brasiliæ, & Surinamæ nemoribus crescit.

CREPITUS LUPI, *La Vesse de Loup*. Pl. 279.

Fungus rotundus orbicularis. P. 374.
Fungus pulverulentus, dictus Crepitus Lupi. J. B. 3. 848.
Lycoperdon vulgare. T. 563.
Lycoperdon Bovista. Lin. Sp. 1653.

Est fungus levis, non raro pugni magnitudine; cortice tenui, cinereo vestitus. Semen in hoc fungo contentum pulvis est tenuissimus vix conspicuus, dùm maturuit, instar fumi in auras avolans.

CRITHMUM, *La Baccille, ou Perce-Pierre*.

Crithmum, sive Fœniculum maritimum minus. P. 288. T. 317.
Fœniculum marinum seu Empetrum aut Calcifraga. Lob. Icon. 392.
Crithmum maritimum. Lin. Sp. 354.

Herba in usu.

CROCUS, *Le Safran*. Pl. 46.

Crocus sativus. P. 65. T. 350.
Crocus autumnalis sativus. Moris. 2. 335. *f*. 4. *t*. 2. *f*. 1.
Crocus sativus officinalis. Lin. Sp. 50.

Pistillorum Stigmata florum Croci sativi autumnali tempore florentis sunt in usu. Crocus censetur optimus qui neque nimis pinguis neque nimis marcidus est: color sit purpureus, ad aureum inclinans, exiguâ quantitate magnam aquæ copiam tingens; sapor amariusculus, & odor fragrans. Colitur in multis regionibus, præfertur Vastiniensis, *le Safran du Gatinois*.

CRUCIATA,

CRUCIATA, *LA CROISETTE.* PL. 235.

Cruciata hirſuta. P. 335. T. 115.
Valantia Cruciata. LIN. SP. 1491.

Tota planta in uſu.

CUBEBÆ, *LES CUBÈBES, LE POIVRE A QUEUE.* PL. 51.

Cubebæ. J. B. 2. 190.
Arbor baccifera braſilienſis, fructu Piper reſipiente. RAJ. HIST. 1593.
Cubebæ vulgares officinarum. GEOF. MAT. MED. *t.* 2. 376.

CUBEBÆ ſunt grana, exiguo donata petiolo, rugoſa, intùs quodammodo cava & parvum nucleum continentia; Piperis magnitudine, coloris fuſci, ſaporis acris, aromatici, ſubamari. Eligantur majores, recentes, ponderoſæ & oleoſæ. È Javâ inſulâ advehuntur.

CUCUMER, *LE CONCOMBRE.* PL. 236.

Cucumis ſativus vulgaris, maturo fructu ſubluteo. P. 310. T. 104.
Cucumis vulgaris. DOD. 662.
Cucumis ſativus. LIN. SP. 1437.

Semina in uſu.

CUCUMER SYLVESTRIS, *LE CONCOMBRE SAUVAGE.* PL. 237.

Cucumis ſylveſtris, Aſininus dictus. P. 314. T. 104.
Momordica Elaterium. LIN. SP. 1434.

Tota planta in uſu.

CUCURBITA, *LA COURGE, ou CALEBASSE.* PL. 238.

Cucurbita oblonga, flore albo, folio molli. P. 313. T. 107.
Cucurbita longior. DOD. 669.
Cucurbita lagenaria. LIN. SP. 1434.

Semina in uſu.

CUMINUM, *LE CUMIN.* PL. 239.

Cuminum ſemine longiore. P. 146.
Fœniculum orientale, Cuminum dictum. T. 312.
Cuminum Cyminum. LIN. SP. 365.

Semina in uſu.

CUPRESSUS, *Le Cyprès*. Pl. 240.

Cupressus. P. 488.
Cupressus metâ in fastigium convolutâ, quæ femina Plinii. T. 587.
Cupressus semper virens. Lin. Sp. 1422.

Nuces, seu *Coni* sunt in usu.

CURCUMA, *Le Safran des Indes*. Pl. 12.

Curcuma, sive Terra Merita officinarum radice crocea. J. B. 2. 746.
Curcuma radice longa. Hort. Lug. Bat. 209.
Curcuma longa. Lin. Sp. 3.

Radices Curcumæ eligantur recentes, ponderosæ, intùs flavæ, non cariosæ, saporis aromatici. Ex Indiâ orientali advehuntur.

CUSCUTA, *La goutte de Lin*. Pl. 241.

Cuscuta major. P. 219. T. 652.
Cassutha. Dod. 554.
Cuscuta Europæa. Lin. Sp. 180.

Est planta parasitica, sine radicibus conspicuis, sine foliis, Linum, Urticam, variasque quas sugit plantas arcto nexu amplectens.

CUSCUTA EPITHYMUM, L'*Épithym*.

Epithymum, sive Cuscuta minor. P. 219. T. 652.
Cuscuta Epithymum. Lin. Sp. 180.

Hæc Cuscutæ species Epithymum vocatur quia Thymo adhæret. Præfertur Italica & Cretica.

CYANUS, *Le Bleuet*. Pl. 242.

Cyanus segetum, flore cæruleo. P. 273. T. 446.
Cyanus flos. Dod. 251.
Centaurea Cyanus. Lin. Sp. 1289.

Flores in usu.

CYCLAMEN, *Le Pain de Pourceau*. Pl. 243.

Cyclamen orbiculato folio; infernè purpurascente. P. 308. T. 154.
Panis porcinus & Arthanita, Rapum terræ. Lob. Icon. 604.
Cyclamen Europæum. Lin. Sp. 207.

Radix in usu.

CYDONIUM, seu COTONEA MALUS, *Le Coignassier*, Pl. 234.

Mala Cotonea majora. P. 434.
Cydonia fructu oblongo leviori. T. 632.
Pyrus Cydonia. Lin. Sp. 687.

Fructus & semina in usu.

CYMBALARIA, *La Cymbalaire.*

Cymbalaria. P. 306.
Linaria hederaceo folio glabro, seu Cymbalaria vulgaris. T. 169.
Antirrhinum Cymbalaria. Lin. Sp. 851.

Tota planta in usu.

CYNOGLOSSUM, *La Cynoglosse.* Pl. 244.

Cynoglossum majus vulgare. P. 257. T. 139.
Cynoglossum. Dod. 54.
Cynoglossum officinale. Lin. Sp. 192.

Folia & radices in usu.

CYNORRHODOS, *Le Rosier sauvage, L'Églantier.* Pl. 496.

Cynorrhodos, seu Cynosbatos. Officinarum.
Rosa sylvestris vulgaris, flore odorato incarnato. P. 483. T. 638.
Rosa canina. Lin. Sp. 704.

Radix, flores & fructus in usu. *Vide* Cynips, in Regno Animali.

CYPERUS LONGUS, *Le Souchet long.* Pl. 13.

Cyperus odoratus radice longâ, sive Cyperus officinarum. P. 14. T. 527.
Cyperus longus. Lin. Sp. 67.

Radix in usu.

CYPERUS ROTUNDUS, *Le Souchet rond.* Pl. 13.

Cyperus rotundus, orientalis major. P. 13.
Cyperus rotundus. Lin. Sp. 67.

Cyperi rotundi radices eligendæ sunt odoratæ, graves, non cariosæ. In Ægypto orientaliumque regionum lacubus ac palustribus locis crescit.

DAUCUS, *LA CAROTTE.* PL. 246.

Daucus sativus radice luteâ & alba. T. 307.
Daucus Carota. LIN. SP. 348.

Radix in usu.

DAUCUS CRETICUS, *LE DAUCUS DE CRÊTE.* PL. 245.

Daucus foliis Fœniculi tenuissimis. P. 150.
Daucus creticus officinarum. TABER. ICON. 75.
Myrrhis annua, semine striato, villoso, incano. MORIS. UMB. 67. T. 315.
Athamanta cretensis. LIN. SP. 352.

DAUCI CRETICI semina sunt oblonga, incana, striata, superiore parte acutiora; saporis acris, aromatici, grati.

DAUCUS SYLVESTRIS, *LA CAROTTE SAUVAGE.*

Pastinaca tenuifolia sylvestris Dioscoridis, vel Daucus officinarum. P. 151.
Daucus vulgaris. CLUS. cxcviij. T. 307.
Daucus Carota. LIN. SP. 348.

Semina in usu. In medio umbellæ, purpureus plerumque reperitur flosculus, qui, Coccinellæ instar, purpureo colore inficere aptus est. *Avicula in nido* vulgò dicitur.

DENS LEONIS, *LE PISSENLIT.* PL. 247.

Dens Leonis latiore folio. P. 126. T. 468.
Dens Leonis. DOD. 636.
Leontodon Taraxacum. LIN. SP. 1122.

Folia & radices in usu.

DICTAMNUS ALBUS, *LA FRAXINELLE, ou DICTAME BLANC.* PL. 14.

Dictamnus albus vulgò, seu Fraxinella. P. 222.
Fraxinella. CLUS. 99. T. 430.
Dictamus albus. LIN. SP. 548.

DICTAMNI ALBI radices sint albicantes, ab interiori parte lignosâ liberæ, non cariosæ. Nascitur in Galliæ, Italiæ, & Germaniæ locis montosis.

DICTAMNUS CRETICUS, *Le Dictame de crête.* Pl. 43.

Dictamnus creticus. P. 222.
Dictamnus cretica, seu vera. J. B. 3. 253.
Origanum creticum latifolium tomentosum, seu Dictamnus creticus. T. 199.
Origanum Dictamnus. Lin. Sp. 823.

Eligenda sunt folia tomentosa, recentia, integra & odorata.

DIGITALIS, *La Digitale.* Pl. 248.

Digitalis purpurea, folio aspero. P. 243.
Digitalis purpurea. Dod. 169. T. 165. Lin. Sp. 866.

Folia in usu.

DIPSACUS, *Le Chardon a Foulon.* Pl. 249.

Dipsacus sativus, (aut sylvestris.) P. 385. T. 466.
Carduus fullonum (& Labrum Veneris.) Lob. Icon. 17, 18.
Dipsacus fullonum. Lin. Sp. 140.

Radix in usu.

DORONICUM ARNICA, *Le Doronic d'Allemagne.* Pl. 15.

Doronicum Plantaginis folio alterum. P. 185. T. 487.
Doronicum Germanicum foliis semper ex adverso nascentibus villosis. J. B. 3. 19.
Alisma. Math. 934.
Arnica montana. Lin. Sp. 1245.

In pratis & locis humidioribus & in montanis tum Germanicis tum Alpinis nascitur. Radix in usu.

DORONICUM ROMANUM, *Le Doronic Romain.* Pl. 15.

Doronicum radice Scorpii. P. 184. T. 487.
Doronicum latifolium. Clus. xvj.
Doronicum Pardalianches. Lin. Sp. 1247.

Eligantur radices albicantes, saporis subdulcis, aromatici, acris. Nascitur in montibus Helvetiæ, Tirolis & Austriæ.

DRACUNCULUS ESCULENTUS, *L'Estragon.* Pl. 252.

Dracunculus hortensis. P. 98.
Abrotanum Linifolio acriori & odorato. T. 459.

Artemisia Dracunculus. LIN. SP. 1189.

Tota Planta in usu.

DRACUNCULUS MAJOR, *LA SERPENTAIRE.* PL. 250.

Dracunculus polyphyllus. P. 195. T. 160.
Dracontium. DOD. 329.
Arum Dracunculus. LIN. SP. 1367.

Folia & radices in usu.

DULCAMARA, *LA DOUCE-AMERE.* PL. 253.

Solanum scandens, seu Dulcamara. P. 167. T. 149.
Solanum Dulcamara. LIN. SP. 264.

Tota planta in usu.

EBULUS, L'*IEBLE.* PL. 254.

Sambucus humilis, sive Ebulus. P. 456. T. 606.
Ebulus, sive Sambucus herbacea. J. B. 1. 546.
Sambucus Ebulus. LIN. SP. 385.

Radix, secundæ cortices, folia & fructus in usu.

ECHIUM, *LA VIPÉRINE.*

Echium vulgare. P. 254. T. 135. LIN. SP. 200.
Buglossum sylvestre. LOB. ICON. 579.
Tota planta in usu.

ELATINE, *LA VELVOTE, LA VÉRONIQUE FÉMELLE.* PL. 255.

Elatine folio subrotundo. P. 252.
Linaria segetum Nummulariæ folio villoso. T. 169.
Veronica femina Fuchsii, sive Elatine. DOD. 42.
Antirrhinum spurium. LIN. SP. 851.

Tota planta in usu.

ELEMI GUMMI, *LA GOMME ÉLÉMI.*

Iccariba. MARCG. BRAS. 98.
Cornus racemosa trifolia, & quinquefolia. PLUM. GEN. *Icon.* 100.
Amyris Elemifera. LIN. SYST. NAT. 266.

GUMMI ELEMI est resina semi diaphana, pinguis, ex flavo albicante

ad viridem colorem inclinans, in maſſam coacta, foliis arundinaceis aliquando involuta, odoris non ingrati. Eligenda odorata, pura & pinguis. Ex Americâ, præſertìm novâ Hiſpaniâ & Carolinâ advehitur.

ENDIVIA, L'ENDIVE. PL. 256.

Intybus ſativa latifolia, ſive Endivia vulgaris. P. 125.
Cichorium latifolium, ſive Endivia vulgaris. T. 479.
Cichorium Endivia. LIN. SP. 1142.

Folia & ſemina in uſu.

ENULA CAMPANA, L'AUNÉE. PL. 257.

Helenium vulgare. P. 276.
Aſter omnium maximus, Helenium dictus. T. 483.
Inula Helenium. LIN. SP. 1236.

Radix in uſu.

EQUISETUM, *LA PRÊLE, ou QUEUE DE CHEVAL.* PL. 258.

Equiſetum arvenſe longioribus ſetis. P. 16. T. 533.
Hippuris minor. DOD. 73.
Equiſetum arvenſe. LIN. SP. 1516.

Tota planta in uſu.

ERUCA SATIVA, *LA ROQUETTE DES JARDINS.* PL. 259.

Eruca latifolia, alba, ſativa, Dioſcoridis. P. 98. T. 227.
Sinapi alterum genus. FUCHS. 539.
Braſſica Eruca. LIN. SP. 932.

Folia & ſemina in uſu.

ERUCA SYLVESTRIS, *LA ROQUETTE SAUVAGE.* PL. 260.

Sinapi Erucæ folio. P. 99.
Eruca tenuifolia, perennis flore luteo. J. B. 2. 861. T. 227.
Eruca ſylveſtris major, vulgaris fetens. MORIS. 2. 230. *ſ.* 3. *t.* 6. *f.* 3.
An? Siſymbrium tenuifolium. LIN. SP. 917.

ERUCA SYLVESTRIS, ſapore fervidior, acrior, odoreque ſingulari donata, ſativæ præfertur.

ERYNGIUM, *LE CHARDON ROLAND.* PL. 261.

Eryngium vulgare. P. 386. T. 327. J. B. 3. 85.

Eryngium campestre. DOD. 730. LIN. SP. 337.
Radices in usu.

ERYNGIUM MARINUM, *Le Panicaut de mer.* PL. 262.

Eryngium maritimum. P. 386. T. 327. LIN. SP. 337.
Radices in usu.

ERYSIMUM, *Le Vélard, ou La Tortelle.* PL. 263.

Erysimum vulgare. P. 100. T. 228.
Erysimum officinarum. LIN. SP. 922.
Tota planta in usu.

ESULA MAJOR, *La grande Ésule.* PL. 265.

Tithymalus foliis Pini, fortè Dioscoridis Pithyusa. P. 292. T. 86.
Tithymalus Pinea. LOB. ICON. 357.
Euphorbia Esula. LIN. SP. 660.
Radicis cortex in usu.

ESULA MINOR, *La petite Ésule.* PL. 264.

Tithymalus Cyparissias. P. 291. T. 86.
Esula officinarum. CÆSALP. 374.
Euphorbia Cyparissias. LIN. SP. 661.

Hæ duæ species ESULÆ indiscriminatim sumuntur.

EUPATORIUM CANNABINUM, *L'Eupatoire.* PL. 266.

Eupatorium Cannabinum. P. 320. T. 456. LIN. SP. 1173.
Vulgare Eupatorium. DOD. 28.
Tota planta in usu.

EUPHORBIUM, *L'Euphorbe.* PL. 100.

Euphorbium. P. 387.
Ephorbium cerei effigie, caulibus crassioribus spinis validioribus armatum. COMM. HORT. AMST. *tom.* I. *pag.* 21.
Euphorbia officinarum. LIN. SP. 647.

EUPHORBIUM est substantia gummosa, in guttis sive granis pallescentibus, saporis acerrimi, urentis ac nauseosi. Eligatur albicans, & in granis majoribus. Ex Indiæ orientalis regionibus advehitur. *Non sine sternutatione molestâ contunditur, nisi naribus obturatis.*

EUPHRASIA,

EUPHRASIA, L'*Euphraise*, Pl. 267.

Euphrasia officinalis. P. 233. T. 174. Lin. Sp. 841.
Folia & flores in usu.

FABA, *La Feve de marais, ou grosse Feve.* Pl. 268.

Faba flore candido, lituris nigris conspicuo. P. 338. T. 391.
Faba major recentiorum. Lob. Icon. 57.
Vicia Faba. Lin. Sp. 1039.
Fructus & ejus farina in usu.

FABA SANCTI IGNATII, *La Feve de St. Ignace.* Pl. 74.

Faba indica, sive Faba febrifuga. Officinarum.
Cucurbitifera Malabathri foliis scandens, Catalongay & Cantara dicta....
Pluk. *Mantissâ.* G. Camelli. Phil. Trans. *N.*° 250. *p.* 88.

Fabæ indicæ, *Igasur* dictæ, sunt nuclei subrotundi, inæquales, nucis Avellanæ magnitudinis, durissimi, corneæ quasi substantiæ nucis Vomicæ instar; saporis valdè amari, coloris glauci. Reperiuntur in pulpâ fructûs Melonem simulantis. È Philippinis insulis advehuntur.

FAGOPYRUM, *Le Bled noir, ou Sarrasin.* Pl. 269.

Erysimum Theophrasti, folio Hederaceo. P. 27.
Frumentum Sarracenicum. Math. 394.
Fagopyrum vulgare erectum. T. 511.
Polygonum Fagopyrum. Lin. Sp. 522.
Semina in usu.

FICUS, *Le Figuier.* Pl. 50.

Ficus communis. P. 457.
Ficus sativa. T. 662.
Ficus Carica. Lin. Sp. 1513.

Vocabulum Ficus in officinis, fructum recentem denotat; Carica verò, ficum *passam* vel exsiccatam. Caricæ eligantur recentes & pingues; è calidioribus regionibus afferuntur.

FILIPENDULA, *La Filipendule.* Pl. 270.

Filipendula vulgaris, an Molon Plinii? P. 163. T. 293.
Spiræa Filipendula. Lin. Sp. 702.
Radices & folia in usu.

FILIX FEMINA, *La Fougere commune, ou femelle.* Pl. 272.

Filix ramosa major, pinnulis obtusis, non dentatis. P. 357. T. 536.
Filix femina. Dod. 462. Fuchs. 596.
Pteris Aquilina. Lin. Sp. 1533.

Radix & folia in usu.

FILIX MAS, *La Fougere male.* Pl. 271.

Filix non ramosa dentata. P. 358. T. 536.
Filix vulgò Mas dicta, sive non ramosa. J. B. 3. 737.
Polypodium Filix mas. Lin. Sp. 1551.

In usum vocari solent radices illius speciei quæ *Filix femina* dicitur.

FILIX FLORIDA, L'*Osmonde.* Pl. 273.

Filix ramosa, non dentata, florida. P. 357.
Filix palustris. Dod. 463.
Osmunda vulgaris & palustris. T. 547.
Osmunda Regalis. Lin. Sp. 1521.

Radices, fructus & summitates in usu.

FŒNICULUM, *Le Fenouil.* Pl. 274.

Fœniculum vulgare germanicum. P. 147. Dod. 297. T. 311.
Anethum Fœniculum. Lin. Sp. 377.

Radix, folia & semina in usu.

FŒNICULUM DULCE, *Le Fenouil doux.*

Fœniculum dulce. P. 147.
Fœniculum dulce, majore & albo semine. T. 311.
Anethum Fœniculum. Lin. Sp. 377.

Varietas est præcedentis. Semen ex Italiâ advehitur; eligendum recens & aromaticum.

FŒNUM GRÆCUM, *Le Fénugrec.* Pl. 175.

Fœnum græcum sativum. P. 348. Dod. 536. T. 409.
Trigonella Fœnum-Græcum. Lin. Sp. 1095.

Semina in usu.

FOLIUM INDUM, seu MALABATHRUM, *Feuille indienne.* Pl. 42.

Cinnamomum, seu Canella Malabarica, seu Javanensis. P. 409.

Malabathrum, & *folium Indum officinarum*. J. B. 1. 430.
Canella ſylveſtris Malabarica. RAJ. HIST. 1562.
Laurus Caſſia. LIN. SP. 528.

Veterum MALABATHRUM planè incognitum eſt; recentiorum verò, ſunt folia CANELLÆ MALABARIÆ (*Katou-Karva*. RHEED. MALAB.) oblonga, acuminata, denſa & glabra, à pediculo ad apicem tribus nervis excurrentibus donata. Eligenda recentia, viridiuſcula & odorata.

FRAGARIA, *LE FRAISIER*. PL. 276.

Fragaria vulgaris. P. 326. T. 295.
Fragaria veſca. LIN. SP. 708.

Radices, folia & fructus in uſu.

FRANGULA, *LA BOURGENE*, *ou AULNE NOIR*.

Alnus nigra baccifera. P. 428.
Frangula. DOD. 784. T. 612.
Rhamnus Frangula. LIN. SP. 280.

Cortex in uſu.

FRAXINUS, *LE FRÊNE*. PL. 277.

Fraxinus excelſior. P. 416. T. 577. LIN. SP. 1509.

Cortex, lignum & ſemina in uſu. Semen, *Lingua avis* ſeu *Ornithogloſſum*, in officinis dicitur.

FULIGO, *LA SUIE DE CHEMINÉE*.

Eligatur FULIGO ſplendens & è ligno combuſto coloribus metallicis non infecto, producta.

FUMARIA, *LE FUMETERRE*. PL. 278.

Fumaria officinarum, *Dioſcoridis*. P. 143. T. 422. LIN. SP. 984.

Tota planta floreſcens in uſus.

GALANGA MAJOR, *LE GRAND GALANGA*.

Galanga major. P. 35.
Wanbon. KÆMPF. AMŒN. EXOT. 901.
Kæmpferia Galanga. LIN. SP. 3.

GALANGÆ MAJORIS radices ſunt nodoſæ, geniculatæ, ruſeſcentes foris, intùs pallidæ, odoratæ, ſaporis aromatici fervidi. Eligantur ponderoſæ, non carioſæ. In regno Siam colitur.

GALANGA MINOR, *Le petit Galanga.*

Galanga minor officinarum. P. 35.
Maranta. Plum. Gen. 36.
Maranta Galanga. Lin. Sp. 3.

Galangæ minoris radices, cum radicibus *Galangæ majoris* ſatis conveniunt, at minores ſunt. Eligantur ponderoſæ, non fibroſæ, odoratæ, non carioſæ. Hæc planta in Chinâ ſponte naſcitur.

GALBANUM. *Le Galbanum.* Pl. 101.

Galbanum. P. 494.
Oreoſelinum africanum Galbaniferum, fruteſcens, Aniſi folio. T. 319.
Ferula africana Galbanifera, folio & facie Liguſtici. Herm. Parad. 163.
Bubon Galbanum. Lin. Sp. 364.

Galbanum eſt ſuccus gummoſo-reſinoſus, in grumos condenſatus, coloris flaveſcentis, ſubfuſci, ſaporis amaricantis, acris, odoris gravis. Galbanum in granis optimum cenſetur. Ex orientalibus regionibus Arabiâ & Syriâ advehitur.

GALEGA, *Le Galéga.* Pl. 280.

Ruta capraria. Officinarum.
Galega vulgaris. P. 352. T. 398.
Galega officinalis. Lin. Sp. 1062.

Tota planta in uſu.

GALLIUM ALBUM, *Le Caillelait blanc.* Pl. 285.

Gallium album vulgare. T. 115.
Galium Mollugo. Lin. Sp. 155.

Summitates florentes in uſu.

GALLIUM LUTEUM, *Le Caillelait jaune.* Pl. 284.

Gallium Luteum. P. 335. T. 115.
Galium verum. Lin. Sp. 155.

Summitates florentes in uſu.

GENISTA VULGARIS, *Le Genêt commun.* Pl. 286.

Geniſta anguloſa & ſcoparia. P. 395.

Cytiso-Genista, scoparia, vulgaris flore luteo. T. 649.
Spartium scoparium. LIN. SP. 996.

Tota planta in usu.

GENISTA HISPANICA, *LE GENÊT D'ESPAGNE.* PL. 286.

Spartium arborescens, seminibus Lenti similibus. P. 396.
Genista Juncea. T. 643.
Spartium Junceum. LIN. SP. 995.

Tota planta in usu.

GENTIANA, *LA GENTIANE.* PL. 16.

Gentiana major lutea. P. 187. T. 80. DOD. 342.
Gentiana lutea. LIN. SP. 329.

GENTIANÆ radices eligantur recentes, ponderosæ, crassæ, foris fuscæ, intùs ex flavo rufescentes, saporis intense amari. In Galliæ, Helvetiæ, &c. montibus nascitur.

GERANIUM COLUMBINUM, *LE PIED DE PIGEON.* PL. 287.

Geranium folio Malvæ rotundo. P. 318. T. 268.
Pes Columbinus. DOD. 61.
Geranium rotundifolium. LIN. SP. 957.

Folia in usu.

GERANIUM ROBERTIANUM, *L'HERBE A ROBERT.* PL. 288.

Geranium Robertianum primum. P. 319. T. 268.
Rupertiana. CÆSALP. 359.
Geranium Robertianum. DOD. 62. LIN. SP. 955.

Folia in usu.

GERANIUM SANGUINEUM. *LE BEC DE GRUE SANGUIN.* PL. 289.

Geranium sangineum, maximo flore. P. 318. T. 267.
Geranium septimum hæmatodes. CLUS. *cij.*
Geranium sanguineum. LIN. SP. 958.

Folia in usu.

GINS-ENG, *LE GENSENG.* PL. 27.

Aureliana canadensis Iroquæis garentogen, *Sinensibus* Gins-Eng. LAF. 51.

Araliastrum foliis ternis quinque partitis, Ginseng, *seu* Ninsin *officinarum*. TREW. *t.* 6.

Panax quinquefolium. LIN. SP. 1512.

Nascitur in Canadâ. *Vide NIN-ZIN.*

GLASTUM, *LE PASTEL.*

Isatis sativa, vel latifolia. P. 113. T. 211. DOD. 79.
Isatis, sive Glastum. J. B. 2. 909.
Isatis tinctoria. LIN. SP. 936.

Herba in usu.

GLYCYRRHIZA, *LA RÉGLISSE.* PL. 17.

Glycyrrhiza siliquosa, vel Germanica. P. 352. T. 389.
Glycyrrhiza vulgaris. DOD. 341.
Liquiritia. BRUNF.
Glycyrrhiza glabra. LIN. SP. 1046.

GLYCYRRHIZÆ radices eligendæ recentes, non cariosæ, flavescentes, sapore dulces.

SUCCUS LIQUIRITIÆ decoctione è radicibus extrahitur, & ignis calore inspissatur. Præsertìm ex Hispaniâ in laterculos aut rotulas Sole siccatas adfertur : eligatur purus qui totus in aquâ solvitur.

GNAPHALIUM, PES CATI, *LE PIED DE CHAT.* PL. 290.

Hispidula & Æluropus. Officinarum.
Gnaphalium montanum, flore rotundiore. P. 263.
Elychrysum montanum, flore rotundiore & longiore. T. 453.
Gnaphalium dioïcum mas. LIN. SP. 1199.

Flores in usu.

GRAMEN CANINUM, *LE CHIENDENT*, (*Gramen Loliaceum.*) PL. 291.

Gramen caninum arvense, sive Granum Dioscoridis. P. 1.
Gramen Loliaceum radice repente, sive Gramen officinarum. T. 516.
Triticum repens. LIN. SP. 128.

Radices in usu.

GRAMEN DACTYLON, *LE CHIENDENT PIED DE POULE.* PL. 292.

Gramen Dactylon folio arundinaceo majus : aculeatum fortè Plinii. P. 7.

Gramen Dactylon, radice repente, ſive officinarum. T. 520.
Gramen legitimum. CLUS. *ccxvij.*
Panicum Dactylon. LIN. SP. 85.

Hæc ſola ſpecies, in calidioribus regionibus, venit in uſum.

GRATIOLA, L'*HERBE A PAUVRE HOMME.* PL. 293.

Gratiola Centauroides. P. 279.
Digitalis minima Gratiola dicta. MORIS. 2. 579. *ſ.* 5. *t.* 8. *f.* 7. T. 165.
Gratia Dei. CÆSALP. 265.
Gratiola officinarum. LIN. SP. 24.

Radix & folia in uſu.

GROSSULARIA NIGRA, *LE GROSEILLIER NOIR, LE CASSIS,* PL. 295.

Groſſularia non ſpinoſa fructu nigro. P. 455. T. 640.
Ribes nigrum vulgò dictum, folio olente. J. B. 2. 98.
Ribes nigrum. LIN. SP. 291.

Folia & fructus ſunt in uſu.

GROSSULARIA RIBES, *LE GROSEILLIER ROUGE.* PL. 294.

Groſſularia multiplici acino, ſive non ſpinoſa, hortenſis rubra, ſive Ribes officinarum. P. 455. T. 639.
Ribeſium fructu rubro. DOD. 749.
Ribes rubrum. LIN. SP. 290.

Fructus ſunt in uſu.

GROSSULARIA SPINOSA, *LE GROSEILLIER BLANC ÉPINEUX.* P. 294.

Groſſularia ſimplici acino, vel ſpinoſa ſylveſtris. P. 455. T. 639.
Ribes Uva criſpa. LIN. SP. 292.

Fructus in uſu.

GUAJACUM, *LE GAYAC,* PL. 38.

Guajacum magnâ matrice. P. 448.
Guajacum flore cæruleo, fructu ſubrotundo. PLUM. GEN. 39.
Guajacum officinale. LIN. SP. 546.

GUAJACUM eſt lignum ſolidum, denſum, aquâ ponderoſius, ni-

gricans intùs, foris buxeum; odoris dum comburitur resinoso-suavis; saporis aromatici, miti cum acrimoniâ palatum ac fauces pungens: eligatur alburno mundatum. Arbor in Hispaniolâ, Jamaicâ & variis Americæ regionibus crescit.

CORTICES eligendi duriusculi, tenues, lignosi, cinerei, maculati, interiùs pallidi, lamellatim congesti, saporis amaricantis, aromatici.

LIGNUM SANCTUM (*Guajacum sanctum.* LIN. SP. 547.) & *Guajacum officinarum* sunt arbores inter se specie diversæ. Præfertur *Guajacum*.

GUAJACUM GUMMI, ex utrâque arbore exsudat, est lachryma resinosa, arida, dura; coloris viridescentis, fusci; saporis acris; odoris ferè nullius. Eligendum in minoribus frustis, corticibus *Guajaci* adhærentibus.

GUMMI GUTTA, *LA GOMME GUTTE*, (*Carcapulli.*) PL. 105.

Succus laxativus ex flavo rufescens. P. 497.
Carcapulli. PARK. 1635.
Coddam-Pulli. RHEED. MAL. I. *t.* 24.
Cambogia Gutta. LIN. SP. 728.

GUMMI GUTTA est succus gummoso-resinosus, flavus, è sauciato arboris trunco manans. Vel in cylindros efformatus, vel in baccilis cerei instar contortis, ad nos ex Indiis mittitur.

HEDERA ARBOREA, *LE LIERRE.* PL. 85.

Hedera arborea, P. 305. T. 613.
Hedera helix. LIN. SP. 292.

HEDERA ARBOREA passim ad arbores nascitur, nunc scandens & fertilis, nunc repens & sterilis.

Lacryma seu GUMMI HEDERÆ est arida resplendescens, saporis acris & subastringentis, coloris ut plurimùm fusci, ferè nigri. È calidioribus regionibus advehitur.

HEDERA TERRESTRIS, *LE LIERRE TERRESTRE.* PL. 296.

Hedera terrestris vulgaris. P. 306.
Calamintha humilior, folio rotundiore. T. 194.
Glechoma Hederacea. LIN. SP. 807.

Herba in usu.

HELIANTHEMUM,

HELIANTHEMUM, L'*Herbe d'or.* Pl. 297.

Chamæciſtus vulgaris flore luteo. P. 465.
Helianthemum vulgare flore luteo. J. B. 2. 15. T. 248.
Flos Solis. Dod. 193.
Ciſtus Helianthemum. Lin. Sp. 744.
Radix & folia in uſu.

HELIANTHEMUM TUBEROSUM, *Les Topinambours.* Pl. 298.

Helianthemum tuberoſum indicum. P. 277.
Corona Solis parvô flore, tuberoſâ radice. T. 489.
Helianthus tuberoſus. Lin. Sp. 1277.
Radix eſt in uſu.

HELIOTROPIUM, L'*Herbe aux Verrues.* Pl. 299.

Heliotropium majus Dioſcoridis. P. 253. T. 139.
Heliotropium, officinis, Verrucaria ſcorpioïdes. Adv. Lob. 100.
Heliotropium Europæum. Lin. Sp. 187.
Herba eſt in uſu.

HELLEBORUS ALBUS, L'*Hellébore blanc.* Pl. 18.

Helleborus albus flore ſubviridi. P. 186.
Veratrum flore ſubviridi. T. 273.
Veratrum album. Lin. Sp. 1479.
Radix in uſu.

HELLEBORUS NIGER, L'*Hellébore noir.* Pl. 19 & 20.

I. Helleborus niger flore roſeo. P. 186.
Veratrum nigrum. Dod. 385.
Helleborus niger, anguſtioribus foliis. T. 271.
Helleborus niger. Lin. Sp. 783.
Radix in uſu.

II. Helleborus niger hortenſis, flore viridi. P. 185. T. 272.
Helleborum nigrum alterum. Camer. Epist. 941.
Helleborus viridis. Lin. Sp. 784.

Hæ duæ Hellebori nigri ſpecies indiſcriminatìm adhibentur.

HEPATICA FONTANA, L'*Hépatique d'eau.* Pl. 300.

Lichen petræus latifolius, ſeu Hepatica fontana. P. 362.

Lichen. DOD. 473. FUCHS. 179.
Marchantia major. MICHEL. GEN. 2. *t.* 1. *f.* 1.
Marchantia polymorpha. LIN. SP. 1603.

In umbrosis, humidis & petrosis locis, in puteis & circa fontes nascitur. Herba est in usu.

HEPATICA NOBILIS, L'*HÉPATIQUE DES FLEURISTES.* PL. 301.

Trifolium Hepaticum flore simplici. P. 330.
Trifolium magnum, sive aureum, quod Hepatica nobilis. TRAG. 519.
Ranunculus tridentatus vernus, flore simplici cæruleo. T. 286.
Anemone Hepatica. LIN. SP. 758.

Herba in usu.

HERBA PARIS, *LE RAISIN DE RENARD.* PL. 302.

Solanum quadrifolium bacciferum. P. 167.
Herba Paris. DOD. 444. T. 233. J. B. 3. 613.
Paris quadrifolia. LIN. SP. 526.

Herba in usu.

HERMODACTYLUS, L'*HERMODACTE.*

Iris tuberosa, folio anguloso. P. 40.
Hermodactylus verus. MATH. 1109.
Hermodactylus folio quadrangulo. T. COR. 50.
Iris tuberosa. LIN. SP. 58.

HERMODACTYLI sunt radices *Iridis tuberosæ*: eligantur integri, ponderosi, non cariosi, solidi, oblongi, rotundi, lati & quasi compressi, cordis figuram referentes, intùs albi, saporis subdulcis, odoris nullius. Ex Syriâ, Smirnâ & Alepo advehuntur.

MATHIOLUS acerrimè reprehendit eos qui radices *Colchici* pro *Hermodactylis* venditant. » Accepi, inquit, hanc plantam à *D. AUGERIO DE BUSBEKE* Flandro, qui illam Constantinopoli secum attulit, ubi continuo septennio apud *SOLIMANUM* Turcarum Imperatorem, *FERDINANDI* Cæsaris oratorem egit ».

HERNIARIA, *LA TURQUETTE.* PL. 303.

Herniaria glabra, (& hirsuta.) J. B. 3. 378. T. 507. LIN. SP. 317.
Empetrum. TRAG. 527.

Herniaria. DOD. 114.
Herba Turca. LOB. ICON. 421.
Herba in uſu.

HORDEUM, L'*ORGE ou SCOURGEON*. PL. 304.

I. Soucrion. Noſtratibus.
Hordeum Polyſtichum hybernum. P. 22. T. 513.
Hordeum Polyſtichum, hybernum majus. TABER. ICON. 274.
Hordeum vulgare. LIN. SP. 125.

II. Pamel. Vernacule.
Hordeum Diſtichon, quod ſpica binos ordines habeat Plinio. P. 23. T. 513.
Hordeum Diſtichon, æſtivum, trimeſtre minus. TABER. ICON. 274.
Hordeum Diſtichon. LIN. SP. 125.

Præfertur prior ſpecies. Ex his paratur *Hordeum mundum* & *Perlatum.*

HORMINUM, L'*ORVALE*, *LA TOUTE-BONNE*. PL. 305.

Horminum Sclarea dictum. P. 238.
Orvala. DOD. 292.
Sclarea. TABER. ICON. 373. T. 179.
Salvia Sclarea. LIN. SP. 38.
Herba in uſu.

HORMINUM SATIVUM, L'*HORMIN*.

Horminum ſativum. P. 238. MATH. 887. DOD. 294.
Horminum comâ purpuro-violaceâ. J. B. 3. 309. T. 178.
Horminum ſativum, genuinum Dioſcoridis. PARK. 56.
Salvia Horminum. LIN. SP. 34.
Præfertur prima HORMINI ſpecies. Herba eſt in uſu.

HYOSCIAMUS ALBUS, *LA JUSQUIAME BLANCHE*. PL. 307.

Hyoſciamus major albus. P. 169. T. 118.
Hyoſciamus albus. J. B. 3. 627. DOD. 451. LIN. SP. 257.
Folia, flores & ſemina in uſu.

HYOSCIAMUS NIGER, *LA JUSQUIAME NOIRE*, ou *HANNEBANE*. PL. 306.

Hyoſciamus vulgaris vel niger. P. 169. T. 118.
Hyoſciamus niger. DOD. 450. RAJ. HIST. 711. LIN. SP. 257.
Uſus ut prior. Cave ab uſu interno.

HYPERICUM, *Le Mille-pertuis.* Pl. 308.

Hypericum vulgare. P. 279. T. 254.
Hypericum perforatum. Lin. Sp. 1105.

Folia, flores & ſemina in uſu.

HYPOCISTIS, L'*Hypociste.* Pl. 109.

Hypociſtis. P. 465.
Hypociſtis Cretica flore purpureo. T. Cor. 46.
Azarum Hypociſtis. Lin. Sp. 633.

Succus Hypocistidis eſt niger, auſtero-acidus: eligatur non aduſtus. È Galliâ Narbonenſi, Provinciâ, & Cretâ aſportatur. Planta paraſitica eſt & ad Ciſti Monſpelienſis, & Ladaniferi baſim creſcit.

HYSSOPUS, L'*Hysope*, Pl. 309.

Hyſſopus officinarum cærulea, ſeu ſpicata. P. 217. T. 200.
Hyſſopus vulgaris. Dod. 287.
Hyſſopus officinalis. Lin. Sp. 796.

Herba & flores in uſu.

JACOBÆA, *La Jacobée.* Pl. 311.

Jacobæa vulgaris laciniata. P. 131. T. 485.
Senecio Jacobæa. Lin. Sp. 1219.

Herba in uſu.

JALAPPA, *Le Jalap.* Pl. 20.

Bryonia Mechiocana nigricans. P. 298.
Convolvulus americanus, Jalapium dictus. Raj. Hist. 724.
Convolvulus Jalapa. Lin. Mant. 43.

Nota. Hæc planta eſt vera *Jalappa officinarum* teſte *Millero* qui hujus radices ab *Houstono* accepit & Pharmacopolis Londinenſibus vendidit.

Jalappæ radices ſunt oblongæ, orbiculatim inciſæ: eligantur nigricantes, reſinoſæ, ponderoſæ, non carioſæ, quæ candelæ admotæ mox accenduntur. È Mexico advehuntur.

ILEX ACULEATA, *Le Chêne verd du Kermès.* Pl. 117.

Ilex aculeata cocciglandifera. P. 425. T. 583.

Quercus coccifera. LIN. SP. 1413.

È puncturâ & depositione ovorum *Cocci* in foliis Ilicis, nascuntur Insecta, in officinis GRANA KERMES dicta. *Vide* COCCUS in Regno Animali.

IMPERATORIA, L'*IMPÉRATOIRE*. PL. 22.

Imperatoria major. P. 156. T. 317.
Imperatoria ostruthium. LIN. SP. 371.

Radix in usu.

IPECACUANHA, L'*IPÉCACUANHA*.

Ipecacuanha. PISON. 231.

Tres vulgò recensentur IPECACUANHÆ species; *cineritia* seu vulgaris, *fusca* sive *nigra*, & *candida*. Ex his, præsertim cineritia & fusca in usum vocantur. Eligantur radices à fibris mundatæ, asperæ, multis annulis donatæ, tenaces, compactæ, resinosæ, cum nervo exiguo radicis meditullium occupante. IPECACUANHA cineritia ex Peru, fusca ex Brasiliâ advehitur.

IRIS FLORENTINA, L'*IRIS DE FLORENCE*. PL. 23.

Iris alba Florentina. P. 31. T. 358.
Iris Florentina. LIN. SP. 55.

Radices IRIDIS FLORENTINÆ eligantur albæ, longiores, crassæ non cariosæ, odore Violas martias æmulantes. Ex Italiâ, Rhodo insulâ, Cypro & Dalmatiâ advehuntur.

IRIS NOSTRAS, *LE GLAYEUL, ou LA FLAMME*. PL. 23.

Iris vulgaris Germanica, sive sylvestris. P. 30. T. 358.
Iris purpurea sive vulgaris. PARK. PAR. 181.
Iris Germanica. LIN. SP. 55.

Radix & flores in usu.

JUGLANS, *LE NOYER*. PL. 312.

Nux Juglans, sive Regia vulgaris. P. 417. T. 581.
Juglans Regia. LIN. SP. 1415.

Nuces in usu.

JUJUBÆ, *LES JUJUBES*. PL. 48.

Jujubæ majores oblongæ. P. 446.

Zizyphus. DOD. 807. T. 627.
Rhamnus Zizyphus. LIN. SP. 282.

JUJUBÆ ſunt fructus olivaris magnitudinis, coloris rubri, ſaporis dulcis & mucilaginoſi, continentes oſſiculum unicum: eligantur recentes & ſucculentæ. Ex Italiâ & Provinciâ aſportantur.

JUNCUS ODORATUS, *LE JONC ODORANT.* PL. 41.

Juncus odoratus, aromaticus. P. 11.
Schœnanthus, ſive Juncus odoratus. J. B. 2. 515.
Andropogon Schœnanthus. LIN. SP. 1481.

Eligendus culmus cum floribus ſeu ſpicis: ſaporis eſt acris, amaricantis ſed ſuavis, odoris fragrantis. Ex Arabiâ & Indiâ advehitur.

JUNIPERUS, *LE GENIÈVRE.*

Juniperus vulgaris fruticoſa. P. 488. T. 588.
Juniperus. LOB. ICON. 222.
Juniperus communis. LIN. SP. 1470.

LIGNUM JUNIPERI odoratum eſt & *Cedrus noſtras* dicitur. BACCÆ exiguæ, virides, menſe junio enaſcentes, altero demùm anno cæruleo tinguntur colore, matureſcunt autumno. Eligantur maturæ, nigræ, rotundæ & reſinoſæ.

JUNIPERUS MAJOR, *LE CADE.* PL. 88.

Juniperus major, baccâ rufeſcente. P. 489. T. 589.
Juniperus major Monſpelienſium. LOB. ICON. 223.
Juniperus Oxycedrus. LIN. SP. 1470.

GUMMI JUNIPERINUM, SANDARACHA aut VERNIX SICCA dictum, eſt reſina Maſtiches inſtar pellucida, guttas tamen majores & longiores formans, friabilis, ſaporis reſinoſi, odoris dùm accenditur ſuavis. Ex Africâ advehitur, quamvis *Juniperus major* in Galliâ Narbonenſi & Hiſpaniâ familiaris ſit.

KALI, *LA SOUDE ORDINAIRE.* (*Soda cochleato ſemine.*) PL. 559.

Kali majus cochleato ſemine. P. 289. T. 247.
Kali. DOD. 81.
Salſoſa Soda. LIN. SP. 323.

In littoribus maris naſcitur. Planta in uſu.

KALI HISPANICUM, *LA SOUDE D'ALICANTE.*

Kali minus alterum. P. 289.

Kali hispanicum, supinum, annum, Sedi foliis brevioribus. ACT. SCIENT. 1715.
Salsosa sativa. LIN. SP. 323.

È KALI HISPANICO combusto & incinerato SODA paratur. Eligatur cæruleo-cinerea, sicca, tinniens, porosa, odoris paludosi madefacta expers. Ex Alonio Valentiæ portu advehitur. Cum sale Sodæ & Oleo parantur SAPONES varii, nempe Sapo albus, *le Savon blanc*, Sapo niger *le Savon noir ordinaire*, &c.

KEIRI, *LE GIROFLIER JAUNE*, *Nostratibus MURÉ.* PL. 313.

Leucoium luteum vulgare. P. 202. T. 221.
Leucoium luteum, vulgo Cheiri, flore simplici. J. B. 2. 872.
Cheiranthus Cheiri. LIN. SP. 924.

Folia, flores & semina in usu.

KINA-KINA, *LE QUINQUINA.* PL. 36.

Arbor febrifuga Peruviana. RAJ. HIST. 1796.
Kinkina. ACT. SCIENT. 1738.
Cinchona officinalis. LIN. SP. 244.

CORTEX PERUVIANUS seu KINA-KINA, eligatur è fusco rufescens, amarus, sine molestiâ astringens, non nimis crassus; sulcis transversis profundioribus, longitudinalibus verò superficiariis, musco cinereo quandoque obductis donatus. È junioribus arboribus in Peruvianis montibus detrahitur.

LABDANUM, *LE LABDANUM:* PL. 86.

Cistus Ledon cretense. P. 467.
Cistus Labdanifera cretica flore purpureo. T. COR. 19.
Cistus creticus. LIN. SP. 738.

LABDANUM seu LADANUM est substantia resinosa, nigricans, terrâ permixta, in spiras cereorum instar contorta, saporis amari, super prunas suavem odorem spargens. Eligendum resinosum pingue, in flammabile & odoratum. In Candiâ, Cypro & Græciâ copiosus est Cisti Ladaniferi proventus.

LACCA GUMMI, *LA GOMME LAQUE.*

I. *Lacca officinarum.* P. 499. *Jujuba indica.* P. 446.
Ber indica fructu Jujubino. J. B. 1. 44.
Rhamnus Jujuba. LIN. SP. 282.

II. Ricinus aromaticus spicatus, folio Circææ, spinis ad imum duplicatis armato, Laccam in granis fundens. PLUK. ALM. 320.
Croton Lacciferum. LIN. SP. 1426.

Tres in officinis reperiuntur Laccæ species, in ramulis seu *bacillis*, in *granis* & in *tabulis*.

LACCA IN BACILLIS, *Laque en bâtons*, ita dicitur quia parvis arboris ramulis adhæret. Substantiâ suâ resinosâ, fuscâ, superficie inæquali quasi granulatâ baculos circumcludit. Saporis est subastringentis, parùm resinosi, odoris dùm accenditur grati.

LACCA IN GRANIS, *Laque en grains*, grana sunt pellucida, rubicunda, dura & friabilia; odoris & saporis præcedentis.

LACCA IN TABULIS, *Laque en masse*, è Laccâ in granis liquatâ, à fecibus purgatâ & in massas fusâ, conficitur; pellucida est ac rubra. Advehitur Lacca è regnis Pegu & Martabani in Indiâ orientali. Usui Medico Lacca in *bacillis* venit; *in granis* ad vernicis, in *tabulis* ad sigillatoriæ Laccæ confectionem expetitur.

LACTUCA, *LA LAITUE*, PL. 314 & 315.

Lactuca sativa, (capitata, & non capitata.) P. 122. T. 473. LIN. SP. 1118.

Herba & semina in usu.

LACTUCA SYLVESTRIS, *LA LAITUE SAUVAGE.* PL. 316.

Lactuca sylvestris costa spinosa. P. 123. T. 473.
Lactuca Scariola. LIN. SP. 1119.

Herba in usu.

LAMIUM ALBUM, L'*ORTIE BLANCHE.* PL. 317.

Lamium album non fetens folio oblongo. P. 231.
Lamium vulgare album, sive Archangelica, flore albo. T. 183.
Lamium album. LIN. SP. 809.

Folia & flores in usu.

LAMIUM FETIDUM, L'*ORTIE PUANTE.* PL. 319.

Lamium purpureum fetidum, folio subrotundo, sive Galeopsis Dioscoridis. P. 230. T. 183.
Urtica iners altera. DOD. 153.

Lamium

Lamium purpureum. LIN. SP. 809.

Herba in uſu.

LAPATHUM, *LA PATIENCE, ou PARELLE.* PL. 324 & 326.

Lapathum folio acuto plano. P. 115. T. 504.
Lapathum ſylveſtre, ſive Oxylapathum. DOD. 648.
Rumex acutus. LIN. SP. 478.

Variat foliis acutis aut criſpis. Folia & radices in uſu.

LAPATHUM AQUATICUM, *LA PATIENCE D'EAU, ou PARELLE DES MARAIS.* PL. 327.

Lapathum aquaticum, folio cubitali. P. 116. T. 504.
Britannica antiquorum vera. MUNT. PHYT. 202. & BRIT. *t.* 1.
Rumex aquaticus. LIN. SP. 479.

LAPATHI caulis in locis ſiccis, juxtà radicem, rubicundior eſt, & radix flavior; at vix à ſequenti, niſi culturâ, differt. Folia & radices ſunt in uſu.

LAPATHUM MAJUS, *LA RHUBARBE DES MOINES.* PL. 29.

Lapathum hortenſe latifolium. P. 115. T. 504.
Lapathum majus, ſive Rhabarbarum Monachorum. J. B. 2. 985.
Rumex Patientia. LIN. SP. 476.

Radix in uſu.

LAVANDULA MAJOR, *LA GRANDE LAVANDE, L'ASPIC.* PL. 330.

Lavandula latifolia. P. 216. T. 198.
Lavandula Spica. LIN. SP. 800.
Comæ florentes in uſu.

LAVANDULA MINOR, *LA LAVANDE ORDINAIRE.* PL. 331.

Lavandula anguſtifolia. P. 216. T. 198.
Lavandula Spica. LIN. SP. 800.

Folia & flores in uſu. Varietas eſt præcedentis.

LAURUS, *LE LAURIER.* PL. 334.

Laurus vulgaris. P. 460. T. 597.

Laurus nobilis. LIN. SP. 529.

Folia & baccæ in uſu.

LENS, *LA LENTILLE.* PL. 335.

Lens vulgaris (& major.) P. 346. T. 390.
Ervum Lens. LIN. SP. 1039.

Semina in uſu.

LENTICULA, *LA LENTILLE D'EAU.* PL. 336.

Lenticula paluſtris vulgaris. P. 362. T. HERB. IV.
Lemna minor. LIN. SP. 1376.

Herba in uſu.

LEPIDIUM, *LA PASSE-RAGE.* PL. 337.

Lepidium latifolium. P. 97. T. 216. LIN. SP. 899.

Folia & radix in uſu.

LEVISTICUM, *LA LIVÊCHE.* PL. 339.

Liguſticum vulgare. P. 157.
Angelica montana, perennis, Paludapii folio. T. 313.
Liguſticum Leviſticum. LIN. SP. 359.

Tota planta in uſu.

LICHEN CINEREUS, *L'HÉPATIQUE TERRESTRE CENDRÉE.*

Lichen terreſtris cinereus. RAJ. HIST. 117.
Lichenoïdes digitatum cinereum Lactucæ foliis ſinuoſis. DILL. 200.
Lichen pulmonarius ſaxatilis digitatus. VAILL. 116. *t.* 21. *f.* 16.
Lichen caninus. LIN. SP. 1616.

Mediam hæc planta, Fungum inter & Muſcum, obtinere videtur ſubſtantiam: mollis, quaſi ſpongioſa, & lanugine obducta, humi jacet in ſylvis umbroſis juxtà lapides & in radicibus aut truncis arborum. Folia exſiccata colore gaudent *cinereo* ſuperius obſcuriori; inferius verò dilutiori. Omnibus vegetat in regionibus; imò & ex Americâ, (teſte *MEAD Exam. de Venen. tentam.* 3.) ſæpè cum Peruviano Cortice advecta reperta eſt.

LICHEN ARBOREUS, *LA PULMONAIRE DE CHÊNE.* PL. 340.

Muſcus Pulmonarius. P. 361.
Lichen arboreus ſive Pulmonaria arborea. J. B. 3. 759. T. 549.

Lichen Pulmonarius. LIN. SP. 1612.

Planta in uſu.

LIGNUM ALOES, *Le bois d'Aloès.*

Agallochum officinarum. P. 393.
Arbor excœcans. RUMP. 2. *p.* 237. *t.* 79. 80.
Excœcaria Agallocha. LIN. SP. 1451.

Rarò *Agallochum verum* ad nos tranſvehitur; hujus defectu *Agallocho ſpurio* ex arbore Excœcante collecto, circà Amboïnam in fruſtis variæ magnitudinis parato, utimur. Eligatur ſolidum, denſum, aquis ſubſidens, reſinoſum, nigro-purpureum, amarum, ad ignem admotum aut duriùs perfricatum odore fragranti.

LIGNUM NEPHRITICUM, *Le Bois Néphrétique.*

Lignum peregrinum aquam cæruleam reddens. P. 416.
Acacia quadrifolia, ſiliquis cincinnatis. PLUM. ICON. 4.
Mimoſa Unguis-Cati. LIN. SP. 1499.

LIGNUM NEPHRITICUM eſt fuſcum, ſolidum, durum, & grave; ſaporis acris, amaricantis. In uſum venit pars interior ſive meditullium fuſcum; alba rejicitur. È Mexico advehitur.

LIGNUM RHODIUM. *Le Bois de Roses.*

Cytiſus incanus, ſiliquis falcatis. P. 389.
Cytiſus Maranthæ. LOB. ICON. 2. 46.
Medicago arborea. LIN. SP. 1096.

LIGNUM RHODIUM eſt radix lignoſa, dura, contorta, nodoſa, reſinoſa; odoris fragrantis, roſei ſaporis, ſubamari. Ex inſulis Canarienſibus & Rhodo advehitur.

LIGNUM QUASSI, *Le Bois amer de Surinam.*

Legnum Coiſſi. FERMIN. *tom.* I. *pag.* 212.
Lignum amarum Quaſſi. CLERC. *tom.* I. *pag.* 426.
Quſſia amara. LIN. SP. 553 *&* 1679.

Eſt radix vel lignum leve & inodorum ſicut Betula, amaroris intenſi, non ingrati, cujus cortex ad Simaroubam accedit.

LIGUSTICUM, *Le Séséli.* PL. 341.

Liguſticum, quod Seſeli officinarum. P. 162. T. 323.
Siler montanum. DOD. 310.

Laſerpitium Siler. LIN. SP. 357.
Folia, flores & ſemina ſunt in uſu.

LILIUM ALBUM, *Le Lis Blanc.* PL. 343.
Lilium album vulgare. J. B. 2. 685. T. 369.
Lilium candidum. LIN. SP. 433.
Bulbi & flores in uſu.

LILIUM CONVALLIUM, *Le Muguet.* PL. 344.
Lilium convallium album. P. 304. T. 77.
Convallaria majalis. LIN. SP. 451.
Flores in uſu.

LIMONES, *Les Limons.* PL. 227.
Malus Limonia acida. P. 436.
Limon vulgaris. T. 621.
Citrus medica Limon. LIN. SP. 1100.
Fructus in uſu.

LINARIA, *La Linaire.* PL. 345.
Linaria vulgaris lutea, flore majore. P. 212. T. 170.
Antirrhinum Linaria. LIN. SP. 858.
Herba in uſu.

LINGUA CERVINA, *La Scolopendre.* PL. 346.
Lingua cervina officinarum. P. 353. T. 544.
Scolopendria vulgaris. TRAG. 549.
Aſplenium Scolopendrium. LIN. SP. 1537.
Folia in uſu.

LINUM, *Le Lin.* PL. 347.
Linum ſativum. P. 214. T. 339.
Linum uſitatiſſimum. LIN. SP. 397.
Semina in uſu.

LIQUIDAMBAR, *Le Liquidambar.* PL. 77.
Liquidambar. P. 502.
Liquidambar arbor, ſeu Styraciflua Aceris folio. PLUK. ALM. 224. *t.* 42. *f.* 6.
Liquidambar Styraciflua. LIN. SP. 1418.

LIQUIDAMBAR est resina è flavo fusca, saporis acris, aromatici; odoris suavis. Præfertur liquidæ consistentiæ Balsami Peruviani nigri instar; Arbor in Virginiâ, novâ Hispaniâ & aliis occidentalibus regionibus crescit. STYRAX LIQUIDA ex eâdem arbore educitur: est resina tenax, consistentiæ melleæ, è fusco grisea, odoris ut plurimùm gravis.

LITHOSPERMUM, *Le Grémil*, *L'Herbe aux Perles*. PL. 349.

Lithospermum majus erectum. P. 258. T. 137.
Lithospermum, sive Milium Solis. J. B. 3. 590.
Lithospermum officinale. LIN. SP. 189.

Semina in usu.

LOBELIA. *La Cardinale bleue.* (*Flos Cardinalis.*) PHYTANT. N.° 512.

Rapuntium americanum flore dilute cæruleo. T. 163.
Rapunculus galeatus virginianus flore violaceo majore. MORIS. 2. *p.* 466. *s.* 5. *t.* 5. *f.* 55.
Lobelia siphilitica. LIN. SP. 1320.

LOBELIA à *LOBELIO* Medico Insulano nomen accepit. Tota planta in usu.

LUJULA, L'*Alleluia*. PL. 353.

Oxytriphyllum & Panis Cuculi. Officinarum.
Trifolium Acetosum vulgare. P. 330.
Oxys flore albo. T. 88.
Oxalis Acetosella. LIN. SP. 620.

Herba in usu.

LUPINUS, *Le Lupin*. PL. 354.

Lupinus sativus flore albo. P. 347. T. 392.
Lupinus albus. LIN. SP. 1015.

Semina in usu.

LUPULUS, *Le Houblon*. PL. 355.

Lupulus mas & femina. P. 298. T. 535.
Vitis septentrionalium. LOB. ICON. 629.
Humulus Lupulus. LIN. SP. 1457.

Flores, folia, radices & teneri asparagi in usu.

LYCOPERSICON, *La Pomme d'amour*.

Solanum Pomiferum fructu rotundo striato molli albo. P. 167.

Aurea mala. DOD. 458.
Lycoperſicon fructu albo. T. 150.
Solanum Lycoperſicon. LIN. SP. 265.

Fructus in uſu.

MAJORANA, *LA MARJOLAINE.* PL. 356.

Sampſucus, ſeu Amaracus. Officinarum.
Majorana vulgaris. P. 224. T. 199.
Origanum Majorana. LIN. SP. 825.

Folia & comæ florentes in uſu.

MALVA, *LA MAUVE.* PL. 357.

Malva vulgaris flore majore folio ſinuato. J. B. 2. 949. T. 95.
Malva ſylveſtris major. TABER. ICON. 768.
Malva ſylveſtris. LIN. SP. 969.

Radices, folia, flores & ſemina in uſu.

MANDRAGORA, *LA MANDRAGORE.* PL. 363.

Mandragora fructu rotundo. P. 169. T. 76.
Mandragora mas. J. B. 3. 617.
Atropa Mandragora. LIN. SP. 259.

Folia & radicum cortices in uſu.

MANNA CALABRINA, *LA MANNE DE CALABRE.* PL. 97.

Succus è Fraxino exudans & concretus, ſive Manna officinarum. P. 497.

È diverſis arboribus in variis regionibus MANNA colligitur; ſed præfertur quæ è Fraxinis & Ulmis in Calabriâ, Siciliâ & Agro romano, ſponte vel è vulneratâ arbore exſudat. Ratione conſiſtentiæ duplex eſt: alia in *lacrymis*, *bacillis* aut *granulis*; alba eſt, parum rubeſcens, ſicca, levis, ſapore dulci nec injucundo. *Manna pinguis*, in grumis ſeu fruſtis craſſioribus affertur. Eligenda recens à ſordibus libera; rejicienda pinguior, mellea, ſordida & adulterata.

MARRUBIUM ALBUM, *LE MARRUBE BLANC.* PL. 364.

Marrubium album vulgare. P. 230. T. 192.
Praſſium album. TABER. ICON. 539.

Marrubium vulgare. LIN. SP. 816.

Herba in uſu.

MARRUBIUM NIGRUM, *LE MARRUBE NOIR.* PL. 365.

Marrubium nigrum fetidum. P. 230. FUCHS. 154.
Ballote. MATH. 825. T. 185.
Ballota nigra. LIN. SP. 814.

Herba in uſu.

MARUM, *LE MARUM.* PL. 366.

Chamædrys maritima incana fruteſcens, foliis lanceolatis. T. 205.
Marum Cortuſi. J. B. 3. 242.
Teucrium Marum. LIN. SP. 788.

Folia & comæ florentes in uſu.

MASTICHE, *LE MASTIC.* PL. 87.

Lentiſcus vulgaris. P. 399. T. 580.
Lentiſcus chia ex quâ fluit Maſtiche. T. ITER. *tom.* 1. 285.
Piſtacia Lentiſcus. LIN. SP. 1455.

MASTICHE reſina eligatur in granis majoribus, alba, pellucida, friabilis, ductilis, odoris grati. In inſulâ Chio naturaliter producta colligitur; rarius in Hiſpaniâ, Galliâ Narbonenſi, &c.

MATRICARIA, *LA MATRICAIRE.* PL. 368.

Matricaria vulgaris, ſive ſativa. P. 133. T. 493.
Matricaria Parthenium. LIN. SP. 1255.

Flores & comæ florentes in uſu.

MECHOACANNA, *LE MÉCHOACAN.*

Convolvulus americanus, Mechoacan *dictus.* RAJ. HIST. 723. T. 84.
Jetucu, ſive Mechoacanna. PISON. 253.

MECHOACANNA eſt radix inſipida ferè & inodora. Eligenda alba, ponderoſa, non carioſa. Ex Americæ regione ejuſdem nominis advehitur.

MELILOTUS, *LE MÉLILOT.* PL. 370.

Melilotus officinarum Germaniæ. P. 331. T. 407.

Trifolium Melilotus officinarum. LIN. SP. 1078.

Tota planta florida in uſu.

MELILOTUS ODORA, *LE BAUMIER, ou LOTIER ODORANT.* PL. 352.

Lotus hortenſis odora. P. 331.
Melilotus major odorata violacea. T. 407. MORIS. 2. 161. *ſ.* 2. *t.* 16. *f.* 10.
Trifolium Melilotus cærulea. LIN. SP. 1077.

Folia, flores & ſemina in uſu.

MELISSA, *LA MÉLISSE, ou CITRONELLE.* PL. 371.

Meliſſa hortenſis. P. 229. T. 193.
Meliſſa officinalis. LIN. SP. 827.

Tota planta florida in uſu.

MELO, *LE MELON.* PL. 373.

Meló vulgaris. P. 310. T. 104.
Cucumis Melo. LIN. SP. 1436.

Semina in uſu.

MENTHA, *LA MENTHE CRÉPUE DES JARDINS.* PL. 377.

Mentha criſpa verticillata. P. 227. T. 189.
Mentha ſativa. LIN. SP. 805.

Tota planta florida in uſu.

MENTHA AQUATICA, *LA MENTHE AQUATIQUE.* PL. 379.

Mentha rotundifolia paluſtris, ſive aquatica major. P. 227. T. 189.
Siſymbrium. DOD. 97.
Mentha aquatica. LIN. 805.

Tota planta florida in uſu.

MENTHA PULEGIUM, *LE POULIOT.* PL. 381.

Pulegium latifolium. P. 222.
Mentha aquatica ſive Pulegium vulgare. T. 189.
Mentha Pulegium. LIN. SP. 807.

Tota planta florida in uſu.

MENTHA

MENTHA PIPERITA, *La Menthe poivrée.*

Mentha Piperis sapore, officinarum. DAL. 160.
Mentha spicis brevioribus & habitioribus, foliis Menthæ fuscæ, sapore fervido Piperis. RAJ. SYNOP. 3. *p.* 134. *t.* 10. *f.* 2.
Mentha piperita. LIN. SP. 805.

In Angliâ crescit. Tota planta florida in usu.

MENYANTHES, *Le Trefle d'eau.* PL. 375.

Trifolium fibrinum. Officinarum.
Menyanthes palustre latifolium & triphyllum. T. 117.
Menyanthes trifoliata. LIN. SP. 208.

Folia in usu.

MERCURIALIS, *La Mercuriale.* PL. 382.

Mercurialis mas & femina. P. 121. T. 534.
Mercurialis annua. LIN. SP. 1465.

Tota planta in usu.

MESPILUS, *Le Nefflier.* PL. 383.

Mespilus Germanica folio Laurino, non serrato, sive Mespilus sylvestris. P. 453. T. 641.
Mespilus Germanica. LIN. SP. 684.

Fructus & folia in usu.

MEUM, *Le Meum.* PL. 24.

Meum foliis Anethi. P. 148. T. 312.
Radix ursina. J. B. 3. 11.
Athamanta Meum. LIN. SP. 353.

Radices MEI sunt oblongæ, digito crassæ, foris fuscæ, intùs albicantes, aromaticæ: eligantur recentes. Hæc planta in montosis locis Galliæ, Italiæ & Germaniæ crescit.

MILLEFOLIUM, *La Mille-Feuille.* PL. 388.

Millefolium vulgare album. P. 140. T. 496.
Stratiotes. LUGD. 766.
Achillea Millefolium. LIN. SP. 1267.

Tota planta in usu.

MOMORDICA, *La Pomme de merveille.* Pl. 389.

Balsamina rotundifolia repens, sive mas. P. 306.
Momordica vulgaris. T. 103.
Momordica Balsamina. Lin. Sp. 1433.

Fructus in usu.

MORUS, *Le Meurier.* Pl. 390.

Morus fructu nigro. P. 459. T. 589.
Morus nigra. Lin. Sp. 1398.

Radix, cortex & fructus in usu.

MUSCUS CLAVATUS, *Le pied de Loup.* Pl. 393.

Muscus terrestris clavatus. P. 360.
Lycopodium. Taber. Icon. 814. Dod. 472.
Muscus vulgaris squamosus repens clavatus. T. 553.
Lycopodium clavatum. Lin. Sp. 1564.

Semen ejus, *Sulphur vegetabile* dicitur.

MUSCUS VULGARIS, *La Mousse commune.* Pl. 393.

Muscus squamosus major, sive vulgaris. T. 553.
Muscus vulgatissimus. P. 360.
Hypnum triquetrum. Lin. Sp. 1589.

Herba in usu.

MYROBALANI, *Les Myrobolans.* Pl. 51.

Myrobalani I, II, III, IV, V, priores. P. 445.

Myrobalaniferæ arbores ad pruniferas referuntur, & in multis Indiæ orientalis regionibus reperiuntur. Quinque in officinis habentur Myrobalanorum species: nempe.

Myrobalani Belliricæ, *les Mirobolans Bellirics.* Sunt fructus oblongi, non numquam angulosi, includentes ossiculum durum sub putamine carnoso & rubente, saporis subacris & astringentis.

Myrobalani Chebulæ, *les Mirobolans Chébules.* Sunt fructus oblongi, in quinque costas elevati, rugosi, cæterarumque specierum omnium maximi, includentes sub putamine carnoso, subfusco, ossiculum oblongum cavernosum, saporis subacris.

MYROBALANI CITRINÆ, *les Mirobolans Citrins.* Sunt fructus subrotundi, pentagoni, rugosi, *Chebulis* minores, coloris citrini; includentes sub putamine carnoso ossiculum angulosum.

MYROBALANI EMBLICÆ, *les Mirobolans Emblics.* Sunt fructus rotundi, nigri, sexangulares, includentes sub pericarpio carnoso, in sex partes per maturitatem dehiscente, ossiculum turgidum, hexagonum, saporis acerrimi.

MYROBALANI INDÆ, *les Mirobolans Indiens.* Sunt fructus longi superficie angulari, rugosi, duri foris & extùs nigri, saporis subacidi, acerbi & astringentis.

Eligantur MYROBALANI omnes, carnosiores, crassiores, & ponderosiores.

MYRRHA, *LA MYRRHE.*

Myrrha trogloditica. Officinarum.
Myrrha. P. 501.

MYRRHA est gummi-resina arida, fusca, amara, aromatica, fragrans, friabilis, levis. Eligatur pura. Ex arbore non satis descriptâ colligitur; affertur ex Æthiopiâ, Arabiâ, & Ægypto.

MYRRHIS ODORATA, *LE CERFEUIL MUSQUÉ.*

Myrrhis major, seu Cicutaria odorata. P. 160. T. 315.
Cerefolium hispanicum. TABER. ICON. 93.
Scandix odorata. LIN. SP. 368.

Tota planta in usu.

MYRTHUS, *LE MYRTHE.* PL. 396.

Myrthus communis, italica. P. 468. T. 640. LIN. SP. 673.
Folia, flores & baccæ in usu.

MYRTHUS BRABANTICA, *LE PIMENT ROYAL.* PL. 397.

Rhus myrthifolia belgica. P. 414.
Gale frutex odoratus septentrionalium. J. B. 1. 225.
Myrica Gale. LIN. SP. 1453.
Tota planta & præcipue comæ floridæ sunt in usu.

NAPUS, *LE NAVET.* PL. 399.

Napus sativa, radice alba. P. 95. T. 229.

Braſſica Napus. LIN. SP. 931.

Radix & ſemina ſunt in uſu. Seritur in arvis æſtate, Buniadis varietas eſt.

NARDUS CELTICA, *LE NARD CELTIQUE.* PL. 25.

Spica celtica. Officinarum.
Nardus celtica Dioſcoridis. P. 165.
Nardus gallica. LUGD. 923.
Valeriana celtica. T. 131. LIN. SP. 46.

SPICÆ CELTICÆ ſunt radices cum foliis. Eligantur recentes, odoris aromatici, ſuaves, radiculis numeroſis cohærentes, plenæ, non fragiles. In Alpibus Helvetiæ & Valeſiæ naſcuntur.

NARDUS INDICA, *LE NARD INDIEN.*

Spica Nardi, & Spica Indica. Officinarum.
Calamus odoratus Mathioli. P. 17.
Andropogon Nardus. LIN. SP. 1482.

SPICÆ NARDI ſunt radices oblongæ, fungoſæ, digiti craſſitiei & longitudinis, nervoſis filamentis convolutæ, ſpicæ figuram referentes, coloris è fuſco rufeſcentis, ſaporis aromatici. Eligendæ recentes, comâ longâ donatæ, Cyperum redolentes. Ex India orientali advehuntur.

NASTURTIUM AQUATICUM; *LE CRESSON D'EAU.* PL. 403.

Naſturtium aquaticum ſupinum. P. 104. DOD. 592.
Siſymbrium aquaticum. T. 226.
Siſymbrium Naſturtium. LIN. SP. 916.

Tota planta in uſu.

NASTURTIUM HORTENSE, *LE CRESSON ALENOIS.* PL. 401.

Naſturtium hortenſe vulgatum. P. 103. T. 213. DOD. 771.
Lepidium ſativum. LIN. SP. 899.

Folia & ſemina in uſu.

NASTURTIUM INDICUM, *LA CAPUCINE.* PL. 404.

Naſturtium indicum majus & minus. P. 306.
Cardamindum majus & minus. T. 430.
Tropæolum minus. LIN. SP. 490.

Folia & flores ſunt in uſu. Europæis innotuit circa annum 1580.

NASTURTIUM VERRUCARIUM, *Le Cresson sauvage*. Pl. 402.

Ambrosia campestris repens. P. 138.
Nasturtium sylvestre, *capsulis cristatis*. T. 214.
Coronopus Ruellii, *sive Nasturtium verrucosum*. J. B. 2. 919.
Cochlearia Coronopus. Lin. Sp. 904.

Herba in usu.

NEPETA, L'*Herbe au Chat*. Pl. 405.

Mentha Cataria vulgaris major. P. 228.
Cataria major vulgaris. T. 202.
Nepeta Cataria. Lin. Sp. 796.

Tota planta in usu.

NICOTIANA, *Le Tabac*. Pl. 407.

Nicotiana major latifolia. P. 169. T. 117.
Petum latifolium. Clus. Hist. 309.
Nicotiana Tabacum. Lin. Sp. 258.

Folia in usu. Europæis innotuit circa annum 1560.

NIGELLA, *La Nielle*. Pl. 410.

Nigella arvensis cornuta. P. 145. T. 258.
Melanthium sylvestre. Dod. 303.
Nigella arvensis. Lin. Sp. 753.

Semina in usu.

NINZIN, *Le Ninzin*. Pl. 27.

Sisarum montanum coræense, *radice non tuberosa*. Kæmpf. Amœnit. 817. *t.* 818.
Sium Ninsi. Lin. Sp. 361.

Gins-eng & Ninzin sunt radices plantarum genere & specie diversarum; viribus tamen aut figurâ ferè similes. Eligendæ oblongæ vix digiti minimi crassitie, bifidæ, flavescentes, non cariosæ, duræ, sabamaricantes & aromaticæ. Nascitur Ninzin in Tartariâ Chinâ & regno Siam.

NUMMULARIA, *La Nummulaire*. Pl. 415.

Nummularia major lutea. P. 309.

Lyſimachia humifuſa folio rotundiore flore luteo. T. 141.
Centimorbia. J. B. 3. 370.
Lyſimachia Nummularia. LIN. SP. 211.

Tota planta in uſu.

NUX MOSCHATA, *LA NOIX MUSCADE.* PL. 71.

Nux Moſchata fructu rotundo. P. 407.
Bongo-pala. PISON. MANT. 173.

NUCES MOSCHATÆ rotundæ præferuntur; oblongæ enim ſylveſtres eſſe creduntur. Eligendæ ponderoſæ & pingues, ſeu quæ acu calido punctæ oleum emittunt. In inſulâ Bandâ naſcuntur.

MACIS non eſt *flos*, ſed *involucrum*, putamini duro nucis Moſchatæ, inſtar reticuli circumductum. Eligendum recens, integrum, pingue, oleoſum, odore ſuavi, ſapore ſub acri, colore ex aureo rufeſcenti.

NUX VOMICA, *LA NOIX VOMIQUE.* PL. 72.

Nux Vomica officinarum. P. 511. RAJ. HIST. 1814.
Caniram. RHEED. MALAB. 1. *p.* 67. *t.* 37.
Strychnos Nux Vomica. LIN. SP. 271.

NUCES VOMICÆ ſunt ſemina orbiculata, compreſſa, parum lanuginoſa, cineracea, amara, duritie corneâ. È Malabariâ advehuntur.

NYMPHÆA ALBA, *LE NÉNUPHAR BLANC.* PL. 416.

Nymphæa alba major. P. 193. T. 260.
Nymphæa alba. LIN. SP. 729.

Radices & flores in uſu.

OCYMUM, *LE BASILIC.* PL. 418.

Ocymum Caryophyllatum majus. P. 226. T. 203.
Ocymum Baſilicum. LIN. SP. 833.

Folia flores & ſemina in uſu.

OLEA, L'*OLIVIER.* PL. 421.

Olea ſativa. P. 472.
Olea europæa. LIN. SP. 11.

È fructu maturo OLEÆ fit OLEUM COMMUNE ſive OLIVARUM; l'*Huile d'Olive.* Colitur Olea in calidis regionibus Galliæ, Hiſpaniæ, &c.

OLIBANUM, L'*OLIBAN*, ou *ENCENS MALE.*

Olibanum, *ſive Thus maſculum. Officinarum.*

OLIBANUM eſt reſina è flavo palleſcens, duriuſcula, ſemidiaphana, odore ad ignem fragranti. Genuinum ad albedinem magis accedit, friabile eſt, purum, & in guttas concretum. Arboris è quâ colligitur, non extat accurata deſcriptio.

OPHIOGLOSSUM, *LA LANGUE DE SERPENT.* PL. 425.

Ophiogloſſum vulgatum. P. 354. T. 548. LIN. SP. 1518.

Herba in uſu.

OPOPANAX, L'*OPOPONAX.*

Panax Coſtinum. P. 156.
Panax Heracleum. MORIS. 3. 315. *ſ.* 9. *t.* 17. *f.* 2.
Paſtinaca ſylveſtris altiſſima. T. 319.
Paſtinaca Opopanax. LIN. SP. 376.

OPOPANAX eſt gummi in granulis, ruſi, albi, & flavi coloris, in glebas compactum, ſaporis amari, ingrati; odoris gravis. Si in aquâ facilè ſolvatur & lacteſcat, ſincerum habetur. È vulneratâ circa radicem plantâ æſtivo tempore exſudat atque ſponte in Oriente concreſcit.

OPUNTIA COCHINILLIFERA, *LA RAQUETTE QUI PORTE LA COCHENILLE.*

Ficus indica major, levis ſeu ſpinoſa vermiculos proferens. PLUK. ALM. 146. *t.* 281. *f.* 383.
Opuntia maxima.... SLOAN. 194. *Hiſt.* 2. *p.* 152. *t.* 8 *f.* 1. 2.
Cactus cochinillifer. LIN. SP. 670.

OPUNTIA COCHINILLIFERA creſcit in Jamaicâ & Americâ calidiore. *Vide COCCUS OPUNTIÆ* in Regno Animali.

ORIGANUM, L'*ORIGAN.* PL. 430.

Origanum ſylveſtre, Cunila bibula Plinii. P. 223. T. 198.
Origanum vulgare. LIN. SP. 824.

Tota planta in uſu.

ORIZA, *LE RIZ.* PL. 433.

Oriza. P. 24. T. 514.
Oryza ſativa. LIN. SP. 475.

Semina in uſu.

OROBUS, L'*Orobe*. Pl. 432.

Orobus siliquis articulatis, semine majore. P. 346.
Ervum verum. T. 398.
Ervum Ervilia. Lin. Sp. 1040.

Semina in usu.

PÆONIA MAS, *La Pivoine male*. Pl. 435.

Pæonia folio nigricante splendido, quæ mas. P. 323. T. 273.
Pæonia officinalis mas. Lin. Sp. 747.

Radix, & semina in usu.

PÆONIA FEMINA, *La Pivoine femelle.* Sp. 435.

Pæonia femina flore pleno rubro majore. P. 324. T. 274.
Pæonia officinalis femina. Lin. Sp. 747.

Flores in usu.

PALMA MAJOR, *Le Palmier dattier.* Pl. 47.

Palma major. P. 506.
Palma Dactylifera major vulgaris. Jonst. Den. 138. Sloan. Jam. 174.
Phœnix Dactylifera. Lin. Sp. 1658.

Dactyli sunt fructus oblongi rotundi, includentes sub dulci carne nucleum durum, oblongum, per longitudinem sulcatum. Eligendi sunt recentes magni, carnosi, vinosi, & saporis mellei. È Syriâ, Ægypto aliisque calidis orientalibus regionibus advehuntur.

PALMA OLEOSA, *Le Palmier de Guinée.*

Arbor exotica fructu Dactylis simili. P. 508.

Oleum palmeum è fructibus *Palmæ Oleosæ* conficitur. Eligendum recens, crassum, non rancidum, consistentiæ Butyri, aurantii coloris, & odoris suavis. *Palma Oleosa* in Guineâ sponte crescit.

PAPAVER ALBUM, *Le Pavot blanc.* Pl. 106.

Papaver hortense semine albo sativum. P. 170. T. 237.
Papaver somniferum. Lin. Sp. 726.

Folia, capita & semina sunt in usu.

Opium est substantia è Papavere albo collecta, ponderosa, densa, inflammabilis, facile solubilis, partim resinosa, partim gummosa, nigricans, odore

odore ſoporifera, gravis & ſapore amara. Opium è regione *Thebaïcâ*, Ægypto confini collectum, optimum cenſetur. Opium minus purum MECONIUM vulgò nuncupatur.

PAPAVER NIGRUM, *LE PAVOT NOIR*. PL. 440.

Papaver hortenſe ſemine nigro. P. 170. T. 237.

Eſt varietas præcedentis, aſſerente *LINNÆO*.

PAPAVER RUBRUM, *LE PAVOT ROUGE, LE COQUELICOT*. PL. 439.

Papaver erraticum majus. P. 171. T. 238.
Papaver Rhœas. LIN. SP. 726.

Flores ſeu petala in uſu.

PAREIRA-BRAVA, ſeu BUTUA, *LE PAREIRA-BRAVA*.

Convolvulus braſilianus, flore octopetalo monococcos. RAJ. HIST. 1331.
Caapeba. PISON. 261.
Ciſſampelos Pareira. LIN. SP. 1473.

PAREIRÆ-BRAVÆ radices juniores ſeu minores, foris coloris ſunt è cinereo-nigricantis; annoſæ ſunt majores planè & nigreſcunt; intùs colorem referunt è fuſco luteum. Eligendæ amaro-dulces, craſſiores, non carioſæ: ex Americâ afferuntur.

PARIETARIA, *LA PARIÉTAIRE*. PL. 441.

Helxine. MATH. 1113.
Parietaria officinarum. P. 121. T. 509. LIN. SP. 1492.

Tota planta in uſu.

PASSULÆ MAJORES, *LES RAISINS DE DAMAS*. PL. 50.

Uvæ paſſæ majores, ſeu Paſſulæ Damaſcenæ. Officinarum.
Vitis Damaſcena. T. 613.
Vitis vinifera. P. 299. LIN. SP. 293.

PASSULÆ MAJORES ſunt Uvæ maturæ exſiccatæ. Eligantur pingues & recentes. In Italiâ & Hiſpaniâ parantur; præferuntur tamen quæ ex Syriâ advehuntur.

PASSULÆ MINORES, *LES RAISINS DE CORINTHE*. PL. 50.

Uvæ paſſæ minores, vel Paſſulæ Corinthiacæ. P. 299.

M

Vitis Corinthiaca seu Apyrina. T. 613. LIN. SP. 293.

PASSULÆ MINORES parantur ut majores & ex insulis Ægei maris advehuntur. Eligantur recentes.

PENTAPHYLLUM, *La Quinte-feuille.* PL. 481.

Quinquefolium majus repens. P. 325. T. 297.
Pentaphyllum, sive Quinquefolium vulgare, repens. J. B. 2. 397.
Potentilla reptans. LIN. SP. 714.
Radix & folia in usu.

PERSICARIA MITIS. *La Persicaire douce.* PL. 446.

Persicaria mitis maculosa. P. 101. T. 509.
Polygonum Persicaria. LIN. SP. 518.
Folia in usu.

PERSICARIA URENS, *La Persicaire acre.* PL. 447.

Persicaria urens, seu Hydropiper. P. 101. T. 509.
Polygonum Hydropiper. LIN. SP. 517.
Folia in usu.

PERSICA MALUS, *Le Pêcher.* PL. 362.

Persica molli carne, & vulgaris, viridis & alba. P. 440. T. 624.
Amygdalus Persica. LIN. SP. 676.

Flores, fructus, amygdalæ & gummi in usu.

PERVINCA, *La Pervenche.* PL. 448.

Clematis Daphnoïdes, major (& minor.) P. 301.
Pervinca vulgaris latifolia, (& angustifolia.) T. 120.
Vinca major (& minor.) LIN. SP. 304.
Folia in usu.

PETASITES, *Le Pétasite.* PL. 449.

Petasites major & vulgaris. P. 197. T. 451.
Tussilago Petasites. LIN. SP. 1215.
Radix in usu.

PETROSELINUM, *Le Persil.* PL. 450.

Apium hortense, seu Petroselinum vulgò. P. 153. T. 305.

Apium Petroselinum. LIN. SP. 379.

Radix, folia & semina in usu.

PETROSELINUM MACEDONICUM, *LE PERSIL DE MACÉDOINE.* PL. 451.

Apium Macedonicum. P. 154. T. 305.
Petroselinum Macedonicum. LOB. ICON. 708.
Bubon Macedonicum. LIN. SP. 364.

Semina in usu. Eligantur recentia, nitida, odoris & saporis grati, aromatici.

PHYTOLACCA, *LA MORELLE DES INDES.* PL. 455.

Phytolacca americana majori fructu. T. 299.
Solanum magnum virginianum rubrum. PARK. 347.
Phytolacca decandra. LIN. SP. 631.

Radices, folia & fructus in usu.

PIMENTUM, PIPER AROMATICUM, *LE POIVRE DE LA JAMAIQUE.* PL. 58.

Piper jamaïcense, quibusdam. DAL. 423.
Myrtus arborea aromatica, foliis Laurinis. SLOAN. JAM. 161. *hist.* 2. *p.* 76. *t.* 191. *f.* 1.
Caryophyllus aromaticus americanus Lauri acuminatis foliis, fructu orbiculari. PLUK. ALM. 88. *t.* 155. *f.* 4.
Myrtus Pimenta. LIN. SP. 676.

PIMENTA sunt fructus immaturi, orbiculares, cortice fusco, rugoso, umbilicato, odore & sapore aromatico ad Caryophyllos accedentes. falsò AMOMUM nuncupantur.

PILOSELLA, *LA PILOSELLE, L'OREILLE DE SOURIS.* PL. 456.

Pilosella major repens hirsuta. P. 262.
Pilosella auricula Muris. TABER. ICON. 196.
Dens Leonis qui Pilosella officinarum. T. 469.
Hieracium Pilosella. LIN. SP. 1125.

Folia & flores in usu.

PIMPINELLA, *LA PIMPRENELLE.* PL. 457.

Pimpinella Sanguisorba minor hirsuta lævis. P. 160. T. 157.
Poterium Sanguisorba. LIN. SP. 1411.

Folia in usu.

PIMPINELLA ALBA, *La Pimprenelle blanche*, *La boucage*. Pl. 522.

Pimpinella Saxifraga major, *umbellâ candidâ*. P. 159.
Tragoselinum majus, *umbellâ candidâ*. T. 309.
Pimpinella Saxifraga major. Lin. Sp. 378.

Radix in usu.

PINUS, *Le Pin*. Pl. 65.

Pinus sativa. P. 491. T. 585.
Pinus Pinea. Lin. Sp. 1419.

Nuclei Pinei, *les Pignons doux*, sunt fructus oblongi, candidi, subdulces, in officulis crassis, duris, in strobilum squamatim dispositis, inclusi. Eligantur recentes.

PINUS SYLVESTRIS, *Le Pin sauvage*. Pl. 81.

Pinus sylvestris vulgaris genevensis. J. B. 1. 253. T. 586.
Pinus sylvestris. P. 491. Lin. Sp. 1418.

È vulnerato cortice manat resina, alia liquidior Terebenthina communis vocata; alia siccior, Resina pinea seu Pix alba dicta, *la Poix blanche ou de Bourgogne*, *Poix-résine*. Ex accensâ arbore paratur Pix nigra, Pix sutoria, Pix navalis (*le Goudron*,) &c. Hæc ultima species è septentrionalibus regionibus affertur.

PIPER, *Le Poivre noir*. Pl. 56.

Piper rotundum nigrum. P. 411.
Malago-Codi. Rheed. Mal. 7. *pag*. 23. *t*. 12.
Piper nigrum. Lin. Sp. 40.

Eligenda grana Piperis majora, saporis fervidi, non pulvere nec aliis quisquiliis inquinata. Colitur in Malabariâ, javâ & multis Indiæ orientalis regionibus.

Piper album, *le Poivre blanc*, est Piper priùs descriptum; sed maceratum & cortice mundatum.

PIPER LONGUM, *Le Poivre long*. Pl. 57.

Macropiper. *Officinarum*.
Piper longum orientale. P. 412.

Cattu-Tirpali. RHEED. MAL. 7. *pag.* 27. *t.* 14.
Piper longum. LIN. SP. 41.

PIPER LONGUM eſt fructus oblongus, teres, nigricans, figuræ julorum Coryli; ſaporis fervidi, amaricantis. Ex Malabariâ, Javâ advehitur.

PISTACIA, *LE PISTACHIER.* PL. 64.

Piſtacia peregrina, fructu racemoſo, ſeu Terebinthus Indica. P. 401.
Terebinthus Indica Theophraſti, Piſtacia Dioſcoridis. T. 580.
Piſtacia vera. LIN. SP. 1454.

PISTACIÆ ſunt fructus ſeu *nuces* oblongæ, anguloſæ, Avellanæ magnitudinis; ſub putamine tenui, rufo, nucleum vireſcentem, gratum, dulcem, includentes. Eligantur recentes, ponderoſæ, non rancidæ. Ex Arabiâ, Perſiâ, Syriâ & Indiâ afferuntur.

PLANTAGO, *LE PLANTAIN.* PL. 461.

I. Plantago latifolia ſinuata. P. 189. T. 126.
Plantago major. LIN. SP. 163.

II. Plantago latifolia incana. P. 189. T. 126.
Plantago media. LIN. SP. 163.

III. Plantago anguſtifolia major. P. 189. T. 127.
Plantago Lanceolata. LIN. SP. 164.

Adhibentur indiſcriminatim. Tota planta in uſu.

POLIUM MONTANUM, *LE POLIUM.* PL. 462.

Polium montanum luteum. P. 220. T. 206.
Teucrium Polium. LIN. SP. 792.

Folia & comæ florentes in uſu.

POLYGALA, L'*HERBE A LAIT.* PL. 463.

Polygala vulgaris. P. 215. T. 174. LIN. SP. 986.
Flos Ambarvalis. DOD. 253.
Polygala. ACT. SCIENT. 1739. *pag.* 135.

Tota planta in uſu.

POLYGONATUM, *LE SCEAU DE SALOMON.* PL. 464.

Polygonatum latifolium vulgare. P. 303. T. 78.

Polygonatum, vulgò Sigillum Salomonis. J. B. 3. 529.
Convallaria Polygonatum. LIN. SP. 451.

Radix in uſu.

POLYGONUM, *LA RENOUÉE, LA TRAINASSE.* PL. 465.

Polygonum latifolium. P. 281. T. 510.
Polygonum, ſive Centinodia. J. B. 3. 374.
Polygonum aviculare. LIN. SP. 519.

Herba in uſu.

POLYPODIUM, *LE POLYPODE.* PL. 466.

Polypodium vulgare. P. 359. T. 540. LIN. SP. 1544.

Radices POLYPODII eligantur recentes, dulces, intus ex albo flaveſcentes & in arboris locis altioribus natæ.

POMA RENETIA, *LES POMMES DE REINETTE.*

Malus Praſomila. P. 433.
Malus ſativa, fructu ſubrotundo, è viridi palleſcente, acido-dulci. T. 634.
Pyrus Malus Praſomila. LIN. SP. 686.

POMA CURTIPENDULA, *LES COURT-PENDUS, ou CAPENDUS.*

Malus Curtipendula dicta. J. B. 1. 21.
Malus ſativa pediculo fermè carente. T. 634.
Pyrus Malus Ceſtiana. LIN. SP. 686.

POPULUS, *LE PEUPLIER.* PL. 467.

Populus nigra. P. 429. T. 592. DOD. 836. LIN. SP. 1464.

Gemmæ in uſu.

PORRUM, *LE POIREAU.* PL. 468.

Porrum commune capitatum. P. 72. T. 382.
Allium Porrum. LIN. SP. 423.

Pars inferior & alba plantæ prope radicem eſt in uſu.

PORTULACA, *LE POURPIER.* PL. 469.

Portulaca latifolia ſativa. P. 288. T. 236.

Portulaca oleracea. LIN. SP. 638.

Herba & ſemina ſunt in uſu.

PRIMULA-VERIS, *LA PRIMEVERE.* PL. 470.

Herba paralyſis. Officinarum.
Primula veris odorata, flore luteo ſimplici. T. 124.
Primula veris officinalis. LIN. SP. 204.

Folia & flores in uſu.

PRUNUS, *LE PRUNIER.* PL. 471.

Prunus fructu magno, dulci, atro-cæruleo. T. 622.
Prunus domeſtica Damaſcena. LIN. SP. 680.

Fructus & gummi in uſu.

PSYLLIUM, L'*HERBE AUX PUCES.* PL. 473.

Pſyllium majus erectum. P. 191. T. 128.
Pulicaris herba. LUGD. 1172.
Plantago Pſyllium. LIN. SP. 167.

Semina in uſu.

PTARMICA, L'*HERBE A ÉTERNUER*, (*Dracunculus.*) PL. 251.

Dracunculus pratenſis ſerrato folio. P. 98.
Ptarmica vulgaris folio longo ſerrato flore albo. T. 496.
Achillea Ptarmica. LIN. SP. 1266.

Radix & folia in uſu.

PULMONARIA, *LA PULMONAIRE.* PL. 475.

Symphitum maculoſum, ſive Pulmonaria latifolia. P. 259.
Pulmonaria Italorum, ad Bugloſſum accedens. T. 136.
Pulmonaria officinalis. LIN. SP. 194.

Tota planta in uſu.

PULSATILLA, *LA COQUELOURDE.* PL. 477.

Pulſatilla folio craſſiore, & majore flore. P. 177. T. 284.
Herba venti. TRAG. 413.

Anemone Pulsatilla. LIN. SP. 759.

Radix folia & flores in usu.

PUNICA, *LE GRENADIER.* PL. 361.

I. Malus Punica sativa. P. 438.
Punica, quæ Malum Granatum fert. T. 636.
Punica Granatum. LIN. SP. 676.

II. Balaustia flore pleno majore. P. 438.
Balaustium. TABER. ICON. 1033.
Punica flore pleno majore. T. 636.

Prioris arboris mali cortex MALICORIUM dicitur. Flores verò posterioris BALAUSTIÆ nuncupantur. Eligantur recentes. È regionibus calidioribus advehuntur.

PYRETHRUM, *LA PYRETRE.* PL. 325.

Pyrethrum flore Bellidis. P. 148.
Pyrethrum officinarum, Salivaris. LOB. ICON. 774.
Anthemis Pyrethrum. LIN. SP. 1262.

Utimur radicibus. Eligantur instar Piperis acres, teretes, majores & recentes. È calidioribus regionibus afferuntur.

PYROLA, *LA PYROLE.* PL. 478.

Pyrola rotundifolia major. P. 191. T. 256. DOD. 138.
Pyrola, à Pyri folio. LOB. ICON. 294.
Pyrola rotundifolia. LIN. SP. 567.

Folia in usu.

PYRUS, *LE POIRIER.* PL. 479.

Pyrus sylvestris. P. 439. T. 632.
Pyrus communis Pyraster. LIN. SP. 686.

Fructus in usu.

QUERCUS, *LE CHÊNE.* PL. 480.

Quercus latifolia mas, quæ brevi pediculo est. P. 419. T. 582.
Quercus Robur. LIN. SP. 1414.

Lignum, cortices, folia & fructus in usu.

RANUNCULUS

RANUNCULUS BULBOSUS, *La Renoncule bulbeuse.* Pl. 482.

Ranunculus pratensis radice verticilli modo rotunda. P. 179. T. 289.
Ranunculus bulbosus. Lob. Icon. 667. Lin. Sp. 778.

Radix in usu.

RAPA, seu RAPUM, *La vraie Rave.* Pl. 486.

Rape, ou Navet. Vernaculè.
Rapa sativa rotunda. P. 89. T. 228.
Orbiculatum, seu turbinatum Rapum majus. Lob. Icon. 197.
Brassica Rapa. Lin. Sp. 931.

Radix & semina in usu. Apud nos a Buniade & a Napo sativo Rapa non differt, nisi culturâ, loco & sationis tempore.

RAPHANUS, *Le Raifort, La Rave des Parisiens.* Pl. 487.

I. Radis. Vernaculè.
Raphanus minor oblongus. P. 96. T. 229.
Radicula sativa minor. Dod. 676.

II. Rémola. Vernaculè.
Raphanus major orbicularis vel rotundus. P. 96. T. 229.
Raphanus, sive radicula sativa. Dod. 676.
Raphanus niger. P. 96. T. 229. Lob. Icon. 202.
Raphanus sativus. Lin. Sp. 935.

Radice majori, vel minori, dulciori aut acriori, albâ vel nigrâ variat. Folia & radix in usu.

RAPHANUS RUSTICANUS, *Le Raifort sauvage.* Pl. 488.

Raphanus rusticanus. P. 96.
Cochlearia folio cubitali. T. 215.
Cochlearia Armoracia. Lin. Sp. 904.

Radix in usu.

RHABARBARUM, *La Rhubarbe.* Pl. 28.

Rhabarbarum folio oblongo crispo undulato flabellis sparsis, seu Rhabarbarum verum officinarum. Geof. Mat. Med. 2. 125.

Rheum undulatum. LIN. SP. 531.

RHABARBARUM eſt radix flava, amara, ſub-aſtringens, odorata; nucis Moſchatæ venas confracta imitans. Eligatur compacta, inter manducandum nec lenta nec glutinoſa, & levi infuſione aquam croceo colore citò tingens. Patriam agnoſcit Chinam & Siberiam.

RHAPONTICUM, *LE RHAPONTIC.* PL. 324.

Rhaponticum folio Lapathi majoris glabro. P. 117.
Rhabarbarum forte Dioſcoridis & antiquorum. T. 89.
Rheum Rhaponticum. LIN. SP. 531.

RHAPONTICUM eſt radix Rhabarbarum æmulans; ſed oblongior, levior, minus amara, odorata & inter mandendum lenta ac glutinoſa. In Thraciâ, Scythiâ & Monte aureo reperitur.

RHAMNUS CATHARTICUS, *LE NERPRUN.* PL. 452.

Spina cervina. Officinarum.
Rhamnus catharticus. P. 478. T. 593. LIN. SP. 279.

Baccæ in uſu.

RICINOIDES, *LES PIGNONS D'INDE.* PL. 67.

Ricinus americanus major, ſemine nigro. P. 432.
Ricinoïdes americana, Goſſipii folio. T. 656.
Jatropha Curcas. LIN. SP. 1429.

RICINOIDES eſt fructus oblongus, ovalis, Fabæ minoris magnitudine, unâ parte convexâ, alterâ depreſſâ; ſub pelliculâ corticoſâ, duriuſculâ, nigrâ, nucleum candidum includens: eligatur recens. Planta creſcit in Americâ Calidiore.

RICINUS, *LE RICIN.* PL. 66.

Ricinus vulgaris. P. 432. T. 532.
Ricinus, Gallis Palma Chriſti. LOB. HIST. 392.
Ricinus communis. LIN. SP. 1430.

Semina in uſu.

ROSA DAMASCENA, *LES ROSES MUSCATES, ou DE DAMAS,* PL. 495.

Roſa Moſchata ſimplici flore. P. 482. T. 637.

Rosa Moschata alba. TABER. ICON. 1086.

Flores in usu.

ROSA PALLIDA, *LA ROSE PALE.* PL. 494.

Rosa rubra pallidior. P. 481. T. 637.
Rosa holosericа. LOB. ICON. 2. 207.

Flores in usu.

ROSA RUBRA, *LA ROSE ROUGE, ou DE PROVINS*, (*Rosa Provincialis.*) PL. 495.

Rosa rubra multiplex. P. 481. T. 637.
Rosa Provincialis major. TABER. ICON. 1084.
Rosa Gallica. LIN. SP. 704.

Flores in usu.

ROSMARINUS, *LE ROMARIN.* PL. 497.

Anthos. Officinarum.
Rosmarinus hortensis angustiore folio. P. 217. T. 195.
Rosmarinus officinalis. LIN. SP. 33.

In usu sunt folia & flores qui ANTHOS in officinis nuncupantur.

ROS SOLIS, *LE ROSSOLIS.* PL. 498.

Ros Solis folio rotundo. P. 357. T. 245.
Drosera rotundifolia. LIN. SP. 402.

Tota planta in usu.

RUBIA TINCTORUM, *LA GARANCE.* PL. 500.

Rubia Tinctorum sativa. P. 333. T. 114.
Rubia tinctorum. LIN. SP. 158.

Radix in usu.

RUBUS, *LA RONCE.* PL. 501.

Rubus vulgaris, sive Rubus fructu nigro. P. 479. T. 614.
Rubus fruticosus. LIN. SP. 707.

Folia, fructus vernaculè *Mures sauvages*, & cymæ florentes in usu.

RUBUS IDÆUS, *LE FRAMBOISIER.* PL. 502.

Rubus Idæus spinosus. P. 479. T. 614.
Rubus Idæus. LIN. SP. 706.

Fructus vulgò FRAMBŒSIA, *la Framboise*, folia & cimæ florentes in usu.

RUSCUS, *LE PETIT HOUX, LE HOUX-FRÉLON.* PL. 504.

Ruscus, sive Bruscus. Officinarum.
Ruscus Myrtifolius aculeatus. T. 79.
Ruscus aculeatus. LIN. SP. 1474.

Radix folia & fructus in usu.

RUTA, *LA RUE.* PL. 505.

Ruta hortensis latifolia. P. 336. T. 257.
Ruta graveolens. LIN. SP. 548.

Folia, semina & summitates florentes in usu.

SABINA, *LA SABINE.* PL. 506.

Sabina folio Tamarisci Dioscoridis. P. 487.
Juniperus Sabina. LIN. SP. 1472.

Folia & summitates in usu.

SAGAPENUM, *LA GOMME SÉRAPHIQUE.*

Sagapenum. P. 494. RAJ. HIST. I. 1844.

SAGAPENUM est gummi-resina seu lacryma è sauciatâ Ferulâ Sagapeniferâ fluens. Optimum censetur translucidum, in granis, acre, foris flavum vel rufum, intùs dilutioris coloris, odore ad Porrum accedens. In Mediâ, Persiâ, &c, nascitur.

SAGU, *LE SAGOU.*

Palmam referens arbor farinifera. P. 508.
Palma indica, caudice in annulos protuberante distincto. RAJ. HIST. 1360.
Tessio. KÆMPF. AMŒN. 897.
Cycas circinalis. LIN. SP. 1658.

Sagu ſunt granulâ pallida, è farinâ aut medullâ arboris in Indiâ parata. In lacte vel juſculo, ebullitione diluuntur.

SALAB, *Le Salop.*

Orchis Morio femina. P. 82.
Orchis Morio femina procerior majori flore. T. Herb. vj.
Orchis Morio. Lin. Sp. 1333.

Salab vel Salep eſt radix oblonga, alba, pellucida, paulum compreſſa, non nihil corrugata, ſapore gummi Tragacanthi, odoris nullius. È Turciâ aſportatur exſiccata. Hæc Orchidis ſpecies in paluſtribus pariſienſibus *de Bonelle* & *de Saint-Clair* & in noſtratibus etiam reperitur.

SALICARIA, *La Salicaire.* Pl. 507.

Salicaria vulgaris purpurea, foliis oblongis. T. 253.
Lyſimachia ſpicata purpurea. P. 246.
Lythrum Salicaria. Lin. Sp. 640.

Herba in uſu.

SALIX, *Le Saule.* Pl. 508.

Salix vulgaris alba arboreſcens. P. 473. T. 590.
Salix Alba. Lin. Sp. 1449.

Cortices & folia in uſu.

SALSAPARILLA, *La Salsepareille.* Pl. 29.

Smilax aſpera peruviana, ſive Salſaparilla. P. 296.
Smilax Sarſaparilla. Lin. Sp. 1459.

Salsaparilla ſunt radices Calami ſcriptorii craſſitiei, cum tenui nervo in meditullio, facilè fiſſiles, coloris foris obſcurioris, intùs albicantis: rejice carioſas & pulverulentas. Ex Americâ advehuntur.

SALVIA MAJOR, *La grande Sauge.* Pl. 510.

Salvia major, an ſphacelus Theophraſti? P. 237. T. 180.
Salvia officinalis. Lin. Sp. 34.

SALVIA MINOR, *La petite Sauge.* P. 511.

Salvia minor, aurita & non aurita. P. 237. T. 181.

Eadem eſt ac prior. Folia & flores in uſu.

SAMBUCUS, *Le Sureau*. Pl. 512.

Sambucus fructu in umbellâ nigro. P. 456. T. 606.
Sambucus nigra. Lin. Sp. 385.

Baccæ ejus quæ Grana actes dicuntur, flores, folia & cortices ſecundi in uſu.

SANGUIS DRACONIS, *Le Sang-Dragon*. (*Draco-arbor*). Pl. 92.

Pterocarpus Sanguis Draconis officinarum. Crantz. Inst. *tom.* 2. *pag.* 77.
Draco arbor indica ſiliquoſa, Populi folio. Comm. Hort. Amst. *tom.* 1. *p.* 213. *t.* 109.
Pterocarpus Draco. Lin. Sp. 1662.

Sanguis Draconis eſt ſuccus reſinoſus, concretus, friabilis. Eligendus clarus pellucidus & eleganter ruber. Extillat optimus Sanguis Draconis ex arbore *Pterocarpo Dracone*, in Indiis.

SANICULA, *La Sanicle*. Pl. 514.

Sanicula officinarum. P. 319. T. 326.
Diapenſia. Camer. Epist. 763.
Sanicula europæa. Lin. Sp. 339.
Folia & flores in uſu.

SANTALUM, *Le Santal*.

Santalum album. P. 392. Lin. Sp. 497.
Santalum verum. Breyn. Icon. 94. *t.* 5. *f.* 1.

Santalum album eſt lignum durum, ſolidum, pallidum, odoris & ſaporis grati, ſub-amari, aromatici. Ex Indiâ orientali affertur.

Santalum Album & Citrinum ex unâ & eâdem arbore producitur. Pars corticalis Santalum album dicitur; medullaris verò Citrinum, affirmante *Garcia*. (Dale. Pharmacol. 355). Citrinum albo ponderoſius, fragrantius atque pretioſius eſt.

SANTALUM RUBRUM, *Le Santal rouge*.

Santalum rubrum. P. 393. Raj. Hist. 1805.

Santalum rubrum eſt lignum à cortice externo liberatum, rubrum, ponderoſum, fibroſum, denſum, ſaporis aſtringentis. Ex Indiâ affertur.

SAPONARIA, *La Savoniere*. Pl. 516.

Saponaria major levis. P. 206.
Lychnis ſylveſtris quæ Saponaria vulgò. T. 336.
Saponaria officinalis. Lin. Sp. 584.

Folia in uſu.

SARCOCOLLA. *La Sarcocolle.*

Tithymali myrſinitis ſpecie arbuſcula æthiopica...... Lacrymam fundens. Pluk. *Mantiſſâ*. 183. *t.* 44.
Penæa Sarcocolla. Lin. Sp. 162.

Sarcocollæ granula ſunt gummoſa, parva, friabilia, amaricantia, inodora Eligatur Sarcocolla recens, pallida, (vetuſtate enim ruſeſcit,) ponderoſa & glutinoſa. Ex Æthiopiâ affertur.

SASSAFRAS, *Le Sassafras*. Pl. 38.

Saſſafras arbor ex Florida ficulneo folio. P. 431.
Laurus Saſſafras. Lin Sp. 531.

Sassafras eſt radix levis, acris, odore ad Fœniculum accedens. Eligatur odorata, tecta cortice fulvo foris, intùs ferrugineo. Ex Americâ advehitur.

SATUREIA, *La Sariette*. Pl. 517.

Satureia ſativa. T. 197.
Satureia hortenſis. Lin. Sp. 795.

Herba in uſu.

SATIRYUM, *Le Satyrium*. Pl. 427.

Cynoſorchis militaris major. P. 81.
Orchis militaris major. T. 432.
Orchis militaris. Lin. Sp. 1333.

Radices in uſu.

SAXIFRAGA ALBA, *La Saxifrage blanche*. Pl. 519.

Saxifraga rotundifolia alba. P. 309. T. 252.
Saxifraga granulata. Lin. Sp. 576.

Radix in uſu.

SAXIFRAGA ANTIQUORUM, *La Saxifrage ordiniare, La Casse-pierre.*

Saxifraga antiquorum, quibuſdam. J. B. 3. 338.

Caryophyllus Saxifragus. P. 211.
Lychnis minor Saxifraga. T. 338.
Silene Saxifraga. LIN. SP. 602.

Semina in uſu.

SCABIOSA, *LA SCABIEUSE.* PL. 524.

Scabioſa pratenſis hirſuta, quæ officinarum. P. 269. T. 464.
Scabioſa arvenſis. LIN. SP. 143.

Herba in uſu.

SCAMMONIUM, *LA SCAMMONÉE.* PL. 104.

Convolvulus ſyriacus, ſive Scammonia ſyriaca. T. 83. MORIS. 2. 12. *ſ.* 1. *t.* 3. *f.* 5.
Convolvulus Scammonia. LIN. SP. 218.

SCAMMONIUM eſt reſina nigreſcens, friabilis, odoris ingrati, è radice plantæ educta & concreta. SCAMMONIUM eligatur leve, nitidum ſplendidum, madefactum lacteſcens, & linguam non vehementer vellicens. *Alepenſe* Præſtantius eſt *Smyrnenſi.*

SCILLA, *LA SCILLE BLANCHE, ou ROUGE.* PL. 527.

Scilla vulgaris radice rubrâ, (& albâ). P. 73.
Ornithogalum maritimum, ſeu Scilla radice rubrâ, (& albâ). T. 381.
Scilla maritima. LIN. SP. 442.

SCILÆ radix eſt bulboſa: eligatur recens. Naſcitur in locis maritimis arenoſis Hiſpaniæ: Siciliæ, & Syriæ.

SCORDIUM, *LE SCORDIUM.* PL. 530.

Scordium. P. 247.
Chamædrys paluſtris caneſcens, ſeu Scordium officinarum. T. 205.
Teucrium Scordium. LIN. SP. 790.

Folia & flores in uſu.

SCORZONERA, *LA SCORSONERE.* PL. 532.

Scorzonera latifolia ſinuata. P. 275. T. 476.
Scorzonera Hiſpanica. LIN. SP. 1112.

Radix in uſu.

SCROPHULARIA SYLVESTRIS, *LA SCROPHULAIRE DES BOIS.* PL. 533.

Scrophularia nodoſa fetida. P. 235. T. 166.

Scrophularia nodosa. LIN. SP. 863.

Radix & folia in usu.

SCROPHULARIA AQUATICA, *LA SCROPHULAIRE AQUATIQUE*. PL. 534.

Scrophularia aquatica major. P. 235. T. 166.
Betonica aquatica. DOD. 50.
Scrophularia aquatica. LIN. SP. 864.

Radix & folia in usu.

SEBESTEN, *LES SÉBESTES*. PL. 49.

Sebestena domestica. P. 446.
Cordia Myxa. LIN. SP. 273.

SEBESTEN seu SEBESTINÆ sunt fructus Prunis ferè similes, minores tamen, nigricantes & sub pulpâ carnosâ, dulci, mucilaginosâ, nucleum includentes. Eligantur recentes. Arbor in Syriâ, Ægypto & Malabariâ crescit.

SECALE, *LE SEGLE*. PL. 535.

Secale hibernum, vel majus. P. 23. T. 513.
Roga. DOD. 499.
Secale cereale hybernum. LIN. SP. 124.

Farina & furfur in usu.

SEDUM ACRE, *LA VERMICULAIRE*. PL. 538.

Sempervivum minus vermiculatum acre. P. 283.
Sedum parvum acre, flore luteo. T. 263.
Illecebra seu Sempervivum tertium. DOD. 129.
Sedum acre. LIN. SP. 619.

Herba in usu.

SEDUM MAJUS, *LA GRANDE JOUBARBE*. PL. 536.

Sedum majus vulgare. P. 283. T. 262.
Sempervivum tectorum. LIN. SP. 664.

Folia in usu.

SEDUM MINUS, *LA PETITE JOUBARBE, LA TRIQUE-MADAME*. PL. 537.

Sedum minus teretifolium album. P. 283. T. 262.

Sedum album. LIN. SP. 619.

Herba in uſu.

SEMEN CONTRA, *LA SEMENCE CONTRE LES VERS.*

Semen contra, Semenzina, ſemen Sanctum, Sementina. Officinarum.
Abſinthium Santonicum judaïcum. P. 139.
Artemiſia judaïca. LIN. MANT. 111.

Eligantur ſemina oblonga, ex viridi flaveſcentia, cùm pulvere aut quiſquiliis non mixta; odoris Zedoariæ; ſaporis acris, amari. Planta in Judæâ, Arabiâ & Numidiâ creſcit.

SENECA, *LE SÉNÉKA.* PL. 30.

Polygala caule Simplici erecto, foliis ovato-lanceolatis alternis integerrimis, racemo terminali erecto GRON. VIRG. 1. *p.* 80.
Polygala Senega. LIN. SP. 990.

SENECA eſt radix *Polygalæ virginianæ*, digiti minimi craſſitiei, variè contorta, in plures ramos divaricata, extùs ſubluteа, intùs alba, ſaporis acris, amaricantis & non nihil aromatici. Eligatur recens, integra.

SENECIO, *LE SENEÇON.* PL. 540.

Senecio minor vulgaris. P. 131. T. 456.
Erigeron. LOB. ICON. 225.
Senecio vulgaris. LIN. SP. 1216.

Herba in uſu.

SENNA, *LE SÉNÉ.* PL. 42.

Folia orientalia. Officinarum.
Senna alexandrina, ſive foliis acutis. P. 397.
Caſſia Senna. LIN. SP. 539.

FOLIA SENNÆ ſunt pallido-flavo-virideſcentia, amaricantia, nauſeoſa. Eligantur acuta, recentia, integra, ex Alexandriâ allata; Italica enim ſunt latiora, obtuſiora & vilioris pretii. SENNÆ FOLLICULI ſeu *ſiliquæ* veniunt quoque in uſum: ſunt capſulæ ſeminales, ſulcatæ, recurvæ, ſemilunares, compreſſæ, continentes ſemina nigricantia: eligantur recentes, integræ, & à ſtipitibus liberatæ.

SERPENTARIA VIRGINIANA, *LA SERPENTAIRE DE VIRGINIE.* PL. 30.

Serpentaria virginianæ, ſeu Viperina. Officinarum.

Aristolochia Pistolochia caule nodoso seu Serpentaria virginiana. RAJ. HIST. 394.

Aristolochia Serpentaria. LIN. SP. 1363.

Radices SERPENTARIÆ, sunt fibrosæ, tenues, nigrescentes, aromaticæ, odore Valerianam æmulantes. Plerumquè totam plantam cum radice fasciatim accipimus. Eligantur recentes.

SERPYLLUM, *Le Serpolet.* PL. 541.

Serpyllum vulgare majus. P. 220. T. 197.

Thymus Serpyllum. LIN. SP. 825.

Folia & summitates florentes in usu.

SESAMUM, *Le Sésame, La Jugeoline.*

Sesamum veterum. P. 27.

Digitalis orientalis, Sesamum dicta. T. 165.

Sesamum orientale. LIN. SP. 883.

Semina SESAMI eligantur recentia, albicantia, oleosa, dulcia. In Ægypto, Siciliâ & Italiâ colitur.

SESELI MASSILIENSE, *Le Séséli de Marseille.*

Seseli massiliense, Fœniculi folio. P. 161.

Fœniculum tortuosum. T. 311.

Seseli tortuosum. LIN. SP. 373.

Semen SESELI est oblongum, depressum, viridiusculo-pallidum, odore gratum, acre, aromaticum, ex Galliâ narbonensi & Provinciâ allatum. Eligatur recens.

SIDERITIS, *La Crapaudine.* PL. 544.

Sideritis hirsuta procumbens. P. 233. T. 191.

Sideritis hirsuta. LIN. SP. 803.

Herba in usu.

SIGILLUM BEATÆ MARIÆ, *Le Sceau de Notre-Dame, La racine Vierge.* (*Bryonia nigra racemosa*). PL. 182.

Bryonia lævis, sive nigra racemosa. P. 297.

Tamnus racemosa flore minore, luteo-pallescente. T. 103.

Vitis sylvestris. DOD. 401.

Tamus communis. LIN. SP. 1458.

Radix in usu.

SIMAROUBA, *Le Simarouba.*

Simarouba. Reg. Scient. 1729 & 32.
Terebinthus americana polyphylla. Com. Hort. Amst. 1. *p.* 149. *t.* 77.
An? Burſera gummifera. Lin. Sp. 471.

Simarouba eſt cortex multis fibris conſtans, pallidus, amarore non ingratus, parum aſtringens, reſinoſus, aquam ebullitione lacteo colore inficiens. Europæis innotuit anno 1713.

SINAPI, *La Moutarde.* Pl. 546 & 547.

I. Sinapi Rapi folio. P. 99. T. 227.
Sinapis nigra. Lin. Sp. 933.

II. Sinapi Apii folio. P. 99.
Sinapi album, ſiliquâ hirſutâ, ſemine albo & rufo. T. 227.
Sinapis alba. Lin. Sp. 933.

Alba & nigra ſumuntur indiſcriminatim. Semina in uſu.

SOLANUM, *La Morelle.* Pl. 561.

Solanum officinarum acinis nigricantibus. P. 166. T. 148.
Solanum nigrum vulgatum. Lin. Sp. 266.

Folia, ſummitates florentes & baccæ in uſu.

SOLANUM TUBEROSUM, *La Pomme de terre.* Pl. 562.

Solanum tuberoſum eſculentum. P. 167. *Prodr.* 89. T. 149.
Solanum tuberoſum. Lin. Sp. 265.

Solanum tuberosum in Peru indigenum; in Europâ, ubi nunc colitur, innotuit circa annum 1590.

SOLDANELLA, *La Soldanelle, Le Chou marin.* Pl. 563.

Soldanella maritima minor. P. 295.
Braſſica marina ſive Soldanella. J. B. 2. 166.
Convolvulus maritimus noſtras rotundifolius. T. 83.
Convolvulus Soldanella. Lin. Sp. 226.

Tota planta in uſu.

SONCHUS LÆVIS ET ASPER, *Le Laitron doux et Épineux.* Pl. 564. & 565.

Sonchus lævis, laciniatus, latifolius, (& aſper laciniatus & non laciniatus). P. 123. & 124. T. 474.

Sonchus oleraceus lævis, (& asper). LIN. SP. 1116.

Sonchus lævis, asper, laciniatus & non laciniatus indiscriminatim sumuntur. Folia in usu.

SOPHIA CHIRURGORUM. *LE THALITRON.* PL. 553.

Nasturtium sylvestre tenuissime divisum. P. 105.
Sophia Chirurgorum. LOB. ICON. 738.
Sisymbrium annuum Absinthii minoris folio. T. 226.
Sisymbrium Sophia. LIN. SP. 920.

Semina in usu.

SORBUS, *LE SORBIER ou CORMIER.* PL. 556.

Sorbus sativa. P. 415. T. 633.
Sorbus domestica. LIN. SP. 684.

Fructus in usu.

SPERGULA, L'*ESPARCELLE.*

Alsine Spergula dicta. P. 251. T. 243.
Spergula. J. B. 3. 722. DOD. 537.
Spergula arvensis. LIN. SP. 630.

Herba in usu.

SPHONDYLIUM, *LA BERCE.* PL. 568.

Sphondylium vulgare hirsutum. P. 157. T. 320.
Sphondylium. DOD. 307.
Heracleum sphondylium. LIN. SP. 358.

Folia in usu.

SPINA ALBA, L'*ÉPINE BLANCHE.* PL. 384.

Mespilus Apii folio sylvestris spinosa, sive Oxyacantha. P. 454. T. 642.
Oxyacantha vulgaris sive Spinus albus. J. B. 1. 49.
Cratægus Oxyacantha. LIN. SP. 683.

Fructus in usu.

STAPHISAGRIA, L'*HERBE AUX POUX.* PL. 570.

Staphisagria. P. 324. DOD. 366.
Delphinium Platani folio Staphisagria dictum. T. 428.
Delphinium Staphisagria. LIN. SP. 750.

STAPHISAGRIÆ ſemina ſunt triangularia, aſpera, nigro-griſea, acria, nauſeoſa. Eligantur recentia. È calidioribus regionibus Galliæ, Hiſpaniæ & Italiæ advehuntur.

STŒCHAS ARABICA, *Le Stéchas arabique*. Pl. 45.

Stœchas purpurea. P. 216. T. 216.
Spica florida, *Stœchas arabica vulgò dicta*. J. B. 3. 277.
Lavandula Stœchas. Lin. Sp. 800.

STŒCHADOS SPICÆ eligantur integræ, multis floribus munitæ, odoratæ, recentes. Ex Galliâ & Italiâ afferuntur.

STRAMONIUM, *La Pomme épineuse*. Pl. 572.

Stramonium fructu rotundo ſpinoſo flore albo ſimplici. T. 118.
Datura Stramonium. Lin. Sp. 255.

STRAMONIUM creſcit in Americâ: nunc vulgare eſt in Europâ. Folia in uſu.

STYRAX CALAMITA, *Le Storax calamite*. Pl. 93.

Styrax folio Mali Cotonei. P. 452. T. 598.
Styrax officinale. Lin. Sp. 635.

STYRAX CALAMITA eſt reſina pinguis, rufeſcens, multis granulis albicantibus mixta & odoris ſuavis. Rejicitur nigra & furfurea.

STYRAX IN GRANIS naturalis, rariſſima. Hodie in maſſâ multis quiſquiliis & raſuris ligneis inquinatâ affertur. Olim in calamis ſeu cannis advehebatur, undè nomen CALAMITÆ. Styrax arbor in ſolis regionibus orientalibus, Syriâ, Pamphiliâ, Ciciliâ, reſinam fundit.

SUMACH, *Le Sumach*. Pl. 493.

Rhus virginianum. P. 521. T. 611.
Rhus Typhinum. Lin. Sp. 380.
Fructus & ſemina in uſu.

TACAMAHACA, *La Gomme Tacamaque*. Pl. 94.

Tacamahaca arbor Populo ſimilis reſinoſa altera. P. 430.
Tacamahaca foliis crenatis. Pluk. Alm. 360.
Populus Balſamifera. Lin. Sp. 1464.

TACAMAHACA eſt reſina arida, flaveſcens vel rufa, in glebas compacta, ſaporis reſinoſi aromatici, odoris ſuavis. Eligenda pura, ſuaveolens & fragrans. Duplex reperitur; quæ ſponte fluit, & in corticibus Cucurbitarum aſſervatur, *Tacamaque en coque* dicitur; altera in la-

chrymis & glebis variæ magnitudinis advehitur. Arbor in novâ Hiſpaniâ & inſulâ Madagaſcar creſcit.

TAMARINDUS, *Le Tamarinier*, *Les Tamarins*. Pl. 54.

Siliqua arabica, quæ Tamarindus. P. 403.
Tamarindus indica. Lin. Sp. 48.

Tamarindi ſunt fructus obtriti, in maſſam coacti, rarò integri, nigro-rufeſcentes, acidi, multis villis intertexti, ſemina dura, anguloſa continentes. Eligantur recentes, pingues. Arbor in utrâque Indiâ, Ægypto, & Arabiâ naſcitur.

TAMARISCUS, *Le Tamaris*. Pl. 577.

Tamariſcus narbonenſis. Lob. Icon. 218. T. 661.
Tamarix gallica. Lin. Sp. 386.

Radicis cortex præfertur.

TANACETUM, *La Tanesie*. Pl. 578.

Tanacetum vulgare luteum. P. 132. T. 461.
Athanaſia. Lugd. 955.
Tanacetum vulgare. Lin. Sp. 1184.

Summitates florentes & folia in uſu.

TEREBINTHINA CHIA, *La Térébenthine de Chio*. Pl. 78.

Terebinthus vulgaris. P. 400. T. 579.
Piſtacia Terebinthus. Lin. Sp. 1455.

Terebinthina chia eſt reſinoſa ſubſtantia, pellucida, Terebinthinâ vulgari ſeu Venetâ ſpiſſior, è candido & flavo cæruleſcens, amaricans, ſuaveolens, temporis lapſu ſolideſcens ac flaveſcens magis, tandem fit ſolida. Eligatur pura. Ex Chio & Cypro inſulis advehitur.

THEA, *Le Thé*. Pl. 44.

Chaa. P. 147.
The Sinenſium. Bryen. Cent. 111. *t.* 112. *ic.* 17. *t.* 3.
Thea Bohea, (*& viridis*). Lin. Sp. 735.

Folia Theæ colliguntur & exſiccantur in regno Japonico & Chinâ.

THLASPI, *Le Thlaspi*. Pl. 584.

Thlaſpi vulgatius. T. 212. J. B. 2. 921.
Thlaſpi campeſtre. Lin. Sp. 902.

Semina in uſu.

THYMELÆA, *Le Garou*. Pl. 586.

Thymelæa foliis Lini. P. 463. T. 594.
Daphne gnidium. Lin. Sp. 511.

Thymelæa crescit in Hispaniâ, Italiâ & Galliâ narbonensi. Radices afferuntur; quibus succedaneæ sunt radices Thymelææ Mezerei. Ligni cortex hodiè ad usum externum adhibetur.

THIMELÆA MEZEREUM, *Le bois genti*, *Le Mézéréon*. Pl. 333.

Laureola folio diciduo, flore purpureo, officinis Laureola femina. P. 462.
Daphnoïdes, Camer. Epist. 937.
Thymelæa Lauri folio deciduo sive Laureola femina. T. 595.
Daphne Mezereum. Lin. Sp. 509.

Fructus & semina utriusque Thymelææ, Grana cnidia seu Cocci cnidii dicuntur.

THYMUS, *Le Thim*. Pl. 588.

Thymus vulgaris. P. 219. T. 196. Lin. Sp. 825.

Folia & summitates florentes in usu.

TILIA, *Le Tilleul*. Pl. 590.

Tilia femina folio majore, (*& minore*). P. 426. T. 611.
Tilia europæa. Lin. Sp. 733.

Folia, flores & fructus in usu.

TITHYMALUS CATAPUTIA, L'*Épurge*. Pl. 593.

Lathyris major. P. 293.
Tithymalus latifolius Cataputia dictus. T. 86.
Euphorbia Lathyrus. Lin. Sp. 655.

Semen in usu.

TORMENTILLA, *La Tormentille*. Pl. 596.

Tormentilla sylvestris. P. 326. T. 298.
Tormentilla erecta. Lin. Sp. 716.

Radix in usu.

TRAGACANTHUM

TRAGACANTHUM GUMMI, *La Gomme Adragant.*

Tragacantha. P. 388.
Tragacantha massiliensis. T. 417.
Astragalus Tragacantha. Lin. Sp. 1073.

Tragacanthum est lacryma gummosa, lucida, tenax, levis, mucilaginosa, è vulneratâ plantâ fluens. Eligenda alba, pura, vermiculata, subdulcis. Planta in littore Massiliensi & Æthnâ nascitur.

TRITICUM, *Le Froment.* Pl. 606.

Triticum hibernum aristis carens. P. 21. T. 512. Lin. Sp. 126.

Semen in usu. Ex eo fit Farina, Similago, Furfur, Amylum & Panis, sive *fermentatus*, sive *azymus* seu fermenti expers (*Pain à chanter*).

TURPETHUM, *Le Turbith.* Pl. 32.

Turpethum repens, foliis Althææ vel indicum. P. 149.
Convolvulus indicus..... Turbith officinarum. T. 84.
Convolvulus Turpethum. Lin. Sp. 221.

Turpethi radicum cortices eligantur resinosi, albicantes, non cariosi. Ex Malabariâ & insulâ Ceylan advehuntur.

TUSSILAGO, *Le Tussilage.* Pl. 607.

Tussilago vulgaris. P. 197. T. 487.
Tussilago Farfara. Lin. Sp. 1214.

Folia & flores in usu.

VALERIANA HORTENSIS, *La grande Valériane.* Pl. 608.

Valeriana hortensis. P. 164. T. 132.
Valeriana Phu. Lin. Sp. 45.

Radix & folia in usu.

VALERIANA SYLVESTRIS, *La Valériane des Bois.* Pl. 609.

Valeriana sylvestris major. P. 164. T. 132.
Valeriana officinalis. Lin. Sp. 45.

Folia & radix in usu.

VANILLA, *La Vanille.* Pl. 55.

Vanilla flore viridi & albo, fructu nigricante. Plum. Gen. 25. *Icon.* 188.

Vanillæ. MERIAN. SUR. 25.
Lobus aromaticus ſubfuſcus, Terebinthi corniculis ſimilis. P. 404.
Epidendrum Vanilla. LIN. SP. 1374.

Siliquæ VANILLÆ ſunt compreſſæ, longæ, calami ſcriptorii majoris craſſitiei, coloris atro-fuſci, ſaporis aromatici, odoris grati, pulpam ſeu medullam cum minutiſſimis acinis continentes. Eligendæ pingues & recentes. Ex Americâ afferuntur.

VERBASCUM, *LA MOLÊNE, LE BOUILLON BLANC*. PL. 613.

I. *Verbaſcum mas latifolium luteum*. P. 239. T. 146.
Verbaſcum Tapſus. LIN. SP. 252.

II. *Verbaſcum femina flore luteo magno*. P. 239. T. 147.
Verbaſcum Phlomoïdes. LIN. SP. 253.

Tapſus & Phlomoïdes ſumuntur indiſcriminatim. Folia & flores in uſu.

VERBENA, *LA VERVEINE*. PL. 614.

Verbena communis flore cæruleo. P. 269. T. 200.
Verbena officinalis. LIN. SP. 29.

Herba florida in uſu.

VERONICA, *LA VÉRONIQUE*. PL. 616.

Veronica mas ſupina & vulgatiſſima. P. 246. T. 143.
Veronica officinalis. LIN. SP. 14.

Herba florida in uſu.

VIOLA, *LE VIOLIER, LES VIOLETTES*. PL. 622.

Viola martia purpurea flore ſimplici odoro. P. 199. T. 419.
Viola odorata. LIN. SP. 1324.

Folia, flores & ſemina in uſu.

VIRGA AUREA, *LA VERGE D'OR*. PL. 627.

Virga aurea vulgaris latifolia. J. B. 2. 1062. T. 484.
Solidago Virga aurea. LIN. SP. 1232.

Radices, folia & flores in uſu.

VIRGA AUREA MAJOR, *LA GRANDE VERGE D'OR*.

Virga aurea, ſive Solidago ſaracenica latifolia ſerrata. J. B. 2. 1063.

Consolida aurea. TABER. ICON. 556.
Jacobæa alpina foliis longioribus serratis. T. 485.
Senecio saracenicus. LIN. SP. 1221.

Folia & flores in usu.

VISCUM, *LE GUI*. PL. 628.

Viscum baccis albis. P. 423. T. 610.
Viscum album. LIN. SP. 1451.

VISCUM est planta parasitica, fruticosa; multis arboribus innascens. Præfertur *Viscum Quercûs*. È fructu ejus, seu baccis, paratur GLUTEN, (*la Glu*): paratur quoque Gluten ex foliis Ilicis aquifolii.

VITIS, *LA VIGNE*. PL. 630.

Vitis vinifera. P. 298. T. 613. LIN. SP. 293.

VINUM est succus Uvarum maturarum VITIS VINIFERÆ, fermentationem spirituosam passus. Varia in variis regionibus Vina parantur, *alba*, *rubra*, *gallica*, *hispanica*, *italica*, *rhenana*, &c.

Vinum sit clarum, antiquum, subtile, maturum.

È Vino fit *Spiritus Vini*, AQUA VITÆ dictus.

FÆCES VINI veniunt quoque in usum.

TARTARUM est sal essentiale Vini, quo dolia in quibus Vinum asservatur, intùs quasi incrustantur: Vina rubra RUBRUM, alba ALBUM TARTARUM largiuntur.

ACETUM est Vinum fermentationem acidam passum. Sit fragrans, fortis, & gratæ aciditatis.

VITIS IDÆA, L'*AIRELLE*, *LA MYRTILLE*. PL. 631.

Vitis Idæa foliis oblongis crenatis fructu nigricante. P. 470. T. 608.
Vitis Idæa, sive Myrtillus. TABER. ICON. 1078.
Vaccinium Myrtillus. LIN. SP. 498.

Fructus in usu.

ULMARIA, *LA REINE DES PRÉS*. PL. 632.

Ulmaria. T. 265. CLUS. cxviij. J. B. 3. 488.

Regina prati. DOD. 57.
Spiræa Ulmaria. LIN. SP. 702.

Radix, folia & flores in uſu.

ULMUS, L'*ORME*. PL. 633.

Ulmus campeſtris. P. 426. T. 601. LIN. SP. 327.

Cortices, folia & aqua veſicularum in uſu.

UMBILICUS VENERIS, *LE NOMBRIL DE VÉNUS*. PL. 634.

Cotyledon vera, radice tuberoſâ. J. B. 3. 683.
Cotyledon major. P. 285. T. 90.
Cotyledon Umbilicus Veneris tuberoſa. LIN. SP. 615.

Herba in uſu.

URTICA, L'*ORTIE GRIÊCHE, ET LA GRANDE ORTIE*. PL. 637.

Urtica urens major, (& minor). Officinarum.
Urtica urens maxima, (& minor). P. 232. T. 534.
Urtica urens, (& dioïca). LIN. SP. 1396.

Sumuntur indiſcriminatim. Herba in uſu.

URTICA ROMANA. L'*ORTIE ROMAINE*. PL. 638.

Urtica urens pilulas ferens. P. 232.
Urtica Romana. LOB. ICON. 522.
Urtica urens pilulas ferens 1. *Dioſcoridis, ſemine Lini.* T. 535.
Urtica pilulifera. LIN. SP. 1395.

Herba in uſu.

UVA URSI, *LA BOUSSEROLE ou BUXEROLE.*

Uva Urſi. CLUS. HIST. 63. T. 599.
Radix Idæa putata & Uva Urſi. J. B. 1. 524.
Arbutus Uva Urſi. LIN. SP. 566.

Folia & ſummitates in uſu.

VULNERARIA RUSTICA, *LA VULNÉRAIRE DES PAYSANS.* PL. 640.

Loto affinis, Vulneraria pratenſis. P. 332.
Vulneraria ruſtica. T. 391.
Vulneraria ruſtica flore ferrugineo. ACT. STOCH. 1741.

Anthyllis Vulneraria. LIN. SP. 1012.

Herba in uſu.

ZEDOARIA, *LE ZÉDOAIRE.* (*Zerumbeth*). PL. 33.

Zedoaria longa, (*& rotunda*). P. 36.
Malan-Kua, RHEED. MAL. II. *p.* 17. *t.* 9.
Kæmpferia rotunda. LIN. SP. 3.

ZEDOARIÆ radices ſunt tuberoſæ, nodoſæ, fragrantes, cinereæ, ſapore acri, amaricante, ad Camphoram accedente. Eligendæ ponderoſæ, non carioſæ. Ex Indiâ orientali afferuntur.

ZEDOARIA LONGA & ROTUNDA ejuſdem radicis variæ partes eſſe videntur.

ZINZIBER, *LE GINGEMBRE.* PL. 34.

Zinziber. P. 35.
Inſchi. RHEED. MAL. II. *p.* 21. *t.* 12
Amomum Zinziber. LIN. SP. I.

ZINZIBER eſt radix ramoſa, nodoſa compreſſa, pallida, aromatica, ſaporis fervidi. Eligatur ponderoſa, minùs fibroſa, intùs albida, non carioſa.



CLASSIS SECUNDA.

DE SIMPLICIBUS EX ANIMALI REGNO.

ZOOLOGIA animalium naturam, habitum, victum, moresque docet. Vide *naturalis historiæ* auctorum scripta: D. BUFFON, BRISSON, ARTEDI, RÉAUMUR, &c.

Medicamenta simplicia quæ ex animali regno desumuntur, vel sunt ANIMALIA integra, vel animalium PARTES, aut PRODUCTA: *ossa*, scilicet, *testæ*, *ungulæ*, *medulla*, *caro*, *pinguedo*, *sanguis*, *lac*, *lapilli*, &c.

PINGUEDO est pars oleosa concreta in variis corporis animalium partibus deposita. Ratione sedis, consistentiæ, & individuorum è quibus extrahitur, varium sortitur nomen. Quæ in internis corporis humani, vel animalium quadrupedum non cornutorum, partibus reperitur, AXUNGIA nuncupatur; quæ in avibus, ADEPS; quæ verò solidior est, & circa renes animalium cornutorum & ruminantium adjacet, SEBUM aut SEVUM dicitur; tandem quæ in ossium cavitatibus continetur, MEDULLA vocatur.

TABULA SYNOPTICA.

1. HOMO.

2. QUADRUPEDIA.

SOLIDIPEDIA.

Elephas.
Equus.
Asinus.

FISSIPEDIA.

PECORA,

CORNUTA,

GREGARIA.

Bos, *Vacca*, *Vitulus*.
Hircus, *Capra*.
Ovis, *Aries*, *Vervex*, *Agnus*.

SOLITARIA.

Cervus.
Mazama.
Alce.
Capra bezoardica.

NON CORNUTA.

Camelus.
Capra moschus.
Sus.

FERÆ,

INDOMITÆ.

Leo.
Ursus.
Lupus.
Vulpes.
Taxus.
Zibethum.
Talpa.
Erinaceus.

DOMESTICÆ.

Canis.
Felis.

GLIRES.

Lepus.
Cuniculus.
Castor.
Mus.

3. AVES,

PALMIPEDES.

Anas.
Anser.

FISSIPEDES.

Columba.
Gallus, *Gallina*.
Pavo.
Hirundo. &c.

4. PISCES,

MARINI.

Cete.
Monoceros.
Accipenser.
Merlangius.

FLUVIATILES.

Carpio.
Perca.
Lucius.
Anguilla.

5. REPTILIA.

AMPHIBIA.

Testudo.
Lacertus.
Scincus.
Rana.
Bufo.

SERPENTES.

Vipera. &c.

6. INSECTA.

COLEOPTERA.

Cantharis officinarum.

Proscarabæus Meloë.

HEMIPTERA. *Rostrum inflexum.*

Coccus Ilicis. *Kermes.*

Coccus Cacti. *Coccinella.*

LEPIDOPTERA.

Bombyx. &c.

HYMENOPTERA.

Apis.

Formica.

Cynips Quercûs. *Galla.*

Cynips Rosæ. *Spongia Cynosbati.*

DIPTERA.

Musca Cardui. *Hæmorrhoïs Cardui.*

APTERA.

Oniscus.

Scorpio.

Cancer marinus.

Cancer fluviatilis.

Cancellus. *Bernardus Heremita.*

7. VERMES,

SIMPLICES.

Lumbricus.

Hirudo.

TESTACEI.

UNIVALVES.

Cochlea.

BIVALVES.

Mater Perlarum.

Ostreum.

BRACHIATI.

Sepia.

8. LITHOPHYTA ET ZOOPHYTA.

Corallium album.

Corallium rubrum.

Corallina.

Spongia.

Androsace.



ORDO

ORDO ANIMALIUM.

ACCIPENSER, ſeu ICHTHYOCOLLA, *Le Colpesce, L'Esturgeon a colle.* Pl. 660.

Accipenſer tuberculis carens. Arted. *Gen.* 65. *Syn.* 92.
Accipenſer Huſo. Lin. Syst. 1. 404.

Ex Accipenſeris cartilaginibus, corio, inteſtinis, &c. elixis, paratur Ichthyocolla : optima eſt alba, ſolida, in ſpiras contorta, odoris nullius, diaphana, facile ac tota ſolubilis. È Ruſſiâ affertur. *Garum Caviar* ex Accipenſeris ovis conficitur. Accipenſer quamvis marinus, in fluviis etiam reperitur.

ALCE, L'*Élan.* Pl. 709. Buffon. *t.* 10. *p.* 226.

Alce officinarum. Raj. Quadr. 86.
Cervus Alces. Lin. Syst. 1. 92.

Ungulæ & cornua ſunt in uſu : eligantur integra. Mas, Cervorum more, cornua ſolida, ramoſa, decidua præfert. Habitat in borealibus Europæ, Aſiæ & Americæ regionibus.

ANAS SYLVESTRIS. *Le Canard sauvage.* Pl. 678.

Anas fera. Briss. Ornith. *tom.* 6. *p.* 318.
Boſchas major. Jonst. Av. 97.
Anas Boſchas. Lin. Syst. 1. 205.

Pinguedo in uſu. Habitat in lacubus Europæ : victitat Ranis, Culicibus, Lemnâ, ſordibus.

ANDROSACES, ſive ACETABULUM.

Androſaces petræ innaſcens. P. 367.
Acetabulum marinum. T. 569.
Tubularia Acetabulum. Lin. Syst. 1. 1303.

Eſt ſtirps radicata, filiformis, ſimpliciſſima, Tubuloſa; flores (animalia compoſita, efflorſcentia) habens terminales, ſolitarios. In mari Mediterraneo, Americano reperitur.

ANGUILLA, L'*ANGUILLE*. PL. 661.

Muræna unicolor, maxillâ inferiore longiore. ARTED. *Gen.* 24. *Spec.* 66. *Syn.* 39.
Anguilla. JONST. PISC. 81.
Muræna Anguilla. LIN. SYST. I. 426.

Fel & pinguedo in uſu. Habitat in fluviis, lacubus, ſtagnis Europæ; latet in luto, noctu obambulat, delectatur cadaveribus.

ANSER, L'*OYE*. PL. 679.

Anſer domeſticus. RAJ. AV. 136. BRISS. ORNITH. *tom. 6. p.* 262.
Anas Anſer. LIN. SYST. I. 197.

Pinguedo & ſtercus in uſu. Habitat in Europæ & Americæ, maximè borealis, lacubus ac paludibus.

APER, *LE SANGLIER*. PL. 727. BUFFON. *tom.* 6. *p.* 272.

Sus agreſtis, ſeu Aper. RAJ. QUADR. 96.
Sus ſcrofa. LIN. SYST. I. 102.

Dens in uſu: eligatur integer. Vix Aper differt à Sue domeſtico. Habitat in regionibus Europæ borealibus.

APIS, L'*ABEILLE*, *LA MOUCHE A MIEL*. PL. 650.

Apis operaria, mas, femina. RÉAUM. INS. *tom.* 5. *tab.* 21. 23.
Apis mellifica. LIN. SYST. I. 955.

MEL, *le Miel*, eſt ſubſtantia liquida, craſſiuſcula, ex albo flaveſcens, è favis Apum collecta, varia in variis regionibus. *Album* ſeu *virgineum* ſine igne & è favis recentibus; *flavum*, ignis ope & è vetuſtioribus favis elicitur. Optimum cenſetur purum, ſpiſſum, Narbonenſe: eligatur aromaticum, fragrans, guſtui gratum.

CERA, *La Cire*, eſt ſubſtantia *flava*, odoris mellei, pinguis, oleoſa, flexilis, è favis Apum calore liquata & expreſſa: multiplici lotione & inſolatione fit *alba*.

Apum reſpublica Gynæcocratica eſt, Reginâ unicâ imperante. Favos ſtruunt cæreos, & Mel è nectariis florum colligunt: in Europæ arboribus cavis habitant; at frequentius in alveariibus hoſpitantur.

ASINUS, L'*ASNE*. PL. 713. BUFFON. *t.* 6. *p.* 132.

Aſinus. RAJ. QUADR. 63.

Equus Asinus. LIN. SYST. 1. 100.

Lac in usu. Ex Oriente est originarius.

BOMBYX. *Le Ver a soie*. PL. 652. RÉAUM. INS. *tom.* 1. *t.* 4. *f.* 14. *& tom.* 2. *t.* 5. *f.* 2.

Bombyx Mori. LIN. SYST. 1. 817. GEOF. INS. 2. 116.

Sericum crudum in usu.

BOS. *Le Bœuf*. PL. 699. BUFFON. *t.* 6. *p.* 171.

Bos domesticus. JONST. QUAD. 26.
Bos Taurus. LIN. SYST. 1. 98.

In usum adhibentur medulla cruris, sebum, fel, calculus felleus, lac, sanguis, cornua, priapus, stercus, &c.

AQUA MILLE-FLORUM Codicis Parisiensis distillatur è stercore vaccino. Multi per eam intelligunt Urinam ipsam Vaccæ verno tempore pascentis, & ab aliquot diebus à Tauro separatæ. BOS hospitatur ubiquè: læditur à Cicutâ, Aconito, Anemone. Mas TAURUS, *le Taureau*; femina VACCA, *la Vache*; fetus VITULUS, *le Veau*, dicitur.

BUFO, *Le Crapaud*. PL. 672.

Bufo, *sive Rubeta*. RAJ. QUADR. 252.
Rana Bufo. LIN. SYST. 1. 354.

Integer in usu. Reperitur in rudetis umbrosis; distinguitur à Ranâ esculentâ corpore ventricoso, lurido, fusco, verrucis lactescentibus venenatis. Viviparus est; delectatur Cotulâ, Actæâ, Stachyde fetidâ. A Buteone voratur.

CANCER FLUVIATILIS, *L'Écrevisse de Rivière*. PL. 654.

Cancer seu Astacus fluviatilis officinarum. MATH. 228.
Cancer Astacus. LIN. SYST. 1. 1051. JONST. EXSANG. *t.* 4. *f.* 1. WILLIS. *tom.* 2. *p.* 15. *tab.* 3.

Integer in usu. OCULI CANCRORUM in officinis dicuntur lapilli in capita Cancri inventi, duri, albi, terrei, orbiculati, unâ parte compressi ac in modum acetabuli sinuati, alterâ convexi (*calculus oculus*. LIN. SYST. NAT. *tom.* 3. *p.* 177). Cancer in Europæ fluviis & lacubus habitat. Hepate Bovis, vel Lumbricibus in domibus nutritur: Urticæ foliis, asperso Aceto, servatur.

CANCER MARINUS, *Le Crabe*, *Le Poupart*. Pl. 653.

Pagurus. Bel. Aq. 368.
Cancer Pagurus. Lin. Syst. I. 1044.

Chelarum apices nigricantes in usu. Crustam deponunt quotannis. Victitant cadaveribus.

CANCELLUS, *Le Soldat*, *ou Bernard l'Hermite*. Pomet. *tom.* 2. *p.* 213. *f.* 59.

Cancellus. Bel. Aq. 362.
Cancer Bernhardus. Lin. Syst. I. 1049.

Ex eo paratur Oleum. Habitat in oceano Europæo, intra varias testas Cochlearum quas vacuas intrat, trahitque & mutat, prout adolescit.

CANIS, *Le Chien*. Pl. 701. Buffon. *t.* 6. *p.* 309.

Canis familiaris. Lin. Syst. I. 56.

Catelli sunt in usu. Album Græcum officinarum dicuntur excrementa alba, non fetentia, Canis ossibus nutriti. Canis à Gramine vomitu purgatur: Lambendo vulnera curat: rabiem morsu disseminat.

CANTHARIS, *La Mouche Cantharide*. Pl. 655.

Cantharides vulgares, *Muscæ virides officinarum*. Raj. Ins. 101.
Meloë vesicatorius. Lyn. Syst. I. 679.

Cantharides sunt insecta coleoptera, ex auro virescentia, fetida. Eligantur integra, recentia, non pulverulenta. Habitant in Ligustro, Fraxino, Sambuco, Syringâ. È calidioribus regionibus afferuntur.

CAPRA, *La Chévre*. Pl. 703. Buffon. *t.* 6. *p.* 253.

Capra domestica. Raj. Quad. 77.
Capra Hircus. Lin. Syst. I. 94.

Lac caprinum & sanguis exsiccatus Hirci in usu. Mas Hircus, *le Bouc*; femina Capra, *la Chevre*; fetus Hædus, *le Chevreau*, dicitur.

CAPRA BEZOARTICA, *La Chévre du Bézoard* (*Capricerva orientalis*). Pl. 705. Buffon. *t.* 10. *p.* 339.

Capricerva. Kæmpf. Amœnit. 398.
Hircus Bezoarticus. Raj. Quadr. 80.
Capra Bezoartica. Lin. Syst. I. 96.

BEZOARD ORIENTALE (*calculus Bezoard.* LIN. SYST. NAT. I. 176). Eſt calculus ſubrotundus, ſolidus, non bibulus, in abomaſo ventriculo Capræ ortus. Eligatur lamellatim concretus, cujus cavitas interna non planè vacua, & qui chartæ cretâ oblitæ affrictus lineam ducat ex luteo viridem. Capra habitat in Perſiâ.

CAPRA MOSCHI, *GAZELLE*. PL. 704. BUFFON. *t.* 10. *p.* 443.

Capra Moſchus. JONST. QUADR. 55.
Moſchus moſchiferus. LIN. SYST. I. 91.

MOSCHUS officinarum eſt ſubſtantia unctuoſa, fragrantiſſima è folliculo propè umbilicum Capræ moſchi excerpta. Moſchus eligatur ſiccus, è ferrugineo nigricans, inter mandendum arenularum expers. Moſchus verſus Chinam in Tartariâ habitat.

CARPIO, *LA CARPE*. PL. 664.

Cyprinus cirris quatuor, oſſiculo tertio pinnarum dorſi, ac ani uncinulis armato. ARTED. *Gen.* 4. *Spec.* 25. *Syn.* 3.
Cyprinus. JONST. PISC. *l.* 3. *tit.* 3. *c.* 6. *t.* 29. *f.* 3-6.
Cyprinus Carpio. LIN. SYST. I. 525.

LAPIS CARPIONUM officinarum, eſt os triangulare in ſummo palato reperiundum.

CASTOR, *LE CASTOR*. PL. 706. BUFFON. *t.* 8. *p.* 39.

Caſtor officinarum, ſive Fiber. RAJ. QUAD. 209.
Caſtor Fiber. LIN. SYST. I. 78.

CASTOREUM officinarum eſt ſubſtantia fuſca, fetida, amara, ingrata, in folliculis celluloſis incluſa. Optimum è Ruſſiâ affertur, ponderoſum, carnoſum, acre, odore gravi. Caſtores in borealibus Europæ, Aſiæ, & Americæ regionibus, in modum Reipublicæ habitant, & ad ripas fluviorum & lacuum, corticibus Sorbi, Salicis, & potiſſimum Populi, victitant. Ad regionem pubis utriuſque ſexûs folliculi fetidi CASTOREUM, dum recens eſt, liquidum ut axungia, includentes reperiuntur.

CERVUS, *LE CERF*. PL. 707. BUFFON. *t.* 7. *p.* 13.

Cervus. RAJ. QUAD. 84.
Cervus Elaphus. LIN. SYST. I. 93.

Cornu, medulla & os cordis in uſu.

CERVUS MAZAMA, *Le Mazame*. BUFFON. *t.* 10. *p.* 424.

Mazama seu Cervus. HERNAND. MEX. 324.
Cuguacu-été. PISON. 98.
Cervus Capreolus. LIN. SYST. 1. 94.

BEZOARD OCCIDENTALE (*calculus Bezoard.* LIN. SYST. NAT. *t.* 3. *p.* 176.) orientali fragilius & laxioris est compagis; lamellis constans crassioribus, pilos aut paleas in meditullio sæpe continet. Reperitur in ventriculo abomaso Cervi Mazamæ in Mexico. At in eâ regione multa reperiuntur animalia hoc BEZOARD producentia: indè diversitas figuræ, coloris & pretii.

CETUS DENTATUS, *Le Cachalot*. PL. 662.

Catodon fistulâ in cervice. ARTED. *Gen.* 79. *syn.* 108.
Cete. CLUS. EXOT. *l.* 6. *c.* 17.
Balena major in inferiore tantum maxillâ dentata, macrocephala, bipinnis. RAJ. PISC. 15.
Physeter macrocephalus. LIN. SYST. 1. 107.

SPERMA CETI est substantia candida ceræ instar, pinguis, è cerebro Ceti educta. Eligatur recens, albissima, non rancida.

COCHLEA, seu LIMAX TERRESTRIS, *Le Limaçon, L'Escargot.* PL. 644.

Pomatia. GESN. AQ. 255.
Cochlea cineracea maxima, edulis, cujus os operculo crasso velut gypseo per hyemem clauditur. LISTER. ANGL. *p.* 111. *t.* 2. *f.* 1.
Helix Pomatia. LIN. SYST. 1. 1244.

Testæ cum ipsis animalibus in usu. Testa turbinata est, cinerea sive sub albida, brevioris figuræ, intra quinque anfractus seu orbes finiens. Habitat in hortis ac vinetis.

COCCUS ILICIS, *La Graine d'Écarlate.* PL. 117.

Coccus infectorius, seu Chermes, Officinarum.
Coccus Ilicis. LIN. SYST. 1. 740.

GRANA KERMES seu CHERMES sunt insecta hemiptera in Quercu cocciferâ Gallo-Provinciæ reperiunda, ubi Aceto immerguntur & exsiccantur. Eligenda integra, recentia, rubicundo-fusca.

NOTA. SYRUPUS È GRANIS KERMES ad nos aſportatur ex Gallo-Provinciâ.

COCCUS OPUNTIÆ, *LA COCHENILLE.* PL. 118.

Coccus indicus, ſeu Coccinella. Officinarum.
Coccus Cacti coccinelliferi. LIN. SYST. 1. 742.

COCCINELLÆ ſunt inſecta hemiptera, in Opuntiâ ſeu Cacto novæ Hiſpaniæ collecta. Denſo fumo ſuffocantur, inſolantur, leniter manibus confricantur ut pedes & antennæ decidant, & in grana abeant. Eligantur integræ, ponderoſæ, foris albicantes, tritæ verò purpureæ.

COLUMBA, *LE PIGEON.* PL. 685. BUFFON. OIS. *t.* 4. *p.* 301.

Columba domeſtica. RAJ. AV. 59. BRISS. ORNITH. *t.* 1. *p.* 68. LIN. SYST. 1. 279.

Sanguis, fimus & ipſa Columba in uſu.

CONCHA MARGARITIFERA, *LA NACRE DE PERLE.* PL. 646.

Mater Unionum, Mater Perlarum. Officinarum.
Mytilus margaritiferus. LIN. SYST. 1. 1155.

MATER PERLARUM officinarum nominatur concha ſeu teſta valida ponderoſa, foris rugoſa, aſpera, non ſtriata, intùs levis, argentei coloris, ex Oceano utriuſque Indiæ aſportata. MARGARITÆ, UNIONES, ſeu PERLÆ ORIENTATES officinarum (*calculus Margarita.* LIN. SYST. NAT. *t.* 3. *p.* 177.) ſunt calculi ſeu lapilli rotundi, anguloſi, albi, pellucidi, in Conchis margaritiferis reperti.

CORALLINA, *LA CORALLINE.* PL. 39.

Muſcus marinus, ſive Corallina officinarum. P. 363.
Corallina officinarum. LIN. SYST. 1. 1304.

Eſt ſtirps radicata, geniculata, filamentoſa, calcarea, metamorphoſi tranſiens in florens animal. Reperitur in Oceano europeo & Mediterraneo.

CYNIPS QUERCUS, *LE CINIPS DE LA NOIX DE GALLE.* RÉAUM. *tom.* 3. *tab.* 39. *f.* 14-17.

Cynips Quercûs folii. LIN. SYST. 1. 918.

Eſt inſectum hymenopterum in Gallis globoſis Quercûs quas efformat reperiundum.

GALLÆ officinarum (GEOF. PL. 116. B.) ſunt excreſcentiæ à punctura Cynipis Quercûs ortæ. Eligantur nigræ, nodoſæ, aculeatæ ponderoſiores, minores, quæ ex Alepo & Smyrnâ aſportantur. Improbantur majores, leviores & flaveſcentes.

CYNIPS ROSÆ, L'*INSECTE DU BEDEGUAR*. RÉAUM. *tom.* 3. *tab.* 46. *f.* 5. 6.

Diplolepis Bedeguaris niger, abdomine ferrugineo apice nigro, pedibus rufis. GEOF. INS. 2. 310.
Cynips Roſæ. LIN. SYST. 1. 917.

SPONGIA CYNOSBATI, *le Bedeguar*, (*LOB. ICON.* 2. 210. *RÉAUM. tom.* 3. *p.* 47. *f.* 104.) *L'Éponge de Cynorrhodon*, eſt excreſcentia ſpongioſa, hirſuta, coloris rufi, herbacei, odoris dùm recens eſt roſei, magnitudinis variæ. Adnaſcitur Roſæ caninæ, & à puncturâ Cynipis Roſæ oritur.

ELEPHAS, L'*ÉLÉPHANT*. PL. 711. BUFFON. *t.* 9. *p.* 187.

Elephas. RAJ. QUAD. 131.
Elephantus. JONST. QUAD. 30. *t.* 7. 8. 9.
Elephas-maximus. LIN. SYST. 1. 48.

EBUR officinarum dicuntur Elephantis dentes laniari ſuperiores. Ebur ad albedinem uſtum SPODIUM nuncupatur.

ERINACEUS, *LE HÉRISSON*. PL. 710. BUFFON. *t.* 7. *p.* 310.

Echinus, ſeu Erinaceus terreſtris. RAJ. QUAD. 231.
Erinaceus europæus. LIN. SYST. 1. 75.

Integer in uſu: præparatur uſtione. Habitat in ſylvis Europæ, victitat Bufonibus, Vermibus, coleopteris, conchis, fructibus, aviculis, cadaveribus.

ERINACEUS MALACENSIS, *LE HÉRISSON DE MALACA.*

Erinaceus auriculis pendulis. BRIS. QUAD. 183.
Porcus aculeatus ſeu Hiſtrix malacenſis. SEBA. *t.* 1. *p.* 81.
Erinaceus malacenſis. LIN. SYST. 1. 75.

LAPIS HISTRICIS officinarum (*BOERH. de viribus med.* 194), ſeu *Pedra del Porco* eſt calculus fellis hujus Erinacei (*LIN. SYST. t.* 3. *p.* 177), levis, amariſſimus, ſaponis inſtar lubricus, nucis Juglandis magnitudinis. Cùm rarò ad nos perveniat, ei ſubſtitui poteſt Calculus felleus Bovis.

FORMICA,

FORMICA, *La Fourmi.* Pl. 656.

Formica rufa, (*fusca*, & *atra.*) Lin. Syst. 1. 962 & 963.

Formicæ & earum ova in usu. Formicæ sunt insecta hymenoptera ut plurimum, in acervis acerosis sylvaticis socialiter viventia. Pelluntur piscium rejectaneis, & retibus his immersis ad arborum truncos circumligatis.

GALLUS, *Le Coq.* Pl. 689. Buffon. Ois. *t.* 3. *p.* 88.

Gallus Domesticus. Briss. Ornith. *tom.* 1. *p.* 166.
Gallus gallinaceus seu Gallina. Raj. Av. 51.
Phasianus Gallus. Lin. Syst. 1. 270.

Gallinæ ova recentia & eorum testæ veniunt in usum. Læditur baccis Sambuci; Pipere à pediculis liberatur. Gallina, *la Poule*, Pullus Gallinaceus, *le Poulet*, dicitur.

HIRUNDO, L'*Hirondelle.* Pl. 689.

Hirundo domestica, (& *Rustica.*) Raj. Av. 71.
Hirundo urbica, (& *rustica.*) Lin. Syst. 1. 343 & 344.

Nidus in usu.

HIRUDO, *La Sang-sue.* Pl. 647.

Sanguisuga. Officinarum.
Hirudo medicinalis. Raj. Ins. 3. Lin. Syst. 1. 1079.

Eligendæ sanæ, nigro-virescentes, lineis flavis maculatæ. In aquâ fluviatili sæpius renovatâ servandæ. Aut plena cruoris, aut Inspersâ muriâ, cutim mittit præstantissima phlebotoma.

HOMO, L'*Homme.*

Nosce te ipsum. Lac Muliebre, axungia, cranium Hominis violentâ morte extincti non humati, & Mumia Ægyptiaca in usu.

Mumiæ Ægyptiacæ sunt cadavera humana Aloë, Myrrhâ, Asphalato, aliisque aromaticis & balsamicis speciebus condita & exsiccata. Rarò integræ, sed in partes divisæ afferuntur: Eligatur Mumia odoris non ingrati, amara, bituminosa & splendida.

IBEX, *Le Bouquetin.* Buffon. *t.* 10. *p.* 278.

Ibex. Gesn. Quad. 303. Jonst. Quad. *tab.* 28.
Capra Ibex. Lin. Syst. 1. 95.

Sanguis exsiccatus in usu. Habitat inter nives in summis alpibus. Sanguis

RUPRICAPRÆ (*le Chamois.* PL. 704), vel Hirci herbis aromaticis nutriti, ejus eſt ſuccedaneus.

ISIS NOBILIS, *LE CORAIL ROUGE.* PL. 39. A.

Corallum rubrum. P. 366. T. 572.
Corallium rubrum Officinarum. RAJ. HIST. I. 60.
Iſis nobilis. LIN. SYST. I. 1288.

Eſt ſtirps radicata, ramoſa, lapidea, manifeſtâ metamorphoſi tranſiens in animalcula ſpontaneo motu ſenſuque prædita. Eligatur levis & unicolor. In Mediteraneo mari reperitur.

LACERTUS, *LE LÉZARD.* PL. 668 & 669.

Lacertus viridis (& vulgaris.) RAJ. QUAD. 264.
Lacerta agilis. LIN. SYST. I. 363.

Integer in uſu. In Europâ auſtrali viridis, in Indiâ pulchrioris eſt coloris; vulgaris noſtras cinereus eſt. Habitat in rudetis & terræ cavernis.

LEPUS, *LE LIÈVRE.* PL. 717. BUFFON. *t.* 7. *p.* 96.

Lepus. RAJ. QUAD. 204.
Lepus timidus. LIN. SYST. I. 77.

Sanguis & pili in uſu.

LUCIUS, *LE BROCHET.* PL. 664.

Eſox roſtro plagioplateo. ARTED. *Gen.* 14. *Spec.* 53. *Syn.* 26.
Lucius. RAJ. PIS. 112.
Eſox Lucius. LIN. SYST. I. 516.

Mandibula ſeu maxilla inferior in uſu.

LUMBRICUS TERRESTRIS, *LE VER DE TERRE.* PL. 648.

Lumbricus terreſtris. ALDROV. INS. 693. LIN. SYST. I. 1076. WILLIS. *tom.* 2. *p.* 18. *tab.* 4.

Integer in uſu. Quæruntur tempore nocturno, aut baculo agitato in terrâ.

MADREPORA, *LE MADRÉPORE.* PL. 39. B.

Corallium album oculatum officinarum. J. B. 3 805.
Corallium album. LOB. ICON. 253. T. 572.
Madrepora oculata. LIN. SYST. I. 1281.

Eſt ſubſtantia calcarea, caulefcens, alba, intus perforata, ab animalculis ædificata. In Oceano Indiæ orientalis reperitur.

MERLANGIUS, *Le Merlan*. Pl. 661.

Aſellus marinus. Officinarum.
Gadus dorſo tripterigio, ore imberbi, corpore albo, maxillâ ſuperiore longiore. ARTED. *Gen.* 19 *Spec.* 62. *Syn.* 34.
Gadus Merlangus. LIN. SYST. 1. 438.

LAPIDES MERLANGII ſunt oſſa oblonga, in ejus capite reperiunda.

MILLEPEDES, *Les Cloportes.* (*Oniſci.*) Pl. 657.

Aſelli. Officinarum.
Oniſcus caudâ obtuſâ bifurcâ. GEOF. INS. 2. 670. *tab.* 22. *f.* 1.
Oniſcus Aſellus. LIN. SYST. 1. 1061.

Integri in uſu. ONISCUS eſt inſectum apterum, ovale, quatuordecim pedes habens: habitat in umbroſis ac humidis locis.

MONOCEROS, *Le Narval.* Pl. 662.

Monodon. ARTED. *Gen.* 78. *Syn.* 108.
Monoceros piſcis de genere cetaceo. RAJ. PIS. 11.
Monodon Monoceros. LIN. SYST. 1. 105.

Dens ſeu cornu, in officinis UNICORNU MARINUM, in uſu.

OSTREUM, *L'Huitre.* Pl. 645.

Oſtreum vulgare maximum, intùs argenteo quodam livore albeſcens. LIST. ANG. *p.* 176. *t.* 4. *f.* 26. WILLIS. *tom.* 2. *p.* 13. *tab.* 2.
Oſtrea edulis. LIN. SYST. 1. 1148.

Teſtæ in uſu.

OVIS, *La Brebis.* Pl. 723. BUFFON. *t.* 6. *p.* 225.

Ovis domeſtica. RAJ. QUAD. 73.
Ovis Aries. LIN. SYST. 1. 97.

Sebum & Œſypum, *la graiſſe de la laine graſſe*, in uſu. Mas ARIES dicitur, fetus AGNUS, caſtratus VERVEX. Obnoxia vivit vertigini, hydropi, phthiſi, ictero, hepatitidi; læditur à Pruno ſpinoſâ, Equiſeto, Flammulâ, Anemone nemoroſâ, &c.

PAVO, *Le Paon.* Pl. 693. BUFFON. *t.* 4. *p.* 1.

Pavo. RAJ. AV. 51. BRISS. ORNITH. *tom.* 1. *p.* 281. *t.* 27.
Pavo criſtatus. LIN. SYST. 1. 267.

Stercus in usu. Sambuci floribus occiditur; delectatur Piso, Tritico. Ex Africâ originarius.

PERCA, *La Perche.* Pl. 665.

Perca lineis utrinque sex transversis nigris, pinnis ventralibus rubris. Arted. *Gen.* 39. *Spec.* 74. *Syn.* 66.

Perca fluviatilis. Raj. Pisc. 97. Lin. Syst. I. 481.

Lapides percarum in officinis, sunt ossicula quæ in capite juxta exortum spinæ dorsi reperiuntur.

RANA, *La Grenouille.* Pl. 671.

Rana esculenta. Lin. Syst. I. 357.

Rana & ejus sperma in usu. Rana aquatica, ovipara, metamorphosim subit, quasi è pisce in Lacertam ex quâ in Ranam transiens.

SCARABÆUS UNCTUOSUS, *Le Proscarabée.* Pl. 658.

Proscarabæus. Dal. 391. Jonst. Ins. *tab.* 15.

Cantharus unctuosus. Schrod. Pharm. 5. *p.* 345.

Meloë Proscarabæus. Lin. Syst. I. 679. Geof. Ins. I. 377. *tab.* 7. *f.* 4.

Integer in usu. Est insectum corpore violaceo, elytris abbreviatis, absque alis; vere juxtà vias, & in apricis campis reperitur. Tactu oleum è geniculis pedum emittit.

SCINCUS, *Le Scinc.* Pl. 670.

Scincus. Math. In Dioscor. *Lib.* 2. *Cap.* 40. Raj. Quad. 271.

Lacerta Scincus. Lin. Syst. 365.

Corpus & præsertim lumbi in usu. Est amphibium reptile, caudatum, in montosis locis Ægypti, Arabiæ petreæ & Lybiæ habitans. Eligatur siccus, recens & integer.

SCORPIO, *Le Scorpion.* Pl. 659.

Scorpio officinarum. Raj. Ins. 9.

Scorpio europæus. Lin. Syst. I. 1038.

Integer in usu. Est insectum apterum; formâ Cancros æmulans, iis tamen minus; colore subatro, veluti fuligineo; caudâ elongatâ, articulatâ, subtùs aculeo mucronatâ. Habitat in Europâ maximè australi. *In caudâ venenum.*

SEPIA, *La Seche.* Pl. 649.

Sepia. Gesn. Aquat. 851. Dal. 392. Math. 244.
Sepia officinalis. Lin. Syst. 1. 1095.

Os Sepiæ officinarum eligatur album, leve, fungoſum, integrum, magnum & craſſum: pars friabilis in uſu. Sepia eſt piſcis brachiatus formæ ſingularis, liquorem atrum quò ſe occultat ut à piſcatore evadat diſpergens.

SPONGIA, *L'Éponge fine.*

Spongia ad uſum præſtantiſſima foraminibus exiguis pervia. T. 575.
Spongia officinalis. Lin. Syst. 1. 1298.

Eſt ſtirps vegetans, radicata, ſubramoſa, difformis, tenax, foraminulata, tranſiens in animalcula florida, quæ foraminibus aquam ſugunt. Reperitur in mari Mediteraneo.

SUS, *Le Cochon.* Pl. 727. Buffon. *t.* 6. *p.* 272.

Sus ſive Porcus domeſticus. Raj. Quad. 92.
Sus ſcrofa. Lin. Syst. 1. 102.

Axungia in uſu. Obnoxius vivit pediculis, ſcabie, ſcrophulis; Pipere occiditur.

TALPA, *La Taupe.* Pl. 728. Buffon. *t.* 7. *p.* 322.

Talpa. Raj. Quad. 236.
Talpa europæa. Lin. Syst. 1. 73.

Integra in uſu. Præparatur uſtione. Fugatur Ricino.

TAXUS, *Le Blaireau.* (*Meles.*) Pl. 720. Buffon. *t.* 7. *p.* 220.

Taxus. Jonst. Quad. *t.* 64. Raj. Quad. 185.
Meles. Gesn. Quad. 686.
Urſus Meles. Lin. Syst. 1. 70.

Axungia in uſu.

VIPERA, *La Vipere.* Pl. 666. Pomet. *t.* 2. *p.* 175. *f.* 47.

Vipera officinarum. Dal. 470.
Coluber Berus. Lin. Syst. 1. 377.

Tota in uſu: eligatur ſana & craſſa. Frequens in calidioribus regionibus. Morſu venenoſo lædit. *Vide* Mead. *Tentam.* 1. *de Viperâ.* *p.* 15.

Viperæ exſiccatæ veniunt quoque in uſum. Eligantur longiores, ſicciores, ponderoſiores, corde & hepate prædita & à vermibus non eroſæ.

VULPES, *Le Renard.* Pl. 702. Buffon. *t.* 7. *p.* 205.

Vulpes. Raj. Quad. 177.
Canis Vulpes. Lin. Syst. 1. 59.

Pinguedo in uſu. Aſtutiſſimè ſævit in Agnos, Anſeres, Gallinas, Aviculas, &c.

ZIBETHUM, *La Civette.* (*Animal Zibethi.*) Pl. 720. Buffon. *t.* 8. *p.* 342.

Civetta. Officinarum.
Vivera Zibetha. Lin. Syst. 1. 65.

Zibethum officinarum eſt ſubſtantia ſubpallida, pinguis, ſubliquida, ſenſim craſſeſcens, odoris fragrantiſſimi. Optimum ex Indiis affertur. Reperitur in folliculo animalis inter anum & vulvam exiſtente.



CLASSIS TERTIA.

DE SIMPLICIBUS È REGNO MINERALI.

MINERALOGIA, quæ è Terræ ſinu extrahuntur explorat. Videant tirones BOMARE & *Chymicorum* opera.

FOSSILIA ſunt *Aquæ*, *Terræ*, *Lapides*, *Salia*, *Petrificata*, *Sulphurea*, *Metalla* & *Semi-Metalla*.

Subſtantiæ Metallicæ, præſertìm Semi-Metallorum, fuſionis ope ab aliis ſubſtantiis heterogeneis ſeu *Scoriis* ſeparatæ, REGULINÆ dicuntur.

TABULA SYNOPTICA.

1. AQUÆ,

Communes *seu* dulces, *fontanæ*, *fluviatiles*, *&c.*

Marinæ.

Minerales.

2. SALIA.

Alumen.

Vitriolum.

Natrum murorum.

Natrum fontanum, *Epsamense*, *Seidlitzense*, *Mirabile Glauberi*, *&c.*

Nitrum.

Sal marinum.

Sal Gemmæ.

Sal Ammoniacum.

Borax.

3. TERRÆ,

ARGILLOSÆ.

Bolus Armena.

Terra sigillata.

CALCAREÆ.

Creta.

Lac Lunæ.

METALLICA.

Ochrum.

Terra Umbriæ.

4. LAPIDES,

LAMELLOSI ET FISSILES.

Nigrica, *seu* Pharmacitis.

Ardesia.

Creta Brigantina.

Talcum.

FILAMENTOSI.

Amyanthus.

VITRESCENTES ET VITRA.

GEMMÆ,

PRETIOSÆ.

Granatus.

Hyacinthus.

Smaragdus.

Saphirus.

Sardinus.

SPECIOSÆ.

Lazulus.

Lapis Armenus.

SILICES.

Silex igniarius.

Lapis nephriticus.

5. PETRIFICATA,

VEGETABILIUM.

Osteocolla.

QUADRUPEDUM.

Ebur fossile.

PISCIUM.

Bufonites.

VERMIUM.

Lapis judaïcus.

Lapis Lyncis.

MONTIUM IGNIVOMUM.

Pumex.

INTRA LAPIDES.

Lapis Ætites.

INTRA ANIMALIA.

Bezoar.

Lapis malacensis.

Margaritæ.

Oculi Cancrorum.

6. SULPHUREA,

PURA.

Sulphur.

MIXTA seu BITUMINOSA.

Bitumen judaïcum.

Carbo petræus.

Ambra.

Gagates.

Petroleum.

Succinum.

METALLICA.

Auripigmentum.

7. MINERÆ.

SEMI-METALLA,

SOLIDA.

Arsenicum.

Antimonium.

Bismuthum.

Zincum.

FLUIDA.

Hydrargyrus.

METALLA,

ALTERABILIA;

ANTE CANDESCENTIAM FUSILIA.

Plumbum.

Stannum.

POST CANDESCENTIAM FUSILIA.

Ferrum.

Cuprum.

NOBILIORA ET INALTERABILIA.

Argentum.

Aurum.

ORDO MINERALIUM.

ÆRUGO, *Le Verd de gris.* ⊕

Viride Æris officinarum. Bomare. 2. 203.
Ochra Ærugo. Lin. Syst. 3. 194.

Eligenda quæ colore ad cæruleum vergit. Paratur ex Cupro acidis aut vinaccis eroſo ac ſoluto. È Galliâ & Hiſpaniâ affertur.

ÆS, *Le Cuivre.* ♀

Venus. Chymicorum.
Cuprum nativum purum. Bomare. 2. 178.
Cuprum nativum. Lin. Syst. 3. 143.

Eſt metallum rubrum, ſonorum, cujus ſolutio corroſivo-venenata, cærulea eſt ſi alkali, viridis ſi acido facta fuit: præcipitatur Ferro: vix ex toto diſſolvitur Aquâ forti. Omnibus miſcetur metallis. Reperitur in Europâ boreali; præparatum affertur.

ÆTITES, *La pierre d'Aigle.*

Ætites aquilinus. Lin. Syst. 3. 179.

Eſt tophus ochraceus, polymorphos, intra quem lapillus mobilis reperitur. Ex Helvetiâ affertur.

ALUMEN, L'*Alun.* Bomare. 1. 290. Lin. Syst. 3. 101. ○ ⊏⊐

Alumen eſt ſal minerale ex acido vitriolico & terrâ argilloſâ combinatis, ortum; guſtu acerbo, aſtringenti & ſtiptico. Cryſtallos efformat octaëdras. Igne fuſum ebullit, ſpumeſcit & in modum calcis abit. Multiplex Aluminis ſpecies reperitur.

I. Alumen rupeum ſeu Crystallinum officinarum. Album eſt, è terrâ pyritoſâ & aluminoſâ, ſeu è lapide fiſſili extrahitur. *Alumen commune*, *Linnæi.*

II. Alumen romanum, ſive rubrum officinarum. Extrahitur propè Romam è lapide ſeu terrâ aluminoſâ calcariâ. *Alumen romanum*, *Linnæi.*

III. Datur altera ſpecies Aluminis, non uſualis, guſtu acida & in aquâ ſolubilis: nempe, *Alumen nativum plumoſum*, LINNÆI. Cave ne cum Alumine plumoſo confundas *Amiantum*.

AMBRA GRISEA, L'*AMBRE GRIS*.

Ambra griſea, *ſeu cineritia*. *Officinarum*.
Ambra griſea vulgaris. BOMARE. 2. 276.
Ambra ambroſiaca. LIN. SYST. 3. 107.

Eſt ſubſtantia cineracea, odora, opaca, cerea, aquis ſupernatans, aciculæ candefactæ non adhærens, elicitur è ſinu maris præſertim Madagaſcarienſis, Indiæ orientalis & Æthiopici. Utrum hæc ſubſtantia circa renes Ceti dentati reperiatur, non conſtat.

AMIANTUS, L'*AMIANTE*, *SORTE DE LIN INCOMBUSTIBLE*.

Pſeudo-Asbeſtus plumoſus officinarum. BOMARE. 1. 108.
Amiantus plumoſus. LIN. SYST. 3. 55.

Eſt lapis fibroſus, fibris digito ſeparabilibus, flexilibus ac pappoſis conſtans. Fila non ſunt perfecta ut in *Lino incombuſtibili*; ſed in tomentum breviſſimum reſolvuntur. Particulæ aquis ſupernatant. Uſus tantum externus; ſed cautè ab Alumine nativo ſeu Plumoſo diſtinguendus. Reperitur in Siberiâ, Laponiâ, &c.

ANTIMONIUM, L'*ANTIMOINE*. ♁ ◇

Minera Antimonii ſtriata aut vulgaris. BOMARE. 2. 73.
Stibium ſtriatum. LIN. SYST. 3. 123.

Eſt ſubſtantia mineralis, friabilis, ſtriata, Plumbi coloris, igne poſt candeſcentiam avolans, conſtans è ſubſtantia ſemi-metallica ſeu Regulo & Sulphure. Rapit in igne metalla, exceptis Auro & Platino. Reperitur in Hungariâ, Galliâ, &c. fuſione purificatum affertur. Probatur Hungaricum, ſcoriis expers, & ſtrias ſeu acus longas & ſplendentes habens.

Regulum Antimonii purum colorem argenteum & plana nitida majuſcula exhibentem, Sahlbergæ invenit *D. SWAB. Act. Stoch.* 1748.

AQUA, L'*EAU*. ▽ ≈

AQUA eſt elementum liquidum, fluidum, humidum, limpidum, inſipidum, inodorum, diaphanum, ſine colore, facilè in vapores avolans, non compreſſibile: abſentiâ caloris glaciatur & ejus ultimus caloris gradus eſt ebullitio aëri aperto. Eligenda eſt pura clara & levis. Diverſa ſortitur nomina, pro varietate ſubſtantiarum quibus impræçna-

tur aut fontium è quibus ſcaturit: hinc *Aqua pluvialis*, *fontana*, *fluvialis*, *lacuſtris*, *ſalſa*, *marina*, *mineralis*, *thermalis*, *glaciei*, *nivea*, *&c.* Hùc pertinet *Ros majalis.*

ARDESIA, L'*Ardoise.*

Ardeſia tegularis. Bomare. 1. 139.
Schiſtus Ardeſia. Lin. Syst. 3. 38.

Eſt lapis fiſſilis, durus, cæruleſcens. Naſcitur è Schiſto cum Ferro mixto. Reperitur in Belgiâ, Hiberniâ, &c.

ARGENTUM, L'*Argent.* ☽ ☾

Luna. Chymicorum.
Argentum nativum. Lin. Syst. 3. 148. Wall. Min. 307. Bomare. 2. 213.

Eſt metallum album, excepto Auro ductiliſſimum, ſonorum, igne Calcinationem non patiens, poſt candeſcentiam liquabile, cujus ſolutio Aquâ forti alba eſt, (ſi Cupro mixtum, cærulea). Reperitur in Americâ, Galliâ, Norvegiâ, Wermalandiâ, &c.

Argento puriſſimo, *de coupelle* dicto, utantur Pharmacopœi.

ARMENUS LAPIS, *La pierre d'Arménie.*

Lapis Armenus. Bomare. 1. 282.
Cuprum Armenus. Lin. Syst. 3. 146.

Eſt lapis opacus, cæruleus, maculis ſæpe argenteis, viridibus & nigris intermixtis. Cum Aquâ forti lente efferveſcit, colorem viridem acquirens. Oritur ex Ochrâ Cupri.

ARSENICUM ALBUM, L'*Arsenic blanc.* oo 8

Arſenicum album. Bomare. 2. 26.
Arſenicum nudum. Lin. Syst. 3. 117.

Eſt calx metallica ſolubilis in aquâ calidâ, fumo odore alliaceo, ſapore dulci; *cautè cum illâ verſandum eſt, uſus tantum externus.* Arſenicum *nativum* purum invenitur in Bohemiæ Joachimſdahl; *factitium* ſublimatum è Cobalto ſæpius affertur.

AURIPIGMENTUM, L'*Orpiment.* oo

Arſenicum flavum, *Auripigmentum officinarum.* Bomare. 2. 28.
Pyrites Auripigmentum. Lin. Syst. 3. 113.

Eſt ſubſtantia è Sulphure & Arſenico combinatis producta, punctulis ſive micis velut aureis nitens, coloris citrini. In Perſiâ & Hungaria invenitur, probatur Turcicum.

AURUM, L'*Or*. ☉

Sol. Chymicorum.
Aurum purum virgineum. BOMARE. 2. 238.
Aurum nativum. LIN. SYST. 3. 151.

Eſt metallum luteum, ponderoſiſſimum, ductiliſſimum; igne poſt candeſcentiam liqueſcit, dùm liquatur cyaneum eſt. Ejus Aquâ Regiâ ſolutio lutea eſt. Lapidi Lydio affrictum relinquit maculam auratam Aquâ forti non delebilem. Aurum nativum rarò caret Argento, Argentum verò nativum rarò ſcatet Auro. Reperitur in Peru, Chili, Africâ, Hungariâ, &c. ſæpius in Talco, Cinnabari, rariùs in fluviis.

BELEMNITES, LAPIS LYNCIS, *La pierre de Lynx.*

Helmintholithus Belemnites. LIN. SYST. 3. 170.

Eſt vermis foſſilis ſeu petrificatus, cylindraceus, verſus apicem conicus, teres, levis, longitudine & craſſitie digiti, ſemi-diaphanus. In Europæ auſtralis locis apricis campeſtribus reperitur.

BISMUTHUM, *Le Bismuth*, *L'Étain de glace*. BOMARE. 2. 48. LIN. SYST. 3. 128. ♃

BISMUTHUM, aut WISMUTHUM, ſive MARCHASSITA, eſt ſemimetallum friabile, ponderoſum, digitos nigro inquinans, aëri expoſitum flaveſcens. Igni admotum fumat, liqueſcit ante candeſcentiam, & pro magnâ parte avolat, reſiduum poſt calcinationem in vitrum tranſmutatur. Biſmuthi ſolutio in Aquâ Regiâ lutei, in Aquâ forti hyalini eſt coloris: additione Aquæ ſimplicis, ſolutio in pulverem album coſmeticum fatiſcit *Magiſter Biſmuthi* nominandum. Invenitur Biſmuthum nativum purum, ſed ut plurimùm fuſione ſimplici è minerâ ſuâ ubi cum Cobalto mixtum eſt, extrahitur.

BITUMEN JUDAÏCUM, *Le Bitume de Judée.*

Bitumen judaïcum, ſeu Aſphaltum officinarum. BOMARE. 2. 263.
Bitumen ſolidum coagulatum. WALL. MIN. 195.
Bitumen Aſphaltum. LIN. SYST. 3. 110.

Eſt ſubſtantia ſolida fragilis, ponderoſa, admodum obſcura, è nigro rufeſcens, ſplendens, inflammabilis, odore gravi, bituminoſo, præſertim dùm incaleſcit; igne liqueſcens, ac inflammabilis.

BOLUS ARMENA, *Le Bol d'Arménie.*

Bolus Armena, ſive orientalis officinarum. BOMARE. 1. 64.
Argilla Bolus rubra. LIN. 3. 203.

Eſt Argilla ſubtilis, pinguis, lubrica, impalpabilis. Laudatur pallido-rubra, non arenoſa. Olim ex Oriente advehebatur; hodie in Galliæ, Italiæ, & Germaniæ provinciis reperitur.

BORAX, *Le Borax.*

Borax, ſive Chryſocolla officinarum. BOMARE. 1. 342.
Borax depuratus albus octangularis. WALL. MIN. 192.
Borax Tincal. LIN. SYST. 3. 94.

Eſt ſal neutrum, ſapore obtuſum, igne intumeſcens, vitreſcens. Eligendum album, leve, cryſtallinum. E Chinâ, & Tranquebar allatum, in Hollandiâ depuratur. Sal illud è baſi Salis marini cùm Sale ſedativo Humbergii combinatum eſſe analyſis docet.

CALAMINARIS, *La pierre Calaminaire.*

Cadmia, aut Lapis Calaminaris officinarum. BOMARE. 2. 62.
Zincum Calaminaris. LIN. SYST. 3. 126.

Eſt ſubſtantia mineralis, flaveſcens, fuſca, lapideſcens, ſubterrea, cum Ferro præſertim, Terrâ & Zinco mixta. Cum Cupro fuſa, colorem aureum ei conciliat, ejuſque pondus auget. Reperitur in Angliâ, Achem, &c. Uſtulata affertur.

CALX, *La Chaux.*

Eſt Terra calcaria vi ignis violenti calcinata. Aquæ affuſione ſtrepit, incaleſcit, tandemque extinguitur & fit puls alba. Aëri humido expoſita, in pulverem album pollinis inſtar fatiſcit. De novo calcinata Calcis vivæ dotes recuperat. Eligenda recens & ſicca.

CARBO FOSSILIS, *Le Charbon de Terre, La Houille.*

Carbo petreus. BOMARE. 2. 249.
Bithumen Lithanthrax. LIN. SYST. 3. 111.

Extrahitur ex Hannoniæ, Galliæ, Angliæ, &c. fodinis.

CERUSSA, *La Céruse.*

Ceruſſa ſeu Plumbum album officinarum. BOMARE. 2. 114.
Ochra Plumbi. LIN. SYST. 3. 193.

Paratur è Plumbo acidis eroſo ac ſoluto. Eligenda ponderoſa & alba. Invenitur Chriſtiersberg ſupra Plumbi galenam.

CHALCITIS FACTITIA, *Le Colcothar.*

Colcothar ſeu Chalcitis Factitia eſt caput mortuum Vitrioli.

CHALCITIS NATIVA, *La Calcite.*

Lapis Vitrioli rubra. Bomare. 1. 313.
Vitriolum atramentarium. Lin. Syst. 3. 106.

Eſt Vitriolum mineraliſatum lapide friabili, imprimis Zinco. Chalcitis nominatur ſi rubrum ſit, ſi cinereum Sory, ſi flavum Misy, tandem ſi nigrum Melanteria dicitur. Invenitur in Rammelsberg cum Vitriolo albo.

CINERES CLAVELLATI, *Les Cendres gravelées.*

Sunt ſal lixivioſum, fixum, è fecibus Vini exſiccatis & combuſtis in Gallia, paratum. Potasse (*Gallicè.*)ſali priori analogum è lignis combuſtis in Poloniâ, Moſcoviâ, &c. producitur.

CINNABARIS NATIVA, *Le Cinabre naturel.* ♁ 33

Cinnabaris nativa officinarum. Bomare. 2. 87.
Hydrargyrum Cinnabaris. Lin. Syst. 3. 119.

Eſt ſubſtantia mineralis, rubra, longitudinaliter ſtriata ac ſplendens, è Sulphure & Mercurio combinatis conſtans. Ex eâ magna Mercurii optimi copia extrahitur.

CRETA ALBA, *La Craie blanche.*

Creta officinarum. Bomare. 1. 76.
Creta coherens ſolida. Vall. Min. 8.
Calx Creta. Lin. Syst. 3. 206.

Eſt terra alba & friabilis è quâ Calx conficitur.

CRETA BRIGANTINA, *La Craie de Briançon.*

Creta Brigantina, ſeu Hiſpanica. Officinarum.
Talco-ſteatites. Bomare. 1. 123.
Talcum ſmectis. Lin. Syst. 3. 52.

Hæc Creta conſtat lamellis minutiſſimis albis ſplendentibus, ſubpinguibus, digitis levi frictione adhærentibus.

FERRUM, *Le Fer.* Bomare. 2. 132. Lin. Syst. 3. 136. ♂

Mars. Chymicorum.

Est metallum durissimum, sonorum, colore albo splendente, cum quodam livore si expolitum sit, nigricante verò si rude & impolitum. A Magnete trahitur. Solutio Aquâ forti fusca est. È Ferro elaboratur CHALYBS, (*l'Acier*); ad usum vero medicum, Ferrum Chalybe longè præstat. Ubique fere reperitur: optimum in fodinis Dannemoræ, Nordbergæ, &c. è minerâ nigricante elicitur. Raro Ferrum nativum reperitur.

Ferrum aquæ aut aëri expositum diu, in RUBIGINEM seu *Ferruginem* abit (*Ochra ferrugo.* LIN. 3. 194).

GAGATES, *Le Jais, ou Jayet.*

Gagas. BOMARE. 2. 266.
Bitumen Gagas. LIN. SYST. 3. 111.

Est substantia bituminosa, solida, pura, sicca, levissima, aquis supernatans, polituram admittens. Reperitur in Galliâ, Angliâ, Germaniâ, &c.

GRANATUS, *Le Grenat.*

Granatus orientalis. BOMARE. 1. 253.
Borax Granatus. LIN. SYST. 3. 96.

Est gemma pellucida, purpurea, rubra, incarnata, raro flava aut viridis. Pretiosior ex Oriente affertur; reperitur etiam in petris & fodinis Sueciæ.

HÆMATITES, *La pierre Hématite.*

Hæmatites officinarum. BOMARE. 2. 141.
Ferrum Hæmatites. LIN. SYST. 3. 140.

Est substantia ferruginea, ponderosa, glebosa, obscurè rubra, sapore terreo & astringente. Dùm frangitur striæ oblongæ ad centrum tendere cernuntur. Nasci videtur ex Ochrâ Ferrugine regeneratâ. Ex Germaniâ affertur.

HYACINTHUS ORIENTALIS, *L'Hyacinthe.*

Hyacinthus orientalis. BOMARE. 1. 141.
Nitrum Fluor purpureo-fulvum. LIN. SYST. 3. 85.

Est gemma, purpureo-fulva, pellucida, cum Crystallo montanâ in eisdem fodinis reperitur. Hyacinthus ab aquâ metallicâ in ipsâ generatione tingitur, undè durities & color.

LAC

LAC LUNÆ, *Le Lait de Lune.*

Agaricus mineralis. Officinarum.
Marga candida. DALE. 23.
Calx Gur. LIN. SYST. 3. 207.

LAC LUNÆ eſt Creta ſeu Calx fixa, farinæ inſtar friabiliſſima & impalpabilis, alba, leviſſima. Reperitur in profundis fiſſuris fodinarum & rupium. GUR dicitur dùm aquâ diluta ad thermas fluit.

LATERES, *Les Tuiles.*

Lateres vulgares noſtrates.

Eligantur nitidæ.

LAPIS LAZULI, *La pierre d'Azur.*

Jaſpis cærulеſcens. BOMARE. 1. 280.
Cuprum Lazuli. LIN. SYST. 3. 145.

Eſt lapis durus compactus cæruleus, colliſione ſcintillans, punctulis ac venis veluti aureis ſæpè ornatus. Nondùm ritè cognoſcitur: Cupro vix ſcatet, Aurum vix continet, ſæpiùs Argentum. Affertur ex Aſiâ, Africâ, Italiâ, Americâ.

LITHARGYRUS, *La Litharge.*

LITHARGYRUS vel LITHARGYRUM in purificatione Argenti producitur. Eligatur quod è Plumbo puro acquiritur. Duplex reperitur, LITHARGYRUM ARGENTEUM coloris paulo pallidioris, & LITHARGYRUM AUREUM præcedenti rubicundius utpotè magis calcinatum.

MAGNES, L'*Aimant.*

Magnes officinarum. BOMARE. 2. 145.
Ferrum Magnes. LIN. SYST. 3. 142.

Eſt lapis ferrugineus, ab aliis ſubſtantiis ferrugineis non diſcrepans niſi virtute ad ſeſe attrahendi Ferrum & polum borealem monſtrandi. Reperitur paſſim in Ferri fodinis.

MERCURIUS, *Le Mercure, Le Vif-Argent.* ☿

Mercurius purus nativus. BOMARE. 2. 84.
Hydrargyrum virgineum. LIN. SYST. 3. 119.

MERCURIUS ſeu HYDRARGYRUS eſt ſubſtantia metallica valdè ponderoſa, fluida, ſicca, argenteo ſplendore nitens, igne facilè avolans, cujus ſolutio Aquâ Forti albida eſt. Eligendus purus, nullo me-

tallo inquinatus. È Cinnabari nativâ copiosiùs extrahitur, & in pluribus Germaniæ provinciis invenitur.

NATRUM FONTANUM, *Le Sel des eaux minérales.*

Sal catharticum amarum. Officinarum.
Neutrum acidulare. BOMARE. I. 324.
Natrum fontanum. LIN. SYST. 3. 89.

Est sal neutrum seu medium sapore amaricans, igne liquescens. Reperitur in quibusdam fontibus: EPSOM in Angliâ: SEDLITZ in Bohemiâ: &c. Factitium ad cortinarum parietes in quibus Sal culinare coquitur, generatur.

NATRUM MURORUM, *Le Sel mural.*

Aphro-Natron. BOMARE. I. 321.
Aphronitrum. WALL. MIN. 300.
Natrum murorum. LIN. SYST. 3. 88.

Est sal calcarium, igne liquescens. Reperitur in muris calce constructis, sub eorum fornicibus aëri humido expositis, pruinæ instar efflorescens. Eligendum purum, album.

NEPHRITICUS LAPIS, *Le Jade, ou Pierre Néphrétique.*

Jade. BOMARE. I. 206.
Talcum Nephriticus. LIN. SYST. 3. 53.

Est lapis viridis, subdiaphanus, fissilis, Cupro scatens. Reperitur in Hispaniâ, Americâ.

NITRUM, *Le Nitre, ou Salpêtre.* BOMARE. I. 327. LIN. SYST. 3. 84. ⦶

NITRUM seu SAL PETRÆ est sal fusile, phlogistico detonans, gustu frigido-acre, crystallos efformans prismaticas, exagonas, basi acutas. Raro purum à naturâ paratum reperitur, adeoque in officinis artificiale solummodo venale est & *Sal Petræ tertiæ coctionis* vocatur. Extrahitur è terrâ nitrosâ.

OSTEOCOLLA, L'*Ostéocolle.*

Rizolithus. BOMARE. 2. 295.
Tophus Osteocolla. LIN. SYST. 3. 189.

Est tophus calcarius, subcylindraceus, perforatus, albidus. Oritur è

materiâ calcariâ tenuiſſimâ, ſabulo mixtâ & variarum arborum radicibus altiùs ſepultis circumnatâ. Reperitur Maſſiliæ, in Sileſiâ, Marchiâ Brandeburgicâ.

PETROLEUM, *Le Pétrol*, *L'Huile de Gabian*.

Petroleum. BOMARE. 2. 254.
Bitumen Petroleum. LIN. SYST. 3. 109.

PETROLEUM ſeu OLEUM TERRÆ eſt bitumen varii coloris & conſiſtentiæ. Primò liquidum & purpuraſcens, dein lenteſcens & nigrum. Eligatur liquidiuſculum ac fuſco-rufeſcens. In Italiâ, &c. è marmore vel ſchiſto exſudat.

PLUMBUM, *Le Plomb.* BOMARE. 2. 95. LIN. SYST. 3. 132. ♄
Saturnus. Chimicorum.

Eſt metallum molle, cæruleſcenti-album, mutum, non elaſticum. Ejus ſolutio Aquâ Forti, hyalina eſt; præcipitatum, album. Igni admotum ante candeſcentiam liqueſcit, dein calcinatione in cineres griſei coloris tranſmutatur; auƈto per gradus igne, primò flaveſcit (MASSICOT eſt), ſecundò rubeſcit (MINIUM vocatur), tandem fit LITHARGYRUM & vitreſcit in vitrum flavum, trans crucibulum abiens.

POMPHOLIX, *Le Pompholix.*

POMPHOLIX ſeu NIHIL ALBUM eſt calx ſeu terra metallica Zinci, phlogiſtico privata: tempore deflagrationis Zinci, ſub formâ flocculorum alborum, avolat & ſuperiori fornacis parti adhæret. POMPHOLIX eligenda eſt alba, levis, impalpabilis, acrimoniæ expers.

PUMEX. *La Pierre Ponce.*

Pumex BOMARE. 2. 289.
Pumex Vulcani. LIN. SYST. 3. 181.

Eſt lapis poroſus, ſpongioſus, levis, fibris conſtans ſetaceis, parallelis, nigris, temporis lapſu cineraceis. È montibus ignivomis eruƈtatur.

SAL AMMONIACUM, *Le Sel Ammoniac.* ✳

Eſt ſal neutrum è fuligine fimi Camelorum aliorumque quadrupedum combuſti, in placentas ſublimatum. Eligatur candidum purum, ſalis alkalini additione odorem ſalis volatilis ſubito ſpargens. In Ægypto paratur.

SAL GEMMÆ, *Le Sel Gemme.* ♉ ⊖

Sal Gemmæ. BOMARE. 1. 331.

Muria montana. LIN. SYST. 3. 98.

Eſt ſal foſſile ſolidum ac cryſtalliſatum, indolis Salis marini. Invenitur in Poloniâ minore & Hungariâ.

SAL MARINUM, *Le Sel ordinaire de Cuisine.* ⊖

Sal commune. BOMARE. 1. 330.
Muria marina. LIN. SYST. 3. 98.

Eſt ſal neutrum, cubicum, ſapore acuto, igne crepitans, ex aquâ marinâ ope ignis, Solis aut gelu, cryſtalliſatum.

SAPHYRUS, *Le Saphir.*

Alumen Saphyrus. LIN. SYST. 3. 103.

Eſt gemma, cærulea, pellucida, limam reſpuens, igne colorem amittens. In Indiis reperitur.

SARDINUS, *La Sardoine.*

Silex Sardus. LIN. SYST. 3. 68.

Eſt gemma ſubdiaphana, quaſi filis lacteis intricata, & punctis atomiſque ſanguineis aſperſa. Reperitur in Indiâ & Sardiniâ.

SILEX, *La Pierre a fusil.*

I. Saxum cornutum. Vulgo.
Silex cretaceus. LIN. SYST. 3. 67.

II. Silex pyromachus. LIN. SYST. 3. 67.

Cretaceus & Pyromachus Silex inter ſe ſunt affines. Prior in noſtratibus fodinis cretaceis vulgatiſſimus; poſterior in Galliâ frequens, à priori differt fragmentorum conſiſtentiâ minus fragili, & imprimis pelluciditate corneâ ac glabritie quaſi oleo imbutâ. Sumuntur indiſcriminatim.

SMARAGDUS, L'*Émeraude.*

Borax Smaragdus. LIN. SYST. 3. 95.

Eſt gemma, pellucida, viridis, calefactione phoſphorea, colorem in igne retinens; ad Boracem, figurâ cryſtallorum, proximè accedens. Invenitur in Indiâ orientali.

STANNUM, L'*Étain.* BOMARE. 2. 111. LIN. SYST. 130. ♃

Jupiter. Chimicorum.

Eſt metallum molle, malleabile, album, omnium leviſſimum, flexione ſtridens, mutum, vix elaſticum. Pleriſque metallis malleabilitatem aufert. Poſt fuſionem candeſcit. Ejus ſolutio Aquâ Regiâ flava eſt. Stannum nativum vix invenitur. Elicitur è minerâ ſuâ quæ *Stannum cryſtallinum* nuncupatur. Stannum calcinatum gallicè *Potée d'Étain* vocatur.

SUCCINUM, *Le Succin.*

Succinum, ſive Karabe officinarum. BOMARE. 2. 268.
Succinum electricum. LIN. SYST. 3. 208.

Eſt ſubſtantia bituminoſa, dura, arida, fragilis, inflammabilis, pellucida, nunc flava vel citrina, nunc albicans, nunc fuſca; ſaporis ſubacris, bituminoſi, aliquantulùm aſtringentis; odoris dùm incaleſcit, fragrantis & bituminoſi. Attrita vel calefacta paleas & feſtucas ad ſe trahit. Optimum eſt pellucidum, maculæ expers, huic ſuccedit album, dein flavum ſeu citrinum. Invenitur in Pruſſiâ, Galliâ, &c.

SULPHUR, *Le Soufre.* BOMARE. 2. 283. 🜍

Eſt ſubſtantia è phlogiſtico & acido vitriolico confecta, inflammabilis flammâ cæruleâ; fumum, odore acido, acuto, pulmonibus infeſtum exhalans; ſolubilis in Oleo. Sulphur nativum vivum *clarum* in gypſo & ſpatho albo Helvetiæ & Siberiæ, *pulvereum* in thermis præſertim Italiæ & Aquis-Granenſibus, *impurum* in montibus ignivomis invenitur. *Factitium, fuſum, (le Soufre en canon,)* è pyrite Ferro mixtâ extrahitur; eligendum purum citrinum.

TERRA AMPELITIS, *La Pierre noire.*

Terra Pharmacitis. Officinarum.
Nigrica. BOMARE. 1. 142.
Schiſtus Nigrica. LIN. SYST. 3. 38.

Eſt lapis niger, fiſſilis; laminis conſtans molliuſculis, friabilibus; tactu digitos inquinantibus. In Galliâ, Italiâ, Luſitaniâ, &c. reperitur.

TERRA COTARIA, *La Terre de Rémouleur.*

Eſt terra Ferro è cotariis lapidibus deciduo imprægnata.

TERRA LEMNIA, *La Terre Sigillée.*

Terra Lemnia, ſive Sigillata officinarum. BOMARE. 1. 64. N.° 5.
Argilla Lemnia. LIN. SYST. 3. 201.

Eſt terra ſeu argilla pallido-incarnata, pinguis, in aquâ cum ſtrepitu fatiſcens. Eligatur pura, non arenoſa, linguæ adhærens. Ex inſulâ Lemniâ & regno Turcico affertur.

TERRA UMBRIÆ, *La Terre d'Ombre.*

Umbra. BOMARE. 1. 71.
Argilla Umbra. LIN. SYST. 3. 204.

Eſt terra purpuraſcenti-fuſca, parco bitumine & Ferro inquinata. Ex Germaniâ, Italiâ, Angliâ affertur.

TALCUM, *Le Talc.* X

Talcum album aut argenteum. BOMARE. 1. 121.
Mica Talcoſa. LIN. SYST. 3. 59.

Eſt lapis ſubpinguis, friabilis ex lamellis flexibilibus, albo-vireſcentibus, ſubdiaphanis conſtans. Venetiis exportatur.

TUTHIA, *La Tutie.*

Nihil griſeum. Officinarum.

Eſt productum metallicæ indolis, in fornacibus in quibus Æs funditur collectum. Eligenda denſa, modicè gravis, & cinerea.

VITRIOLUM, *Le Vitriol.* BOMARE. 1. 298. LIN. SYST. 3. 104. ⊕

Eſt ſal metallicum, acidum, ſapore ſtypticum, igni calcinabile: ratione baſis & coloris diſtinguitur in *album*, *cæruleum*, & *viride.*

VITRIOLUM ALBUM (*la Couperoſe blanche*), eſt acidum vitriolicum Zinco combinatum, cujus ſolutio, affuſo auſtero nigreſcit, alkalino lactea evadit. Eligendum album inſtar Sacchari, non nimis durum. Reperitur in Germaniâ.

VITRIOLUM CÆRULEUM (*le Vitriol bleu*), eſt acidum vitriolicum Cupro combinatum, cujus ſolutio, affuſo auſtero lacteſcit, alkalino cærulea evadit. Reperitur in Cypro.

VITRIOLUM VIRIDE (*le Vitriol verd*), eſt acidum vitriolicum Ferro combinatum, cujus ſolutio, auſtero affuſo nigra, alkalino vireſcens evadit. Reperitur in fodinis Ferri pyriticoſi.

ZINCUM, *Le Zinc.* BOMARE. 2. 54. LIN. SYST. 3. 125. Ƶ

Eſt metallum ſub-malleabile, cæruleſcenti-album, igne ante candeſcentiam liquabile, flammâ luteo viridi combuſtibile, & in favillas albas floccoſas (*Pompholix*) abiens. Solutio ejus Aquâ Forti alba eſt. Limatum attrahitur à Magnete uti Ferrum. Raro Zincum nudum nativum invenitur. Aliis ſubſtantiis metallicis miſcetur; exceptis Biſmuto & Molybdæno. Cum Cupro mixtum fit AURICHALCUM.

APPENDIX.

DE COLLECTIONE ET ASSERVATIONE SIMPLICIUM.

CANON. I. RADICES plantarum *Annuarum* evellas, cùm folia perfecta ſunt, ante caulium ad floreſcentiam eruptionem; *Biennium* autumno ejus anni quo ſata ſunt ſemina; *Perennium* autem, foliis defluentibus, ut plurimùm tempore autumnali.

Ablutæ, à fibrillis aridis & corruptis liberatæ, in taleolas aut orbiculos, ſi opus ſit, ſectæ, in umbrâ & loco perflabili ſuſpendantur.

Radices, quarum virtus exſiccatione perit, ſabulo ſicco obrutæ, ſerventur.

Radices parvæ, tenues, rarioris compagis, ſingulis annis renoventur.

II. HERBÆ legantur illo ætatis vigore quo folia perfecta jam eruperunt; ſed antequam flores explicentur.

Siccentur in umbrâ ut radices.

Singulis annis renoventur, licet pleræque diutiùs aſſervari poſſint.

III. FLORES mediocriter expanſi, rore non madidi, tempore ſereno carpantur; ut & nonnullarum SUMMITATES FLORENTES.

Roſarum rubrarum nondùm explicitarum petala exungulentur.

Flores quamdiu odorem, colorem & ſaporem retinent, aſſervari poſſunt, ut plurimùm annuatim renovandi.

IV. SEMINA colligantur matura, exſiccationi proxima, antequàm ſpontè excidant.

Calida, *acria*, *aromatica*, utpotè durabiliora, per biennium aut triennium ſervari poſſunt; frigida verò, quamdiu rancorem non contrahunt.

V. FRUCTUS maturi colligantur; niſi præſcribantur immaturi.

Quotannis renoventur, at exotici & cortice duriori aut cruſtâ veſtiti per duos treſve annos conſervantur.

VI. LIGNA & CORTICES tempore præcipuè hiberno cædantur & abradantur.

In annum & ultra perdurant.

VII. RESINÆ & GUMMI diutiſſimè ſervantur.

VIII. ANIMALIA & eorum PARTES ſana, adulta & incorrupta eligantur; niſi juniora expetantur.

IX. MINERALIA ſunt omnium diuturniſſima.

DE SIMPLICIBUS UNO VERBO COMPREHENSIS.

Quinque radices aperientes majores.
- Apii,
- Aſparagi,
- Fœniculi,
- Petroſelini,
- Ruſci.

Quinque radices aperientes minores.
- Capparis,
- Eryngii,
- Graminis,
- Rubiæ tinctorum,
- Anonidis.

Quinque herbæ capillares..............
- Adiantum verum,
- Adiantum album,
- Adiantum Polytrichum,
- Adiantum Ruta muraria,
- Ceterach.

Quatuor herbæ emollientes............
- Acanthus,
- Althæa,
- Malva,
- Viola.

Quatuor herbæ emollientes aliæ.......
- Atriplex,
- Beta,
- Mercurialis,
- Parietaria.

Tres

Tres flores cordiales........
- Borraginis,
- Bugloſſi,
- Violarum.

Herbæ vulnerariæ, vulgò *Faltrank.*
- Folia.
  - Alchimillæ,
  - Pervincæ,
  - Pyrolæ,
  - Saniculæ.
- Flores.
  - Bellidis minoris,
  - Centaurii minoris,
  - Farfaræ,
  - Pedis Cati.
- Folia & Flores.
  - Betonicæ,
  - Brunellæ,
  - Jacobææ,
  - Virgæ aureæ,
  - Bugulæ.

Quatuor ſemina calida majora.
- Aniſi,
- Fœniculi,
- Carvi,
- Coriandri, vel Cumini.

Quatuor ſemina calida minora.
- Ammeos,
- Amomi, vel Cardamomi,
- Apii,
- Dauci.

Quatuor ſemina frigida majora.
- Citrulli,
- Cucumeris,
- Cucurbitæ,
- Melonum.

Quatuor ſemina frigida minora.
- Cichorii,
- Endiviæ,
- Lactucæ,
- Portulacæ.

Quatuor farinæ.	Fabarum, Fœnugræci, Hordei, Lini.
Quatuor farinæ aliæ.	Orobi, Lentium, Lupinorum, Similago.



PHARMACOPŒA
INSULENSIS.
PARS SECUNDA.

DE MEDICAMENTIS COMPOSITIS.
PROLUSIONES.
DE PONDERIBUS MEDICIS.

PRO Ponderum baſi ac fundamento eam ſeligimus Unciam, utpotè certam & immutabilem, quæ Beſſis (*le Marc*), octavam partem adæquat.

Caracteres Ponderum ſequenti modo ſignantur.

Libra, Uncias ſexdecim pendens. . . . . ℔ j.
Sesquilibra, Uncias viginti quatuor. . . . . ℔iß.
Selibra, Uncias octo. . . . . ℔ ß.
Uncia, Drachmas octo. . . . . ℥ j.
Sescuncia, Drachmas duodecim. . . . . ℥ iß.

SEMUNCIA, Drachmas quatuor.	℥ ß.
DRACHMA, Scrupulos tres.	ʒ j.
SESQUIDRACHMA, Scrupulos quatuor & ſemis.	ʒ iß.
SEMIDRACHMA, Scrupulum & ſemis.	ʒ ß.
SCRUPULUS, Grana viginti quatuor.	℈ j.
SEMISCRUPULUS, Grana duodecim.	℈ ß.
GRANUM	gr j.

Cum Trutinæ optimæ ſint neceſſariò adhibendæ, ſequentia in earum ſelectu notabis.

CANON. I. Trutina ſit Bilanx.

II. Examen (l'*Aiguille*,) ſit perpendicularis cum Jugo (*les Bras*,) ut tempore æquilibrii, ſtet in medio Anſæ (*la Chaſſe*).

III. Jugum ſit ab Axe (l'*Axe*,) ita æqualiter bipartitum, ut pondera æqualia poſſint in utràque Lance indiſcriminatim poni, & ſtare in æquilibrio.

Extremitates Jugi ſunt puncta Lances ſuſpendentia.

IV. *Centrum gravitatis*, (eſt punctum in medio lineæ jungentis extremitates Jugi), cum *centro ſuſpenſionis*, ſeu *oſcillationis* in Axe poſito confundetur, ut Bilanx non ſit fallax; quod duplici modo fit.
Primo quandò centrum gravitatis altius eſt centro oſcillationis. Hæc Bilanx ponderibus quamvis æqualibus onerata, vix in æquilibrio poteſt ſtare; at raro invenitur talis.
Secundò, quandò centrum oſcillationis altius eſt centro gravitatis; tùm Bilanx vix mobilis videtur, & difficulter hâc trutinemur. Bilancis falſæ hæc ultima ſpecies frequenter reperitur.

V. Pondera argentea vel ænea adhibeantur; plumbea enim aut ferrea facilius alterantur.

DE MENSURIS MEDICIS.

PINTA eſt Menſura cujus ſoliditas pollices cubicos viginti ſex cum dimidio adæquat. Aquâ communi frigidâ repleta uncias ſexdecim circiter pendet.

Sic notatur . . . . *Pint. j.*

CANON. Menſuras in Pharmaciâ non adhibe, ſed omnia trutinare: diverſa enim liquida ejuſdem Menſuræ, ponderibus diverſis æquipollent.

Metieris tamen liquida quorum dosis non ponderis sed Mensuræ caractere designatur.

DE ABBREVIATIS VERBIS.

℞. *Id est*, Recipe.

ANA, ĀN, Ā, ĀA, *seu* @. *Singulorum priùs recensitorum medicamentorum quantitatem sequentem sumendam esse significat.*

AD PONDUS OMNIUM. *Medicamentum cui hæc nota adscribitur, æqualis debet esse ponderis, ac alia simul sumpta.*

B. M. Balneum Maris, *vel* Mariæ.

B. V. Balneum Vaporis.

BOL. Bolus. *Medicamentum Opiatæ consistentiæ unâ vice sumendum.*

COCHL. Cochleare. *Circiter semunciam liquoris, seu trigesimam secundam partem Pintæ capit.*

DOS. Dosis. *Determinata portio Medicamenti.*

FASC. Fasciculus. *Quantùm manu ad axillam complicatâ comprehenditur.*

HAUST. Haustus. *Potio unicâ vice sumenda. Capit circiter uncias quatuor liquoris, seu quartam partem Pintæ.*

M. *Id est* Misce.

MANIP. Manipulus. *Quantùm manus comprehendere potest; Unciam pendet si Herbæ sint recentes; semunciam verò si siccæ.*

N.° Numero.

PAR. Paria.

PART. ÆQ. Partes æquales.

PP. Præparare, *vel* Præparatum.

PUG. Pugillus. *Quantùm cum pollice duo primi digitorum apices assumere possunt. Drachmas duas pendet si Herbæ sint recentes, semidrachmam verò si siccæ.*

POO. Potio.

Q. S. Quantum satis, Quantitas sufficiens.

Q. V. Quantum vis. *Hoc est ad Pharmacopæi libitum.*

S. A. Secundum artem. *Id est*, secundum regulas artis.

DE SUPELLECTILE.

LABORATORIUM dicitur locus in quo Pharmacopœus operationes ſuas peragit, ac Medicamenta præparat. Præparata autem, in *Apothecis* ſeu Pixidibus aut vaſis idoneis ſervat, & in *Officinâ* convenienti ordine reponit.

MORTARIUM eſt campana pulverationi inſerviens, ex Ære, Ferro, Marmore, vel Vitro, &c. confecta, in quâ medicamenta contunduntur, vel teruntur, imò pulverantur *Pilâ* ſeu *Piſtillo* idoneo.

Pulveres per *Cribrum* ſeu *Incerniculum*, aut *Capiſterium*, ſi opus ſit, trajiciuntur & ſuccernuntur.

PORPHYRITES eſt lapis durus, ſuperficie levi, æquali, ad triturationem aptatus, *Molaris* alterius duriſſimi lapidis ope.

TORCULAR eſt prelum quo Olea vel Succi *exprimuntur*. Succi expreſſi ſæpè per *Filtrum* vel *Colum* trajiciuntur. Coli tres ſpecies diſtinguntur.

1° MANICA HIPPOCRATIS. Eſt ſaccus laneus figuræ pyramidalis.
2°. PANNUS. (*Blanchet*). Eſt panni albi portio quadratæ formæ.
3°. STAMEN. (*Étamine*). Eſt tenue cilicium, vel tela cannabina.

FILTRUM ſæpiſſime eſt *Charta emporetica* ſeu *Bibula*, ſive Papyrus poroſa, ſine glutine facta.

SPATHULA ſeu *Spatha*. Eſt inſtrumentum oblongum, inferius latum; quo abſque manuum inquinatione Medicamenta commodè tractantur.

ALEMBICUS. Eſt inſtrumentum è Cupro, Stanno, vel Vitro, &c. confectum, diſtillationibus inſerviens. Partes ejus ſunt;

I. VESICA ſeu *Cucurbita*. Eſt pars infima Alembici quæ in foco collocatur, & in quâ liquor diſtillandus imponitur. Figuræ eſt turbinatæ, oblongæ.

II. CAPITELLUM. Cucurbitæ imponitur operculi vice. Capitelli partes ſunt;

1.° REFRIGERATORIUM. Aquâ frigidâ repletur in diſtillatione, ut vapores condenſentur.

2.° GALEA (*la Tête de More*). Eſt pars interior Capitelli, ita fabrefacta ut vapores condenſati delabantur in Roſtrum.

3. ROSTRUM. eſt pars ſuperior *Fiſtulæ* perquam liquor in Excipienti ſeu Recipienti diſtillat.

Dantur Capitella *Cæca* dicta, ſine Refrigeratorio & abſque roſtro.

III. RECIPIENS ſeu Excipiens. Eſt vas figulinum aut vitreum roſtro Alembici adaptandum. Sæpè *Matratium*, ſeu lagena collo longo, Recipientis vices gerit.

Datur alia ſpecies Alembici CORNUTA vel RETORTA dicta, quia collum ejus ad inſtar cornu retortum eſt. Retorta capitello non indiget.

NOTA. I. Ad Alembicos pertinet VAS CIRCULATORIUM, (*Vaiſſeaux de rencontre*) : conficitur ex duobus matratiis ſibi mutuè junctis, ita ut vapores elevati in proprium liquorem denuò deſcendant, & quaſi in circulos rotentur. *Digeſtionibus* inſervit.

II. BALNEUM eſt materia in quâ Cucurbita aut Retorta reponitur : quare dicitur *Balneum arenæ* ſi in arenâ collocatur ; *Balneum cinerum* ſi in cineribus inſulſis ; *Balneum mariæ* ſeu *maris* ſi in aquâ calidâ ; *Balneum vaporis* ſi vaporibus aquæ bullientis exponatur, &c.

III. Fimus Equi calidus in quo Cucurbita aut Retorta imponitur *Venter equinus* dicitur.

FURNUS eſt machina cujus ope ignis continetur, coercetur & applicatur gradu neceſſario. Partes Furni ſunt ;

I. CINERARIUM. Eſt pars inferior in quam cineres delabuntur.

II. FOCUS. Eſt locus ignem continens.

III. CRATICULA, cui carbones vel materia combuſtilis imponitur ; Focum à Cinerario ſeparat.

IV. PORTÆ Cinerarii & Foci : foraminibus *Regiſtris* dictis pertuſæ ſunt pro regimine ignis.

IGNIS GRADUS ſunt quatuor.

PRIMUS GRADUS à calore hominis ſani ſeu decimo octavo gradu Thermometri *D. RÉAUMUR* incipit & ad vigeſimum octavum deſinit. Eſt calor *Hypocauſtorum* in quibus Medicamenta ſiccantur. Elixiriis, Tincturis, &c. parandis & fermentationi inſervit.

SECUNDUS GRADUS ignis à vigeſimo octavo gradu ejuſdem Thermometri ad octogeſimum extenditur, quo ſolet aqua ebullire. Decoctis, Diſtillationibus, &c. neceſſarius eſt.

TERTII GRADUS latitudo, eſt ab octogeſimo gradu ad Olei & Argenti vivi ebullitionem. In eo gradu Plumbum & Stannum liquantur.

QUARTO ET ULTIMO gradu, in *Crucibulis* ſeu vaſis fuſoriis metalla

cætera funduntur, vitrescit arena, calcinatur lapis calcarius, &c. Hic gradus *Reverberii* vocatur.

NOTA. Dicitur *ignis graduatus* qui per gradus augetur. *Ignis arenæ* pro Balneo arenæ. *Ignis nudus* dùm aliquid prunis immediatè imponitur.

MODIOLUS FUSORIUS (gallicè *Lingotiere*) & CONUS, sunt vasa ferrea in quæ metalla fusa effunduntur.

DE OPERATIONIBUS.

OPERATIO dicitur ea actio quâ Medicamenta parantur: quod fit;

I. Per DISPENSATIONEM seu simplicium Medicamentorum, remedium compositum *ingredientium*, debitâ quantitate selectionem, proùt *formula* seu regula docet.

II. Per PROCESSUM seu debitam manipulationem, & ad leges artis consonum operandi modum. *Processus chymicus* dicitur cùm de operatione chymicâ agitur.

LEVIGARE est substantiarum pulverationem ad perfectissimum gradum ducere. Has substantias *conquassatas*, seu pistillo tusas vel trituratas grosso modo, *pulvera* tenuiùs; dein *leviga* seu in pollen subtilissimum & impalpabile (sive ut aiunt in *Alkool*) redige.

Levigatio vel fit simpliciter supra porphyritem *siccè*; aut, si opus fit, affuso liquido. Vel fit *abluendo* in magnâ liquidi quantitate, *per inclinationem* materiam turbidam effundendo, tandem post *subsidentiam* longam *Decantando*.

DEPURARE vel *Defecare* est purum ab impuro separare. Impura quæ post depurationem relinquntur *Magma* aut *Feces* dicuntur. Pluribus modis fit Depuratio.

PER RESIDENTIAM aut *subsidentiam* : *Decantare* dicitur, Liquor à fecibus *per inclinationem* seu sensim inclinando effunditur, ne feces liquorem turbent.

Per DESPUMATIONEM. Inter coquendum spuma supernatans aufertur.

Per CLARIFICATIONEM. Succos aut Decocta clariora redduntur vel *Filtratione*, vel *Colaturâ*, per Filtrum vel Colum trajiciendo; (liquor colatus, *Colatura* dicitur.) vel additione Albuminis, Aceti, &c. vel fermentatione.

FERMENTATIO autem est motus intestinus substantiarum quo earum

principia

principia ita mutantur ut producta diversa præbeant. Triplex est: prima *vinosa* est, & spiritum ardentem distillatione producit; secunda *acida*, quâ Aceta parantur; tertia *putrida*, quâ putrefiunt omnia.

Tandem MUNDARE dicitur quoque de separatione rerum impurarum, inutilium, aut nocivarum. Fit;

1.° LAVANDO aquâ, aliove liquore.
2.° DECORTICANDO, seu *excorticando*, hoc est à cortice liberando.
3.° RADENDO, seu partes exteriores cultro auferendo.
4.° EXUNGULANDO, dùm petalorum pars infima rescinditur, &c.

MALAXARE est emollire, manu aut pilâ subigendo.

INCORPORARE est plurima medicamenta in massam coadunare.

DISSOLVERE dicitur de metallis; SOLVERE autem de salibus. Est convenienti *Menstruo* seu liquore, rem ita dividere & resolvere ut penitùs evanescat.

Si in Argento vivo fiat dissolutio *Amalgama* vocatur: *Mars* nequit amalgamari.

Si materia dissoluta fundum menstrui petat, *Præcipitata* dicitur.

INFUNDERE est materiam liquori immergere. Per *Infusionem* Medicamentorum vires extrahuntur. Si Infusio blando & constanti calore fiat DIGESTIO dicitur. Si autem fiat frigidè, MACERATIO nuncupatur. Tandem si radiis solaribus exponatur INSOLATIO est.

DISTILLARE est corporum partes volatiles per Alembicum vi ignis elicere. Fit pluribus modis.

I. PER ASCENSUM dùm Alembicus munitus est capitello.
II. PER LATUS dùm distillatio fit per Retortam.
III. PER DESCENSUM dùm materia distillanda sub igne ponitur. Hujus distillationis usus, utpotè vitiosus, abolevit.

In distillationibus prodeunt: 1.° volatiliora ut *Spiritus* seu partes tenuissimæ & incorruptibiles, vel *Essentiæ* in quibus potissimùm vires medicamentosæ resident.

2.° Partes minus volatiles ut *Phlegma* seu pars aquosior.
3.° *Empireumatica* seu adusta, odoris ingrati ob ignis violentiam.
4.° Remanet in fundo Alembici *Caput mortuum* vel *Terra mortua* (*Terre morte*) seu materia residua ascensionis incapax.

Diſtillatio corporis ſolidi *Sublimatio* dicitur: partes ejus volatiles *Flores* vel *Salia volatilia* appellantur & ſub formâ ſolidâ ad capitellum adhærent.

Si liquor diſtillatus proprias ſuper feces affundatur, ac denuò diſtilletur, fit *Cohobatio.*

Rectificantur, id eſt iterùm diſtillantur, quædam remedia, ut puriſſima ſive in *Alkool* evadant. Vinum cujus pars ſpirituoſa avolavit *Vappa* dicitur.

NOTA. I. Retortæ igni nudo exponendæ *loricantur*, id eſt argillâ aliâve materiâ, à nimiâ ignis torturâ, defenduntur.

II. In omnibus fère diſtillationibus vaſa *lutantur* ſive eorum juncturæ vel fiſſuræ viſcido quodam obturantur.

CRYSTALLISARE eſt ſalia in cryſtallos efformare: quod fit,

I. Refrigerando, ſeu in loco frigido ſolutionem reponendo.

II. Evaporando & refrigerando ſimul; tum fit evaporatio *ad pelliculam*, hoc eſt uſque dum pellicula ad ſuperficiem liquoris appareat. Cryſtallis exemptis, evaporatio & refrigeratio inſtituentur iterum, toties id repetendo donec ſolutio cryſtallos dare negeta

Evaporatur *ad ſiccitatem*, cùm humiditas omnis diſſipatur.

CANDISARE eſt Saccharum cryſtalliſare.

Quædam ſalia cryſtalliſationis incapacia ſunt; ſed ad ſiccitatem evaporata, denuò humiditatem attrahunt & *in deliquium* ſeu in liquorem diffluunt: talia ſunt *Sal Tartari*, *Butyrum Antimonii*, &c.

ASSARE, ſeu *Torrere*, eſt in ſartagine igni expoſitâ, Medicamentorum humiditatem abſumere, *continue agitando.*

DECREPITARE eſt ſal, vi ignis, aquâ cryſtalliſationis cum ſtrepitu privare.

CALCINARE verò eſt principia volatilia omnia vi ignis auferre, ut in *Calce viva*; aut corpora phlogiſtico privare, ut in *Calce metallicâ.*

FUMIGARE eſt fumo exponere.

FUNDERE & *Liquare* eſt materiam igni exponere donec fluat. *Fundere* ad metalla, *Liquare* ad reliqua pertinet.

INCINERANTUR corpora dùm in cineres rediguntur.

NOTA. I. Materiæ pluries candefactæ & in aquâ toties alternatim immerſæ, *Extinctæ* dicuntur, ſed Mercurius vivus dicitur extinctus quando cum Axungiâ aut Terebinthinâ ita miſcetur ut percipi nequeat.

II. CEMENTARE vel *Stratificare* eſt medicamenta cum *Cemento* ſeu pulvere aut paſtâ idoneis alternatim per *ſtrata* ſeu *ſtratum ſuper ſtratum* diſponere ; eâ cautione ut primum & ultimum ſtratum ſit à cemento.

III. DETONATIO , *Exploſio* , ſeu *Deflagratio* eſt actio Nitri cum phlogiſtico combuſti, aut ſolummodò calefacti vel confricti. Cave ab omni detonatione, ſed præſertim à deflagratione *Auri fulminantis.*

DE PRÆPARATIONIBUS MEDICAMENTORUM.

ADIPIS PRÆPARATIO.

℞. Adipis recentis cujuſvis animalis ſani . *Quantùm volueris.*

Fibras & venulas exime, concide minutim & elue multotiès aquâ purâ. Liqueſcat igne leni ad humiditatis conſumptionem; cave ne comburatur. Cola & reconde in vaſe idoneo.

ALOES LOTIO.

℞. Aloës . . . . *Quantùm volueris.*

Solve in aquæ fontanæ quantum ſatis, adhibito leni calore. Cola; rejectis fecibus, ad Mellis conſiſtentiam evapora.

NOTA. Aloë lucida & puriſſima non indiget lotione.

ALTHÆÆ MUCAGO. (*a*)

℞. Radicum Althææ in taleolas ſectarum. *Libram.*
Aquæ tepentis . . . . *Pintas vj.*

Digere per viginti quatuor horas ſuprà cineres

(a) *Mucago*, ſeu *Mucilago* quaſi ad *Mucum* accedens.

calidos, identidem agitando ſpathâ ligneâ. Dein bulliant donec aqua paulò plus lenteſcat quam albumen. Tum trajice per ſetaceum & fortitèr exprime.

Eodem modo parantur MUCAGINES { CYDONIORUM, FŒNUGRÆCI, LINI, PSYLLII, &c.

ALUMINIS PURIFICATIO.

℞. Aluminis romani . . . . *Quantùm volueris.*

Solve in ſufficienti quantitate aquæ ferventis. Filtra; evapora ad pelliculam. Repone in cellâ ut concreſcant cryſtalli.

Sic purificatur BORAX.

ALUMINIS USTIO.

℞. Aluminis rupei . . . . *Quantùm volueris.*

Mitte in patinam fictilem non vitratam. Igne nudo calcina.

GUMMI AMMONIACI PURIFICATIO.

℞. Gummi Ammoniaci . . . . *Quantùm volueris.*

Solve, leni igne, in ſufficienti quantitate Vini albi, aut Aceti. Solutionem lacteſcentem pluries per ſtamen vel cribrum trajice, fortiter exprimendo: colaturam evapora ad mellis conſiſtentiam.

Sic purificantur { BDELLIUM, GALBANUM, SAGAPENUM, OPOPANAX, EUPHORBIUM.

NOTA. I. Gummi lacrymæ puriores non indigent purificatione.

II. *Scammonium* præparatum DIAGRIDIUM vel DIACRIDIUM vocatur. Nullâ tamen indiget

præparatione ; ſed poſt pulverationem aëri exponito ut nauſeoſum odorem amittat.

ANTIMONII PRÆPARATIO.

℞. Antimonii crudi in mortario ferreo pulverati . . . . *Quantùm volueris.*

Suprà porphyritem leviga. Cum aquâ multâ permiſce ; aquam turbidam per inclinationem in vas idoneum decanta. Cum Antimonio ſuperſtite eaſdem operationes repete donec totùm exhauſtum ſit. Dein Antimonium alkooliſatum, per ſubſidentiam in fundo remanens, exſicca & ſerva.

Eodem modo præparantur { BOLUS, CERUSSA, CINNABARIS, CRETA, HÆMATITES, LITHARGYRUS, MAGNES, &c.

ARI FECULA.

℞. Radicum recentium Ari mundatarum . *Quantùm volueris.*

In mortario marmoreo tuſas, in ſacco cannabino prelo exprime. Succum in vaſe vitreo repone. Paulatim *Fecula* ſubſidet, Amyli inſtar. Decantato liquore ad Solis calorem Feculam exſicca in lapide cretaceo chartâ albâ cooperto.

Sic præparatur FECULA { BRYÔNIÆ, IREOS, &c.

BUFONUM USTIO.

℞. Bufones . . . . *Quot volueris.*

Crema igne nudo per horam, in ollâ fictili coopertâ non vitratâ. Pulvera & ſerva.

Sic uri poſſunt { ERINACEI, SPONGIÆ, &c.

BUTYRI MAJALIS PRÆPARATIO.

℞. Butyri recentis insulsi sub finem Maii confecti . . . . *Quantùm volueris.*

Liqua balneo maris in vase fictili vitrato. A subsidente sero separa. Reconde in vase & loco idoneis.

CALAMINARIS PRÆPARATIO.

℞. Lapidis Calaminaris electi . . . . . *Quantùm volueris.*

Candefactum in crucibulo, in aquâ Fœniculi extingue. Semel atque iterùm id repete. Supra porphiritem cum aquâ leviga, & in Trochiscos redige.

Sic præparantur { TUTHIA, PUMEX, &c.

CATECHU PURIFICATIO.

℞. Catechu selecti & contriti . . . . . *Quantùm volueris.*

In sufficienti quantitate aquæ calentis per aliquot horas infunde. Solutionem perfectam per setaceum cribrum trajice. Catechu per residentiam defecatum vaporet ad siccitatem.

CHELARUM CANCRORUM PRÆPARATIO.

℞. Chelarum nigrarum Cancrorum . . *Quantùm volueris.*

Aquâ fluviatili calente pluries in die renovatâ ablue, donec nullus in eis deprehendatur odor; tùm exsicca. Pulvera subtilissimè in mortario ferreo. Suprà porphyritem leviga, instillando aquam communem. Ubi Chelæ ori inditæ nullum sub dentibus stridorem edunt eas in Trochiscos redige.

Simili modo præparantur { CORALLA, MATER PERLARUM, OCULI CANCRORUM, OSTREARUM TESTÆ, PERLÆ seu MARGARITÆ, &c.

CORNU CERVI CALCINATIO.

℞. Cornu Cervi apices . . . . *Quot volueris.*

Igne violento ad albedinem, in ollâ fictili, apertâ, non vitratâ, combure. Tere in mortario. Suprà porphyritem leviga, instillando aquam, & in Trochiscos redige.

Sic calcinatur EBUR.

CORNU CERVI PHILOSOPHICA PRÆPARATIO.

℞. Cornu Cervi apices . . . . *Quot volueris.*

Coque in vase ritè obturato cum sufficienti quantitate aquæ communis, donec exterior pellicula scalpello facilè detrahatur. Hanc pelliculam & medullam extrahe, & apices sicca.

NOTA. In distillatione herbarum, Cornua Cervi philosophicè præparari possunt, si in collo Vesicæ suspendantur, donec friabilia evadant.

ESULÆ PRÆPARATIO.

℞. Corticis medii radicis Esulæ . . . . *Quantùm volueris.*

Per viginti quatuor horas in Aceto forti macera. Exime & sicca.

Simili modo præparantur radices HELLEBORI.

HYDRARGYRI PURIFICATIO.

℞. Hydrargyri . . . . *Quantùm volueris.*

In mortario vitreo cum Aceto Sale marino saturato, tere. Aqua largiori lava. Chartâ bibulâ absterge; dein leni calore sicca. Tandem per alutam trajice & serva.

LAPIDUM PRETIOSORUM PRÆPARATIO.

℞. Fragmentorum Lapidum pretiosorum. *Quantùm volueris.*

Aquâ ablue. In mortario ferreo crassè pulvera,

Suprà chartam pulverem expande; & Magnetis ope, Ferri particulas aufer. Tùm ſupra porphyritem in alkool leviga.

LAZULI PRÆPARATIO.

℞. Lapidis Lazuli . . . . *Quantùm vis.*

Candeſcat in crucibulo. Suprà porphyritem cum aquâ léviga, & in Trochiſcos redige.

LUMBRICORUM PRÆPARATIO.

℞. Lumbricos terreſtres . . . . *Quot volueris.*

Mundentur à terrâ. Aquâ ablue. Rejectâ aquâ, cum Vino iterum ablue; & illico balneo maris exſicca. Siccos in vaſe vitreo accurate clauſo ſerva.

MARTIS LIMATURÆ PRÆPARATIO.

℞. Limaturæ Martis ope Magnetis à ſordibus mundatæ . . . . . . *Quantùm vis.*

Tere in mortario ferreo. Dein ſupra porphyritem ſine aquâ leviga ad alkool.

MELLIS DESPUMATIO.

℞. Mellis optimi . . . . *Quantùm volueris.*

Igni lento expone in vaſe idoneo donec ſpumeſcat: ſpumas ſupernatantes abſtrahe. Tùm ab igne remove. Per ſetaceum trajice & ſerva.

MILLEPEDUM PRÆPARATIO.

℞. Millepedes viventes, coloris argentei . . . . *Quot volueris.*

Vino albo ſuffoca & ablue. Exſicca & ſerva.

RHEI TORREFACTIO.

℞. Rhei pulverati . . . . *Quantùm volueris.*

Mitte in patinam ferream. Impone igni mode-

rato, continuè ſpathâ movendo, donec fuſcum colorem acquiſiverit. Serva ad uſum.

Sic torrefiunt MYROBALANI, &c.

NITRI PURIFICATIO.

℞. Nitri tertiæ coctionis . . . . *Quantùm volueris.*

In aquâ limpidâ ſolve. Igne lento ad pelliculam craſſam vaporet. Tepidum liquorem filtra. Criſtallos cubicas (*Sal marinum*) rejice. Ad cryſtalliſationem repone, & Nitrum exime. Bis, terve proceſſum repete donec liquor cryſtallos cubicas dare neget. Tùm Nitrum Sale marinò omninò ſpoliatum obtinebis.

NOTA. Reſiduum aquæ purificationis, AQUA MATER NITRI, vocatur.

OVORUM PUTAMINUM PRÆPARATIO.

℞. Putaminum Ovorum . . . . *Quantùm volueris.*

Cum aquâ leviter & diù conquaſſa. Aquâ plurimâ ſerventi multoties ablue. Membranulas decantando rejice. Remanentia in fundo putamina pulvera; leviga, & in Trochiſcos redige.

SALIS MARINI DECREPITATIO.

℞. Salis marini . . . . *Quantùm volueris.*

Projice per vices in ollam fictilem, non vitratam, candentem. Vaſe cooperto decrepita.

SCILLÆ COCTIO, *ad Trochiſcos.*

℞. Scillas recentes, ablatis corticibus exterioribus & radiculis . . . . . *Quot volueris.*

Singulas paſtâ Tritici ſubactâ & fermentatâ involve. In clibano coque donec feſtucâ penetrari poſſint. Tùm ſingularum ſquamas, cruſtâ mundatas, demptis membranulis, pinſa & per ſetaceum trajice.

SCILLÆ EXSICCATIO.

℞. Scillæ ſquamas . . . . *Quot volueris.*

Filo trajice ita ut una aliam non attingat. In umbrâ & loco ſicco exſiccentur.

SERI LACTIS PRÆPARATIO.

℞. Lactis vaccini, vel alterius animalis ſani . . . . *Pintas ij.*

Inde vaſi idoneo. Incipiente ebullitione adde,

Cremoris Tartari pulverati . . . . . *Drachmam.*

Vas ab igne remove. Lac coagulatum cola. Colaturam Ovi albumine ſine ebullitione clarifica & per filtrum trajice.

SPONGIÆ PRÆPARATIO.

℞. Spongiæ nondum in uſum vocatæ, ab arenulis expurgatæ, & exſiccatæ . . . . *Quantùm volueris.*

Immerge Ceræ flavæ liquefactæ, dein prelo fortiter exprime. Refrigeratam exime & ſerva.

STYRACIS LIQUIDÆ PURIFICATIO.

℞. Styracis liquidæ . . . . *Quantùm volueris.*

Per ſetaceum trajice.

SUCCINI PRÆPARATIO.

℞. Succini . . . . *Quantùm volueris.*

Tere in mortario. Trajice per cribrum. Pollinem ſuprà porphyritem leviga, donec nullæ ſplendentes particulæ appareant.

SUCCORUM DEFECATIO.

℞. Herbarum recentium, Florum, aut Fructuum . . . . *Quantùm volueris.*

Contunde in mortario marmoreo, piſtillo ligneo; vel abrade, pro rei naturâ. Prelo exprime. Succum ſine per ſubſidentiam reſidere, limpidum decanta; vel trajice per manicam.

NOTA. I. Plantis minùs ſucculentis, ferventem aquam; viſcoſis, ignem moderatum adhibe.

II. Succi cum Saccharo vel Melle clarificandi vel coquendi; aut Unguentis & Emplaſtris admiſcendi, defecatione non indigent.

III. Succi acidi aut auſteri, uti *Acetoſæ*, *Citri*, *Cydoniorum*, *Mororum*, *Rubi idæi*, *&c.* Pro Syrupis parandis, in lagenis anguſti colli, ſuperaffuſo oleo, in loco frigido aſſerventur.

TEREBINTHINÆ COCTIO.

℞. Terebinthinæ venetæ . . . . *Quantùm volueris.*

Coque in ſufficienti quantitate aquæ communis, ad Colophoniæ duritiem. Exime & ſerva.

GUMMI TRAGACANTHI MUCAGO.

℞. Gummi Tragacanthi albi & puriſſimi . . . . *Quantùm volueris.*

Digere in Aquæ communis ſufficienti quantitate, donec perfectam ſolutionem & Mivæ conſiſtentiam acquiſiverit. Per cribrum ſetaceum trajice.

CLASSIS PRIMA.

DE OPERATIONIBUS GALENICIS.

ARTICULUS PRIMUS.

DE PTISANIS, DECOCTIS ET JUSCULIS.

OMnia hujus articuli remedia decocta ſunt ſive ebullita. Vix niſi per etymologiam differunt. Decoctum cum hordeo PTISANA vocatur; decoctum fortius, APOZEMA; decoctum ad injectiones CLYSTER, CLYSMA, vel ENEMA; decoctum cum jure, JUSCULUM; decoctum ad irrigandum partes, EMBROCHE; ad fovendum, FOTUS, ſeu FOMENTUM; Fotus autem ad ſtomachum EPITHEMA nuncupatur.

CANON. I. Vegetabilia recenter & modicè ſiccata (niſi recentia expetantur) antè coctionem incide & contunde.

II. Bulliant primò Cornua Cervi, Ligna, Cortices, Radices, &c. ſiccioris & durioris compagis; ſub finem coctionis adde Viſcoſa; tandem Aromatica & Glycyrrhizam raſam & contuſam, hæc enim diuturnâ ebullitione amarorem conciliat.

III. Decocta ſubſidendo depura; ſi turbida expetantur, hæc per ſtamen cola.

IV. Ptiſanas pro potu & affatim hauriendas, ſic para, ut coctione nimiâ nec lenteſcant, nec oculis aut palato diſpliceant.

PTISANÆ.

PTISANA COMMUNIS.

℞. Hordei integri & in aquâ calidâ loti . . . . *Uncias ij.*
Radicis Graminis mundatæ . . . . *Unciam.*

Coque in Aquæ communis *sufficienti quantitate*, ad *Pintas viij*. sub finem coctionis adde.

Glycyrrhizæ rasæ & contusæ . . . . *Unciam* ß.

Decoctum refrigeratum decanta.

Ptisana seu Decoctum hordeaceum.

℞. Hordei integri, in aquâ calidâ loti . . . . *Unciam*.
Aquæ communis . . . . *Pintam* *iß*.

Coque ad *crepaturam* (*a*). Cola.

Ptisana pectoralis.

℞. Orizæ mundatæ & lotæ . . . . *Unciam*.

Coque ad crepaturam (*a*) in

Aquæ communis . . . . *Pintis vj*.

Tùm per horæ quadrantem infunde,

Radicis Althææ mundatæ & incisæ . . . *Drachmas ij*.
Foliorum Capillorum Veneris, } *ana* . . . *Drachmam*.
Florum Tussilaginis, }
Papaveris rhœados . . . . *Drachmam* ß.
Glycyrrhizæ rasæ & contusæ . . . . *Drachmas ij*.

Ptisanam refrigeratam decanta.

DECOCTA.

Decoctum emolliens.

℞. Quatuor herbarum emollientium . . . . . *Uncias ij*.
Florum Chamæmeli, } *ana* . . . . *Unciam* ß.
Meliloti, }

Coque in Aquæ communis *sufficienti quantitate* ad *Pintas ij*. Cola.

Decoctum laxans.

℞. Foliorum Sennæ mundatorum . . . . *Unciam*.

(*a*) Id est ad perfectam mollitiem.

Salis Tartari . . . . Scrupulos ij.
Aquæ communis . . . . Uncias xx.

Bulliant igne leni ad quintæ partis consumptionem; sub finem coctionis, adde,

Seminum Anisi . . . . Drachmam iß.

Colaturam serva.

Decoctum seu Ptisana regia.

℞. Radicum Polypodii querni, Cichorii, } ana . . . . Unciam.
Tamarindorum . . . . Unciam ß.
Aquæ communis . . . . Pintas ij.

Bulliant in vase figulino ad tertiæ partis consumptionem. In decocto ferventi infunde per aliquot horas,

Foliorum Sennæ mundatorum . . . . . Unciam.
Liquiritiæ rasæ & contusæ . . . . Unciam ß.
Foliorum Pimpinellæ . . . . Drachmas ij.

Decoctum refrigeratum cola.

Decoctum album Sydenhami.

℞. Cornu Cervi calcinati & levigati . . . Drachmas iij
Micæ Panis albissimi Lacte confecti . . Unciam.
Aquæ communis . . . . Pintas iij.

Bulliant ad tertiæ partis consumptionem. Cola, & edulcora cum sufficienti quantitate Sacchari albissimi. Adde Aquam Naphæ, vel Cinnamomi ad gratum saporem pro Medici præscripto.

Decoctum amarum.

℞. Radicis Gentianæ in taleolas sectæ . . . . Drachmas ij.
Aquæ communis . . . . Pintas iiij.

Bulliant per horæ semi-quadrantem, tùm infunde,

Summitatum siccarum Centaurii min. Cardui benedicti, } ana. Drach. ij.

Summitatum ſiccarum Scordii, } *ana* . . *Drachmas. ij.*
Flavedinis Citri recentis,

Decoctum refrigeratum decanta.

Decoctum anti-scorbuticum.

℞. Radicum Bardanæ, } *ana* . . . . *Unciam.*
Oxylapathi,
Aquæ communis . . . . *Pintas v.*

Bulliant in vaſe figulino vitrato ad *Pintas iiij.* tùm injice,

Radicis Raphani ruſticani inciſæ, } *ana. Unc. j.*
Foliorum recent. inciſ. Becabungæ,
Barbareæ,
Cochleariæ,
Naſturtii aquatici,
Trifolii fibrini.

Vaſe accuratè obturato, ſine dococtum refrigeſcere. Percolato liquori adde Citrei Mali flavedinem & ſuccum.

Decoctum Foresti.

℞. Hordei mundati . . . . *Unciam ß.*
Cicerum rubrorum . . . . *Unciam iß.*
Caricas pingues, } *ana* . . . . *Numero iiij.*
Jujubas,
Seminum Malvæ, } *ana* . . . . *Drachmam.*
Althææ,
Quatuor Seminum frigidorum majorum. *Drach. ij.*
Radicis Liquiritiæ . . . . *Drachmas iij.*
Aquæ communis . . . . *Pintas iij.*

Præparata bulliant, ſuo ordine, ad tertiæ partis conſumptionem. Cola.

Decoctum Scorzoneræ, compositum.

℞. Radicum Scorzoneræ, } *ana* . . . . . . *Drachmas vj.*
Graminis,
Hordei integri mundati . . . . *Unciam.*

Rasuræ Cornu Cervi, } ana . . . . . . *Unciam ß.*
Liquiritiæ rasæ & contusæ, }
Aquæ communis . . . . *Pintas iiij.*

Bulliant suo ordine, ad medias. Cola.

Decoctum sudoriferum.

℞. Ligni Guajaci in scobem redacti . . . . . . *Unciam ß.*
Radicum Chinæ in taleolas sectæ, } *ana. Drach. vj.*
Sarsæparillæ minutim incisæ, }
Aquæ communis . . . . *Pintas iij.*

Digere per viginti quatuor horas, in vase terreo, vitrato, clauso. Dein coque ad *Pintas ij.* Sub finem adde,

Rasuræ ligni Sassafras, } *ana* . . . . *Drachmam.*
Glycyrrhizæ rasæ & contusæ, }

Post infusionem cola.

Infusio aromatica, *pro Fotu.*

℞. Summitatum Rosmarini, } *ana* . . . . . *Drachmas ij.*
Rutæ,
Salviæ,
Hyssopi,
Lavandulæ,
Florum Chamæmeli, }
Aquæ communis ferventis . . . . *Pintas iij.*

Digere vase clauso. In colaturâ solve,

Salis Ammoniaci . . . . *Drachmam.*

Nota. Si loco *Aquæ communis*, *Vinum rubrum generosum* adhibeatur, erit VINUM AROMATICUM, *pro Fotu.*

JUSCULA.

Jusculum viperinum.

℞. Viperam vivam.

Caput

Caput amputa; pellem exime; exentera. Incisam, additis sanguine, corde & hepate, coque igne leni per tres quatuorve horas in Aquæ communis sufficienti quantitate ad *Semi-pintam.* Cola.

Jusculum è Cancris fluviatilibus.

℞. Pulli gallinacei *dimidiam partem*; vel Carnis vitulinæ . . . . *Uncias xij.*
Cancros fluviatiles vivos in mortario marmoreo contusos . . . . *Numero vj.*

Coque igne leni in sufficienti quantitate Aquæ communis ad *Pintam.* Cola; leviter exprime.

Nota. His Jusculis, pro Medici jussu, variæ Plantæ & Radices adduntur.

Gelatina Cornu Cervi, *extemplò paranda.*

℞. Rasuræ Cornu Cervi . . . . *Libram ß.*
Aquæ communis . . . . *Pintas vj.*

Vase figulino cooperto coque ad *Pintas ij.* Cola cum expressione. Adde,

Sacchari albi . . . . *Libram ß.*

Ovi Albumine clarifica. Coque igne leni ad Gelatinæ mollioris consistentiam. Sub finem, Flavedine Citri aromatiza. Repone in loco frigido ut in Gelatinam concrescat.

ARTICULUS SECUNDUS.

DE ACETIS, VINIS ET CEREVISIIS.

HÆc Remedia fermentationem passa, variorum Medicamentorum viribus per infusionem imprægnantur.

CANON. I. Vina generosa elige: eorum evaporationem cave.

II. Ingredientia omnia mundata, incisa, & contusa, simul infunde.

III. Herbæ sint modicè siccatæ, ni aliter præscribantur.

ACETA.

ACETUM ANTI-PESTILENTIALE.

℞. Summitatum recent. Absinthii majoris,
minoris,
Rosmarini,
Salviæ,
Menthæ,
Rutæ, } *ana. Unc.* iß.

Florum siccatorum Lavandulæ . . . . . *Uncias ij.*

Allii,
Acori veri,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ, } *ana* . . . . *Drachmas ij.*

Aceti acerrimi . . . . *Pintas viij.*

Digere balneo arenæ in matratio ritè obturato per duodecim dies. Cola fortiter exprimendo. Filtra. Tùm adde,

Camphoræ in Spiritu Vini solutæ . . . *Unciam* ß.

Serva in lagenâ benè obturatâ.

ACETUM CAMPHORATUM.

℞. Camphoræ . . . . *Drachmam.*

In mortario lapideo tere, affundendo

Spiritûs Vini rectificati . . . . *Guttas xx.*

Adde,

Sacchari albi . . . . *Uncias ij.*

Diù simul tritis misce,

Aceti Vini fragrantis . . . . *Uncias x.*

ACETUM LITHARGYRATUM.

℞. Lithargyri aurei pulverati . . . . *Libram* ß.
Aceti acerrimi . . . . *Pintam.*

Coque ſimul in vaſe fictili ad quartæ partis conſumptionem, tùm liquorem filtra, & ſerva.

NOTA. 1.° Miſce Aceti lithargyrati *Drachmas ij*, cum Aquæ communis *Pintâ*; erit LIQUOR SATURNINUS.

NOTA. 2.° Non albeſcit Liquor, ſi paretur cum Aquâ ſtillatitiâ vel pluviali.

OXYCRATUM.

Fit ex unâ parte *Aceti Vini* & ſex *Aquæ*.

ACETUM SCILLITICUM.

℞. Scillæ exſiccatæ . . . . *Libram* ß.
Aceti Vini acerrimi . . . . *Pintas* v.

Inſolentur, in vaſe benè obturato, per quindecim dies. Acetum cola, fortiter exprimendo, filtra & ſerva.

Simili modo parantur ACETA { È FLORIBUS SAMBUCI, È ROSIS RUBRIS, È DRACUNCULO HORTENSI, &c.

VINA.

VINUM ABSINTHITES.

℞. Comarum exſiccatarum utriuſque Abſinthii . . . . *Uncias ij.*
Vini albi . . . . *Pintas ij.*

Macera, per viginti quatuor horas, in matratio obturato, cola cum expreſſione & filtra.

VINUM ANTI-SCORBUTICUM.

℞. Radicum recentium & minutim inciſarum
Raphani ruſticani . . . . *Unciam iß.*

Foliorum recentium Cochleariæ,
Nasturtii aquatici,
Becabungæ,
Trifolii fibrini,
Lepidii.
Seminum Sinapi, } *ana Drach. vj.*
Salis Ammoniaci pulverati . . . . *Drachmam iß.*
Vini albi . . . . *Pintas vj.*

Herbas in mortario marmoreo contunde. Semen Sinapi tere cum aliquantulà parte Vini. Omnia macerentur in vase idoneo ritè abturato, per aliquot dies. Cola cum expressione, & serva in lagenis benè obturatis.

VINUM EMETICUM.

℞. Croci metallorum . . . . *Unciam.*
Vini albi optimi . . . . *Pintam.*

Digere in vase vitreo ritè obturato, sæpiùs agitando, per aliquot dies, & simul serva ad usum.

CEREVISIÆ.

CEREVISIA ANTI-SCORBUTICA.

℞. Radicum Raphani rusticani . . . . . . *Uncias vj.*
Acetosæ pratensis . . . . . . *Uncias iij.*
Canellæ albæ . . . . *Unciam.*
Herbarum recentium Trifolii fibrini . *Uncias iiij*

Incisis & contusis macerentur in vase idoneo per aliquot dies in

Cerevisiæ mediæ & recentis . . . . . . *Pintis xxxx.*

CEREVISIA DIURETICA.

℞. Seminum Sinapi,
Baccarum Juniperi, } *ana* . . . . *Uncias iiij.*
Seminum Dauci sylvestris . . . . *Unciam iß.*
Foliorum Absinthii vulgaris . . . . . *Unciam.*

Incisa & contusa, macerentur in vase idoneo, in

Cerevisiæ mediæ & recentis . . . . . *Pintis xxxx.*

ARTICULUS TERTIUS.

DE EXTRACTIS.

EXTRACTA, Decoctis & Infusis analoga sunt; nam pleraque ebullitione parantur, & evaporatione perficiuntur. Extractorum consistentia varia est pro eorum naturâ, alia enim ficciorem, alia molliorem exigunt.

CANON. I. Decocta vel Infusa, è quibus Extracta parantur, per subsidentiam vel colaturam depura.

II. Substantias gummosas, mucilaginosas, salinas, & saponaceas, Aquâ extrahe; oleosas vèro & resinosas, Spiritûs Vini infusione.

III. Levi ebullitione in vasis figulinis & balneo maris vaporet Extractum, ne quid metallicum aut, nimio ignis gradu, odorem empireumaticum seu adustum contrahat.

IV. Ad evaporationem faciliorem vasa plana adhibe.

V. Extracta in vasis vitreatis reconde; quæ verò temporis lapsu duriora evadunt vesicis, Oleo vel liquore idoneò illitis, priùs involuta sint.

EXTRACTUM ABSINTHITES.

℞. Herbarum Absinthii recenter siccatarum *Quantùm vis.*

Bulliant in Aquæ communis sufficienti quantitate. Colatura fortiter expressa, igne lento, ad Mellis crassioris consistentiam vaporet.

Eodem modo parantur EXTRACTA Herbarum { AGRIMONIÆ, CENTAURII MINORIS, CARDUI BENEDICTI,

Fructuum COLOCYNTHIDIS,

Radicum { ENULÆ CAMPANÆ, GENTIANÆ, HELLEBORI NIGRI, LAPATHI, &c.

EXTRACTUM MENYANTHES.

℞. Succi defecati foliorum Menyanthes . *Quantùm vis.*

Vaporet igne lento ad Mellis ſpiſſitudinem.

Eodem modo parantur EXTRACTA Herbarum { CICHORII, DENTIS LEONIS, FUMARIÆ, CICUTÆ, *cum ſucco non defecato.*

EXTRACTUM RHEI.

℞. Rhei electi inciſi . . . . *Quantùm vis.*

Affunde Aquæ ferventis quantum ſufficit, digere balneo maris per duodecim circiter horas. Liquorem calentem cola cum expreſſione, & colaturam ſerva. Materiæ ſuperſtiti novam Aquæ ferventis quantitatem affunde. Digere ut ſupra. Cola calidè cum expreſſione forti.

Colaturas calentes mixtas trajice per manicam. Vaporent balneo maris ad debitam conſiſtentiam.

Simili modo parantur EXTRACTA { CROCI, KINÆ-KINÆ.

EXTRACTUM JUNIPERI.

℞. Baccarum Juniperi maturarum & recentium . . . . *Libras iiij.*

Contundantur & bulliant ad mollitiem in

Aquæ communis . . . . *Pintis viij.*

Liquor fervens exprimatur per manicam, coletur & balneo maris vaporet ad Extracti liquidi conſiſtentiam.

EXTRACTUM CATHOLICUM.

℞. Foliorum Sennæ mundatorum . . . . . *Unciam.*
Turbith gummosi,
Radicis Hellebori nigri,
Agarici albi & levis,
Rhabarbari electi,
Pulpæ Colocynthidis.
} *ana* . . . . . *Unciam* ß.

Incisa & contusa, digere balneo arenæ per duos tresve dies in cucurbitâ vitreâ, cum

Spiritûs Vini rectificati . . . . *Pintis* ij.

Exprime fortiter. Vaporet ad Mellis consistentiam. Tùm,

℞. Magma prioris Infusionis

Digere per horas viginti quatuor, in Aquæ communis *Pintis ij*. Bulliant; unâ aut alterâ ebullitione factâ, cola cum expressione & filtra: vaporet ad Mellis consistentiam. Dein,

℞. Extracta duo suprà dicta non refrigerata,
Aloës lucidæ pulveratæ . . . . *Drachmas* vj.

Misce diligenter. Cùm refrixerint adde,

Scammonii subtiliter pulverati . . . . . *Drachmas* vj.
Extracti Croci . . . . *Scrupulum* ß.

Misce iterùm exactè, & aromatiza cum

Oleorum essentialium Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Anisi.
} *ana* . *Guttis* iij.

Malàxa aliquamdiù & servà.

NOTA. Si quis primam infusionem distillare velit, extrahet Spiritum Vini.

EXTRACTUM OPII.

℞. Opii minutim incisi . . . . *Uncias iiij.*
Aquæ pluvialis puriſſimæ . . . . *Pintas ij.*

Inde matratio vitreo. Igne graduato arenæ bulliant per duas horas. Liquor, colatus in vaſe figulino vitreato, vaporet ad Mellis conſiſtentiam.

Intereà, magma prioris colaturæ levi calore exſicca; tùm, affuſo Spiritu Vini ad eminentiam quatuor digitorum, per duodecim horas digere. Liquor colatus vaporet balneo mariæ ad Mellis conſiſtentiam.

Tandem Extracta duo miſce exactè, & balneo mariæ inſpiſſa, donec Pilulæ efformari poſſint.

EXTRACTUM ſeu SAL KINÆ-KINÆ *Comitis de Lagaray.*

℞. Corticis Peruviani conquaſſati . . . . *Uncias ij.*
Aquæ frigidæ . . . . *Pintas viiiß.*

Inde vaſi vitreo. Macera per duos dies ſæpe agitando. Filtra. Sine ebullitione vaporet ad *Pintam.* Frigidam filtra denuò, inde tribus aut quatuor faventinis lancibus. Balneo maris exſicca. Cultello ſquamatim abrade. Serva in vaſe optimè obturato.

ARTICULUS QUARTUS.

DE MELLITIS, SYRUPIS ET LOOCH.

IN hoc articulo, Remedia liquida ex Melle vel Saccharo plerumquè condita, locantur. Quæ ex Melle MELLITA, quæ verò ex Saccharo SYRUPI vocantur.

Quædam alia Remedia cum Melle aut Saccharo, extemporè parantur: ſcilicet, SUPPOSITORIUM, ano inſerendum.

EMULSIO, Lacti ſimilis, ex ſeminibus oleoſis, ut Amygdalis, &c. elicitur.

LOOCH

LOOCH vel ECLEGMA, ſeu LINCTUS ſenſim deglutitur.
JULEP ſeu JULAPIUM ex Aquâ & Syrupo paratur.
OLEOSACCHARUM vel ELEOSACCHARUM eſt Oleum ſtillatitium cum Saccharo mixtum.

CANON. I. Articuli primi tres priores Canones, huc revoca.

II. Syrupi non coquendi Saccharo puriſſimo indigent. Et ratione liquoris, duplum Sacchari pondus, balneo maris diſſolvendum adhibe.

III. Syrupos cum Albumine clarifica.

IV. Syrupos è ſuccis acidis aut auſteris, in vaſe figulino vitreato confice & in lagenis ſerva.

V. Syrupi coctio cognoſcitur dùm è cochleari, guttæ ultimæ non delabuntur ſphericæ, ſed elenchi formam referentes.

MELLITA.

MEL MERCURIALE.

℞. Succi Mercurialis, } *ana* . . . . *Partes æquales.*
Mellis optimi, }

Miſce, coque. Deſpuma, & ad Syrupi conſiſtentiam redige.

MEL ROSATUM.

℞. Petalorum Roſarum rubrarum recentium . . . . *Libras iij.*
Aquæ bullientis . . . . *Pintas xij.*

Digere per duodecim horas in vaſe terreo vitreato, cola & exprime. Parem Petalorum Roſarum quantitatem in colaturâ digere; idque tertiò repete. Ultimæ colaturæ ponderatæ, adde,

Mellis optimi . . . . *Parem quantit.*

Unicâ factâ ebullitione, cola, & ad Syrupi conſiſtentiam coque.

OXYMEL SIMPLEX.

℞. Mellis optimi deſpumati . . . . *Libras ij.*
Aceti Vini optimi . . . . *Pintam.*

Coque igne lento, in vaſe fictili ad Syrupi conſiſtentiam.

OXYMEL SCILLITICUM.

℞. Mellis optimi deſpumati . . . . *Libras ij.*
Aceti ſcillitici . . . . *Pintam.*

Coque ut Oxymel ſimplex.

HYDROMEL VINOSUM.

℞. Mellis optimi . . . . *Partem unam.*
Aquæ communis . . . . *Part. quinque.*

Bulliant igne lento. Deſpuma donec Ovum recens, crudum, injectum ſupernatet. Liquorem quiete depuratum dolio inditum, ad fermentationem repone. Dùm odorem vinoſum acquiſiverit, liquorem decapula & ſerva.

MEL VIOLACEUM.

℞. Florum integrorum & recentium Violarum . . . . *Libras ij.*
Aquæ calidæ . . . . *Pintas iiij.*

Digere per duodecim horas. Cola cum expreſſione. Adde Mellis optimi *Libras vj.* Coque. Deſpuma, & in Syrupi conſiſtentiam redige.

SUPPOSITORIUM COMMUNE.

℞. Mellis . . . . *Drachmas iij.*
Salis marini . . . . *Drachmam ß.*

Coque ad ſpiſſitudinem, adde,

Saponis veneti minutim inciſi . . . . . *Drachmam.*

Liquefacto, fiat Suppoſitorium.

SYRUPI SIMPLICES.

SYRUPUS DE CAPILLIS VENERIS.

℞. Adianti americani . . . . *Unciam.*
Aquæ Bullientis . . . . *Pintas vj.*

Digere per duas horas. Cola, adde,

Sacchari albi . . . . *Libras iiij.*

Coque in Syrupum Aquâ Naphæ, ſi lubet, aromatizandum.

Eodem modo paratur SYRUPUS DE ABSINTHIO SIMPLEX.

SYRUPUS DE FARFARA.

℞. Florum Farfaræ recentium . . . . . . *Libras iij.*
Aquæ ferventis . . . . *Pintas xij.*

Digere per noctem. Manè factâ unâ aut alterâ ebullitione cola cum expreſſione.

In colaturâ, novam digeſtionem cum pari florum quantitate, & per idem temporis ſpatium repete. Cola & fortiter exprime. Adde,

Sacchari albi . . . . *Libras iij*

Clarifica. Coque in Syrupum.

Eodem modo paratur SYRUPUS DE NYMPHÆA. Cum petalis mundatis & marcidis.

SYRUPUS DE PAPAVERE ALBO.

℞. Capitum Papaveris albi, maturorum, recentium & abjectis ſeminibus . . . . *Libras ij.*

Aquâ frigidâ ablue. Scinde minutim. Coque ad mollitiem in ſufficienti quantitate Aquæ communis ad *Pintas vj*. Cola cum expreſſione. Decoctum clarifica. Adde,

Sacchari albi . . . . *Libras iiij.*

Coque in Syrupum

SYRUPUS DE PAPAVERE ERRATICO.

℞. Petalorum recentium Papaveris rhœados *Libram.*
Aquæ ferventis. . . . . *Pintas iij.*

In vaſe figulino vitreato digere per octo horas. Cola cum expreſſione.

Novam & æqualem petalorum quantitatem in colaturâ digere denuo. Cola cum expreſſione. Adde,

Sacchari albi . . . . *Libras iij.*

Clarifica & coque in Syrupum.

SYRUPUS DE ROSIS PALLIDIS.

℞. Petalorum Roſarum pallidarum . . . *Quantum ſatis,*

Ut vas figulinum repleatur. Quibus affunde Aquæ bullientis quantum vas capere poteſt. Ritè obtura. Stent in infuſione per viginti quatuor horas. Bulliant & colentur cum expreſſione. In colaturâ aliam Roſarum infuſionem ter quatervè eâdem methodo repete, donec petalorum color in infuſo intactus remaneat. Tandem poſtremæ colaturæ ponderatæ, adde Sacchari albi *parem quantitatem.* Clarifica. Coque in Syrupum.

Eodem modo paratur SYRUPUS DE FLORIBUS PERSICIS.

SYRUPUS DE ROSIS SICCIS.

℞. Roſarum rubrarum recenter ſiccatarum *Libram ß.*
Aquæ calentis . . . . *Pintas iiij.*

Digere per viginti quatuor horas. Bulliant. Cola cum expreſſione. Adde,

Sacchari albi . . . . *Libras iiß.*

Clarifica. Coque in Syrupum.

SYRUPUS VIOLACEUS.

℞. Petalorum Violarum recentium mundatorum & contuſorum . . . . *Libram.*

Aquæ ferventis . . . . *Pintas ij.*

Stent in vafe fictili vitreato & cooperto, donec refrigefcant. Colaturæ mediocriter expreffæ & ponderatæ, adde,

Sacchari albiffimi pulverati, ratione liquoris . . . . *Duplum.*

Fiat Syrupus Balneo maris.

Eodem modo fit SYRUPUS È FLORIBUS TUNICÆ.

SYRUPUS DE KINA-KINA.

℞. Corticis Peruviani conquaffati . . . . *Uncias vj.*
Vini rubri generofi . . . . *Pintas ij.*

Digere vafe claufo, per octo dies, identidem agitando. Filtra. Adde,

Sacchari albi, ratione liquoris . . . . . *Duplum.*

Coque in Syrupum.

SYRUPUS DE STIBIO.

℞. Vitri Antimonii fubtiliter pulverati . . *Unciam.*
Infunde in Vini albi generofi . . . . . *Pintâ.*

Stet in infufione per tres quatuorve dies, in vafe vitreo, fæpius agitando. Filtra, adde,

Sacchari albi, ratione liquoris . . . . *Duplum.*

Fiat Syrupus balneo maris.

SYRUPUS È SUCCO CICHORII.

℞. Succi Cichorii igne defecati, } *ana* . . . *Partes æquales.*
Sacchari albi, }

Mifce. Clarifica. Coque in Syrupum.

Eodem modo parantur SYRUPI È SUCCO { BETONICÆ, BRASSICÆ RUBRÆ, FUMARIÆ, &c.

SYRUPUS È SUCCO CITRI.

℞. Succi Citri per ſubſidentiam defecati . . *Quantum vis.*
Sacchari albiſſimi, ratione liquoris . . . *Duplum.*

Fiat Syrupus, in vaſe fictili, balneo maris.

Eodem modo parantur SYRUPI { EX ACETO VINI, È SUCCO FRUCTUUM BERBERIS, RIBIUM, CYDONIORUM, LIMONIUM, MORORUM, &c.

SYRUPUS È CORTICIBUS CITRI.

℞. Flavedinum Citri . . . . *Uncias vj.*
Aquæ ferventis . . . . *Pintas ij.*

Digere balneo maris, in vaſe clauſo, per duodecim horas. Cola. Adde,

Sacchari albiſſimi, ratione liquoris . . *Duplum.*

Fiat Syrupus balneo maris. Refrigeratum aromatiza Spiritu Citri.

SYRUPUS DE HYSSOPO, SIMPLEX.

℞. Summitatum Hyſſopi mediocriter ſiccatarum . . . . *Uncias iiij.*
Aquæ communis . . . . *Pintas ij.*

Diſtilla balneo maris donec elicitæ ſint *Unciæ vj.* Balneo maris, ſolve in liquore diſtillato

Sacchari albiſſimi pulverati . . . . . . *Uncias xij.*

Fiat Syrupus. Tum,

℞. Diſtillationis reſiduum.

Cola. Adde,

Sacchari albi . . . . *Libras iiij.*

Clarifica Albumine. Coque in Syrupum. Tandem Syrupos ſupra dictos ferè frigidos miſce, & ſerva in lagenis optimè obturatis.

Simili modo parantur SYRUPI SIMPLICES { DE PRASSIO, DE MENTHA CRISPA, DE MELISSA, &c.

SYRUPUS DE RHAMNO CATHARTICO.

℞. Succi depurati baccarum maturarum Rhamni cathartici . . . . *Pintas vj.*
Sacchari albi . . . . *Libras iiij.*

Coque in Syrupum.

SYRUPI COMPOSITI.

SYRUPUS ABSINTHITES, COMPOSITUS.

℞. Foliorum Abſinthii pontici tenui-folii *Uncias viij.*
Roſarum rubrarum . . . . *Uncias ij.*
Spicæ Indicæ . . . . *Drachmas iij.*

Mixta, inde cucurbitæ vitreæ. Adde,

Vini optimi, veteris, } *ana* . . . . *Pintas ijß.*
Succi Cydoniorum, }

Digere in cucurbitâ vitreâ, clauſâ, per viginti quatuor horas. Diſtilla igne arenæ donec elicitæ ſint circiter *Unciæ vj.* Balneo maris diſſolve, in liquore diſtillato,

Sacchari albiſſimi, ratione liquoris . . *Duplum.*

Fiat Syrupus. Tùm,

℞. Diſtillationis reſiduum.

Coque in vaſe terreo per horæ quadrantem. Cola cum expreſſione forti. Adde,

Sacchari albi . . . . *Uncias xx.*

Albumine clarifica. Igne moderato coque in Syrupum.

Tandem Syrupos refrigeratos miſce.

SYRUPUS DE ACETO CUM FRAMBŒSIIS.

℞. Frambœſiarum maturarum . . . . . . *Uncias iiij.*
Aceti acerrimi . . . . *Pintam.*

Macera per viginti quatuor horas in vaſe vitreo. Cola. Adde, ratione liquoris,

Sacchari albiſſimi. . . . . *Duplum.*

Fiat Syrupus balneo maris.

SYRUPUS DE ALTHÆA FERNELII.

℞. Radicum Althææ recentium . . . . . *Uncias ij.*
Aſparagi,
Graminis,
Liquiritiæ,
Paſſularum exacinatarum, } *ana* . . . . *Unciam ß.*
Cicerum rubrorum,
Cymarum Malvæ,
Althææ,
Parietariæ,
Foliorum Pimpinellæ minoris,
Plantaginis majoris,
Adianti nigri. } *ana* . *Unciam.*

Coque in ſufficienti quantitate Aquæ fontanæ ad *Pintas vj.* In colaturâ adde,

Sacchari albi . . . . *Libras iij.*

Albumine clarifica. Coque in Syrupum.

SYRUPUS ANTI-SCORBUTICUS.

℞. Foliorum virentium Cochleariæ,
Beccabungæ,
Naſturtii aquatici,
Radicis Raphani ruſticani, } *ana Libram.*

Flavedinis

Flavedinis Aurantiorum amarorum . . . *Uncias ij.*
Cinnamomi . . . . *Unciam ß.*

Incisa & contusa inde cucurbitæ vitreæ. Affunde statim

Vini albi generosi . . . . *Pintas iiij.*

Capitello protinùs adaptato & ritè obturato, macera per biduum. Balneo maris distilla leni calore donec elicita sit liquoris spirituosi & volatilis *Libra.* Fiat Syrupus, in vase vitreo clauso, Balneo maris, cum

Sacchari albissimi, ratione Liquoris . . *Duplo.*

Tum,

℞. Liquorem in cucurbitâ superstitem, colatum cum forti expressione, per residentiam & decantationem depuratum,
Sacchari albi . . . . *Libras ij.*

Coque in Syrupum. Tepidum priori admisce.

Syrupus de Artemisia.

℞. Radicum Iridis florentinæ,
Helenii,
Rubiæ tinctorum,
Valerianæ sylvestris,
Levistici,
Nardi indici, } *ana* . *Unciam ß.*
Cinnamomi . . . . *Unciam.*

Incisa & contusa inde cucurbitæ vitreæ. Affunde

Aquæ communis . . . . *Libras decem.*

Vase tecto, stent in digestione per viginti horas. Tum adde,

Foliorum Artemisiæ, recentium . . . . *Uncias iiij.*
Herbarum Pulegii,
Calaminthæ, } *ana* . . . . . *Uncias ij.*

Herbarum Nepetæ, Melissæ, Majoranæ, Marrubii albi, Matricariæ, *ana* . . . . . *Uncias ij.*

Seminum Anisi, Fœniculi, Dauci sylvestris, Rutæ, *ana* . . . . *Unciam ß.*

Incisa & contusa digere per duodecim horas. Adaptato capitello, distilla donec elicita sit liquoris *Pinta* in quâ dissolve leni igne

Sacchari albissimi . . . . *Libras ij.*

Fiat Syrupus. Tùm,

℞. Quod in cucurbitâ superest,

Bulliat ad *Pintas iiij.* Cola cum expressione, adde,

Sacchari albi . . . . *Libras ij.*

Clarifica. Tum adde,

Mellis despumati . . . . *Uncias xij.*

Coque in Syrupum. Frigidum priori frigido immisce.

Syrupus balsamicus de Tolu.

℞. Syrupi de Capillis Veneris, recens facti ac tepidi . . . . *Libram iß.*

Immisce paulatim

Tincturæ Balsami Tolutani . . . . *Unciam.*

Agitatione mixturam perfice. In balneo maris detine usque dùm sit exhalatus spiritus. Serva in lagenis ritè obturatis.

Syrupus de Cichorio cum Rheo.

℞. Radicum Cichorii . . . . *Uncias iij.*

Radicum Apii,
Taraxaci,
Herbæ & Florum Cichorii. } *ana . . . Unciam.*

Omnia recentia, incisa & contusa, decoque in sufficienti quantitate Aquæ communis ad *Pintas iij*: in colaturâ infunde

Rhei optimi incisi . . . . *Uncias vj.*

Bulliant leviter. Cola cum expressione. Per subsidentiam depura, & cum

Sacchari albi . . . . *Libris iiij.*

Coque in Syrupum.

Syrupus de Erysimo, Lobelii.

℞. Erysimi totius, recentis . . . . *Libras ij.*
Passularum exacinatarum,
Hordei integri,
Radicum recentium Helenii,
Tussilaginis,
Liquiritiæ rasæ & contusæ, } *ana Unc. ij.*
Herbarum Borraginis,
Cichorii,
Capillorum Veneris, } *ana . Unciam.*
Florum Borraginis,
Buglossi,
Violarum,
Anthos,
Stœchados, } *ana . . . Drachmas ij.*
Seminum Anisi . . . . *Drachmas vj.*

Incidenda incide, contundenda contunde. Coque in

Aquæ communis . . . . *Pintis vj.*

Ad medias. Cola cum expressione. Adde,

Succi Erysimi . . . . *Pintam ß.*

Sacchari albi . . . . *Libras iiß.*

Clarifica, tum adde,

Mellis deſpumati . . . . *Uncias xij.*

Coque, igne moderato, in Syrupum.

SYRUPUS HORDEATUS.

℞. Amygdalarum excorticat. dulcium . . . *Libram.*
amararum . *Uncias iij.*

Contunde in mortario marmoreo, piſtillo ligneo, ſenſim affundendo,

Decocti Hordei mundati . . . . *Libras ij.*

Cola cum expreſſione. Adde,

Sacchari albiſſimi pulverati, ratione liquoris . . . . *Duplum.*

Fiat Syrupus balneo maris; refrigerato adde,

Aquæ Naphæ . . . . *Uncias iij.*

Miſce.

SYRUPUS DE MENTHA, COMPOSITUS.

℞. Menthæ romanæ floreſcentis, recenter collectæ & inciſæ . . . . *Uncias xij.*
Cinnamomi,
Nucis Moſchatæ, contuſorum, } *ana* . *Drachmam.*
Decocti ex aliâ Menthæ quantitate, vaſe clauſo facti & valdè imprægnati . . . *Pintas iiiß.*

Digere per viginti quatuor horas in vaſe ritè clauſo. Diſtilla donec ſint elicitæ liquoris *Unciæ xij*, in quibus diſſolve leni igne

Sacchari puriſſimi, ratione liquoris . . *Duplum.*

Fiat Syrupus.

Liquorem in cucurbitâ ſuperſtitem cola cum expreſſione & ſerva, tum,

℞. Succi Cydoniorum . . . . *Uncias xxxvj.*
Rosarum rubrarum . . . . *Uncias ij.*

Digere per noctem. Mane ebullitione factâ, cola. Adde

Liquorem è distillatione superstitem,
Sacchari albi . . . . *Libras iiß.*

Clarifica. Coque in Syrupum, cum refrixerit priori etiam refrigerato immisce & serva.

SYRUPUS DE KARABE.

℞. Opii purissimi minutim incisi . . . . . *Scrupulos ij.*
Aquæ communis . . . . *Uncias xij.*

Inde vasi vitreo. Digere ad Opii solutionem. Cola cum expressione forti. Adde,

Sacchari albi . . . . *Libram.*

Clarifica. Coque in Syrupum crassioris consistentiæ. Syrupo refrigerato adde,

Spiritûs Succini . . . . *Scrupulos ij.*

Misce. Serva in lagenis accuratè obturatis.

SYRUPUS DE PÆONIA.

℞. Radicis Pæoniæ maris recentis, } *ana* . . *Uncias ij.*
Rasuræ Guajaci, }
Buxi, } *ana* . . . . *Unciam.*
Visci Quercini, }
Seminum Pæoniæ maris . . . . *Unciam ß.*
Herbarum recentium Betonicæ, } *ana* . *Unciam.*
Galegæ, }
Verbenæ, }
Hyssopi } *ana* . . *Unciam ß.*
Florum Lavandulæ, }
Anthos, } *ana.* . . . . *Drachmas ij.*
Stœchados, }
Aquæ communis . . . . *Pintas vj.*

Primò rafuras Guajaci, Buxi, cum Vifco Quercino contufo infunde. Digere per viginti quatuor horas. Bulliant donec liquoris fuperfint *Pintæ iiiß*, tum cætera fuo ordine adjice & bulliant ad medias. Cola cum expreffione, adde,

Sacchari albi . . . . *Libras iiß*

Clarifica. Coque igne lento in Syrupum.

SYRUPUS DE POMIS, SOLUTIVUS.

℞. Succi per fubfidentiam defecati Pomarum Curtipendularum, vel earum defectu Renetiarum. . . . . *Libras vß.*
Foliorum Sennæ mundatorum . . . . . *Uncias viij.*
Seminum Anifi . . . . *Drachmas vj.*
Croci . . . . *Drachmas ij.*

Digere per viginti quatuor horas. Cola cum expreffione. Adde,

Sacchari albi . . . . *Libras iij.*

Clarifica coque, igne lento, in Syrupum.

SYRUPUS DE QUINQUE RADICIBUS APERIENTIBUS.

℞. Radicum recentium Apii, Afparagi, Fœniculi, Petrofelini, Rufci, *ana. Uncias iiij.*
Aquæ communis . . . . *Pintas vj.*

Bulliant ad tertiæ partis confumptionem. Cola cum expreffione. Adde,

Sacchari albi . . . . *Libras iij.*

Clarifica. Coque in Syrupum.

Syrupus de Rosis pallidis cum Senna et Agarico.

℞. Infusionis Rosarum pallidarum clarificatæ, (vide confectionem Syrupi de Rosis pallidis) . . . . *Pintas ix.*
Foliorum Sennæ mundatorum . . . . *Uncias viij.*
Agarici electi & incisi . . . . *Uncias iiij.*
Seminum Anisi contusorum . . . . . . *Unciam ß.*
Zinziberis contusi . . . . *Drachmas ij.*

Digere per viginti quatuor horas. Cola cum expressione; residuum bulliat cum Aquæ communis *Pintis iiij*, ad medias. Colaturam priori admisce. Adde,

Sacchari albi . . . . *Libras iiij.*

Clarifica. Coque in Syrupum.

Syrupus de Symphyto.

℞. Radicis Symphyti majoris . . . . *Uncias ij.*
Foliorum Symphyti majoris, Prunellæ, } *ana* . . . *Uncias iiij.*
Plantaginis, Pimpinellæ, Centinodiæ, } *ana* . . . . . . *Uncias ij.*
Florum siccatorum Tussilaginis, Rosarum rubrarum, } *ana Unciam.*

Mundatis & incisis omnibus affunde,

Aquæ communis . . . . *Pintas vij.*

Coque leviter bulliendo. Cola cum expressione. Adde

Sacchari albi . . . . *Libras iiij.*

Clarifica. Coque in Syrupum.

Syrupus de Stœchade.

℞. Florum Stœchados arabicæ . . . . . . *Uncias iiij.*
Foliorum Thymi, Betonicæ, Calaminthæ vulgaris, Origani, } *ana. Unciam iß.*

Foliorum Salviæ,
Florum Rofmarini, } *ana* . . . . . *Unciam ß.*

Seminum Rutæ,
Pæoniæ maris,
Fœniculi, } *ana* . . . . *Drachmas iij.*

Sacchari albiffimi . . . . *Libras iij.*

Aquæ communis . . . . *Pintas vj.*

Incidenda incifa, contundenda contufa, inde (excepto Saccharo) cucurbitæ vitreæ. Digere per quatuor horas. Capitello impofito balneo maris diftilla ufque dùm prolectæ fint liquoris circiter *Unciæ xij*; tùm,

℞. Liquorem anteà diftillatum,

Radicum Zinziberis,
Calami aromatici,
Cinnamomi, } *ana* . . . *Drachmas ij.*

Digere per noctem. Cola. Adde,

Sacchari pulverati, ratione liquoris . . *Duplum.*

Fiat Syrupus balneo maris:

Aliundè,

℞. Materiàm in cucurbitâ refiduam.

Bulliat ufque dùm fuperfint liquoris *Pintæ iij*. Cola cum expreffione. Adde,

Sacchari . . . . *Reliquum.*

Clarifica. Coque in Syrupum. Tandem utrumque refrigeratum mifce, & ferva in lagenis exacte obturatis.

SYRUPUS VERMIFUGUS.

℞. Prunorum damafcenorum . . . . *Uncias viij.*

Foliorum Sennæ mundatorum . . . . . *Uncias vj.*

Seminum Contra . . . . *Uncias iij.*

Aquæ communis . . . . *Pintas iiijß.*

Coque

Coque Pruna per horæ quadrantem. Infunde cætera per viginti quatuor horas. Cola cum expreſſione. Adde,

Sacchari albi . . . . *Libram iß.*

Clarifica. Coque in Syrupum.

ECLEGMATA, extemplò paranda.

LOOCH ALBUM.

℞. Amygdalas excorticatas dulces . . . . . *Numero xvj.*
amaras . . . *Numero ij.*
Sacchari albiſſimi . . . . *Unciam.*

Contunde in mortario marmoreo, piſtillo ligneo, ſenſim affundendo,

Aquæ communis . . . . *Uncias iiij.*

Lac emulſum cola. Tùm,

℞. Gummi Tragacanthi ſubtiliſſime triti . *Grana xvj.*

Senſim, (initio guttatim,) affunde Lac amygdalinum ſuprà emulſum, identidem agitando in mortario marmoreo, ad mucilaginis ſpiſſitudinem. Sub finem adde,

Olei Amygdalarum dulcium . . . . . . *Unciam.*
Aquæ Naphæ . . . . *Drachmas ij.*

Miſce.

LOOCH EX OVO.

℞. Vitellum Ovi recentis,
Olei Amygdalarum dulcium . . . . . . *Uncias ij.*

Identidem agita, piſtillo ligneo, donec coeant in pultem; tum ſenſim adde continuè agitando,

Syrupi de Althæâ Fernelii . . . . *Unciam.*
Decocti Hordei . . . . *Uncias ij.*
Aquæ Naphæ . . . . *Drachmas ij.*

APPENDIX.

EMULSIO COMMUNIS.

℞. Amygdalarum dulcium excorticatarum, } *ana Drach. ij.*
Seminum quatuor frigidorum majorum, }
Sacchari albi . . . . *Unciam* ß.

Simul in mortario marmoreo contunde sensim affundendo,

Aquæ communis . . . . *Pintam.*

Cola fortiter exprimendo.

ARTICULUS QUINTUS.

DE ROB, CONSERVIS ET CONDITIS.

ROB seu GELATINÆ aut MIVÆ sunt succi cum Saccharo ad Mellis consistentiam cocti.

Plantarum partes cum Sacchāro coctæ, si contusæ sint & in pulpam redactæ, CONSERVÆ dicuntur, si vero integræ CONDITA nominantur.

CANON. I. Rob & Conservæ plantarum partes jam perfectas requirunt; ad Condita verò, radices juniores tempore verno evulsas, flores nondùm explicitos, fructus ante maturitatem perfectam lectos adhibe; nisi aliter præscribatur.

II. Galatinæ ritè coctæ sunt, si gutta in marmor delapsa & refrigerata glutinis consistentiam acquirat; aut si digiti Gelatinâ inquinati quasi conglutinentur.

III. Conservæ, ut plurimùm triplum Sacchari pondus, ratione Remedii, requirunt.

IV. Pulpas per cribrum setaceum inversum, convexæ partis cochlearis ope, trajice.

ROB ET GELATINÆ.

ROB ſeu GELATINA RIBIUM.

℞. Ribium maturarum, à petiolis mundatarum . . . . *Libras iiij.*

Bulliant in vaſe figulino vitreato, cum Aquæ communis tantillo. Sæpiſſimè agita, donec fructus rugas contrahant: tùm cola ſine ullâ expreſſione. Succo limpidiſſimo adde,

Sacchari albi . . . . *Libras ij.*

Coque igne ſatis valido ad conſiſtentiam Gelatinæ.

ROB SAMBUCI.

℞. Succi baccarum maturarum Sambuci optimè depurati . . . . *Libras iij.*

Bulliant in vaſe figulino igne lento ad medias, tum adde,

Sacchari albi . . . . *Uncias iiij.*

Coque in Rob conſiſtentiam.

MIVA ſeu GELATINA CYDONIORUM.

℞. Cydoniorum matureſcentium . . . . . *Libras viij.*

Abſterge cortices. Semina & eorum involucra abjice. Incide in fruſta. Affunde,

Aquæ communis . . . . *Pintas xx.*

Bulliant ad medias. Cola cum expreſſione. Adde,

Sacchari albi . . . . *Libras vj.*

Clarifica. Igne lento ad Gelatinæ conſiſtentiam coque.

Sic paratur GELATINA È POMIS, &c.

CONSERVÆ ET CONDITA.

CONSERVA ABSINTHII.

℞. Summitatum floridarum Absinthii . . . *Libram.*

Contunde in mortario marmoreo sensim addendo,

Sacchari albi pulverati . . . . *Libram.*

Tum,

℞. Sacchari albi . . . . *Libras ij.*
Aquæ communis . . . . *Quantum satis.*

Coque ad Tabellarum consistentiam. Adjice Absinthium cum Saccharo contusum. Misce. Serva in vase vitreato.

Simili modo parantur CONSERVÆ FLORUM
- ANTHOS,
- BETONICÆ,
- CALENDULÆ,
- LILII CONVALLIUM.
- PÆONIÆ,
- PRIMULÆ VERIS,
- ROSARUM RUBRARUM, exungulatarum,
- SALVIÆ,
- TUNICÆ,
- VIOLARUM, &c.

CONSERVA COCHLEARIÆ.

℞. Foliorum recentium Cochleariæ . . . . *Uncias ij.*
Sacchari Albissimi . . . . *Uncias vj.*

Simul pinsando, misce in mortario marmoreo donec conservæ formam acquisiverint.

Simili modo parantur CONSERVÆ
- ACETOSÆ,
- OXYTRIPHYLLI, &c.

CORTICES CITRI CONDITI.

℞. Corticum Malorum Citreorum recentium *Libram ß.*
Aquæ communis . . . . *Quant. suffic.*

Macera ad mollitiem. Bulliant. Cola. Cortices in vase dispone, tùm,

℞. Colaturam supra dictam,
Sacchari albi . . . . *Libram.*

Clarifica. Coque ad Syrupi spissioris consistentiam. Super Cortices coctos affunde. Post triduum decanta. Denuo coque ad debitam consistentiam; idque toties repete donec Syrupus perfectam consistentiam servet.

Eodem modo condiuntur CORTICES AURANTIORUM,
RADICES { ANGELICÆ, ENULÆ CAMPANÆ, ERYNGII, &c.

PULPA CYDONIORUM CONDITA.

℞. Cydoniorum à seminibus & eorum involucris mundatorum. . . . . *Libras vj.*

Coque ad mollitiem in Aquæ communis *sufficienti quantitate.* Per cribrum trajice. Adde,

Sacchari albi . . . . *Libras ij.*

Coque ad Conservæ consistentiam.

PULPA CYNOSBATI CONDITA.

℞. Cynosbati fructus ab arillis & lanugine mundatos . . . . *Quantum vol.*

Cum tantillo Vini rubri macera ad mollitiem in vase idoneo: contunde. Per cribrum trajice. Adde,

Sacchari albi pulverati, ratione Pulpæ. *Duplum.*

Misce.

ARTICULUS SEXTUS.

DE PULVERIBUS.

PUlveres ſunt vel ſimplices vel compoſiti. Pulveres ſimplices quære in Præparationibus. Compoſiti verò, diverſa ſimplicia ſimul unita continent & SPECIES præcipuè dicuntur dùm aliis compoſitionibus inſerviunt. In duas ſeries dividuntur, ALTERANTES nempè & PURGANTES.

CANON. I. Carioſa, exeſa, immunda, corrupta, uti & plantarum ſtipites abjice.

II. Omnia in mortario æneo, piſtillo ferreo tuſa, per cribrum ſetaceum vel ſericeum trajice; Mineralia tamen, Lapides & Terras, porphyrio leviga.

III. Gummi aliaque tritu difficilia admiſce ſiccioribus, ut poſt pulverationem per cribrum unà trajiciantur.

IV. Quæ ſeorſim ſunt pulveranda quaſdam cautiones exigunt.
Roſas, *Crocum*, & ſimilia, modicè & leni admodum calore in chartaceo ſacco ſicca.
Colocynthidem, *Euphorbium*, *Cantharides*, *Helleborum album* & ſimilia guttis aliquot Aquæ idoneæ inſperge, ne polline volatili Artifex lædatur. *Euphorbium* terendo, nares obtura.
Gummi Tragacanthum & *Arabicum* ſiccata calefacto mortario tunde.

V. Pulveres ex Aromaticis parati, exiguâ quantitate & in vaſis vitreis probè obturatis ſerventur.

PULVERES ALTERANTES.

PULVIS ARI BIRKMANNI.

℞. Radicum ſiccat. Ari . . . . *Uncias ij.*
Acori veri, } . . *Unciam.*
Pimpinellæ albæ, }

Lapidum Cancrorum præparatorum, } *ana Drach. iij.*
Cinnamomi,
Salis Abſinthii, } *ana* . . . . *Drachmam.*
Juniperi,
Sacchari albi . . . . *Unciam.*

Fiat ex omnibus Pulvis.

PULVIS ARTHRITICUS AMARUS.

℞. Radicum Gentianæ,
Centaurii majoris,
Ariſtolochiæ rotundæ,
Foliorum Chamædryos,
Chamæpityos,
Summitatum Centaurii minoris, } *ana* . *Partes æquales.*

Fiat ex omnibus Pulvis.

PULVIS CACHECTICUS.

℞. Croci Martis aperientis . . . . *Unciam.*
Cinnamomi acuti . . . . *Drachmas ij.*
Sacchari albi . . . . *Uncias iij.*

Fiat ex omnibus Pulvis.

PULVIS COMITISSÆ DE KENTH.

℞. Chelarum Cancrorum præparatorum . *Uncias iij.*
Oculorum Cancrorum fluviatilium,
Coralli rubri,
Succini albi præparati,
Cornu Cervi philoſophicè præparati, } *ana Unciam.*
Viperarum ſiccatarum,
Margaritarum præparatarum,
Lapidis Bezoardici orientalis, } *ana* . . *Unciam ß.*

Fiat ex omnibus Pulvis.

PULVIS DE GUTTETA.

℞. Radicum Pæoniæ maris, } ana. . . . . Unciam ß.
Dictamni albi,
Seminum Pæoniæ maris,
Viſci quercini,
Ungulæ Alcis,
Seminum Atriplicis ſativæ . . . . Drachmas ij.
Cranii humani radulâ abraſi . . . . . Drachmas iij.
Coralli rubri præparati, } ana Drach. iß.
Succini præparati,
Cornu Cervi abraſi, non præparati,

Fiat ex omnibus Pulvis.

PULVIS HALY.

℞. Seminum Papaveris albi . . . . Scrupulos v.
Quatuor frigidorum majorum, } ana . Scrupul. iiiß.
Cydoniorum,
Portulacæ, } ana . Drachmam ß.
Althææ,
Malvæ,
Gummi Tragacanthi,
Arabici,
Amyli,
Oculorum Cancrorum præparatorum,
Liquiritiæ raſæ,
Sacchari albi . . . . Drachmas x.

Fiat ex omnibus Pulvis, extemplò parandus.

PULVIS STOMACHICUS.

℞. Radicum Angelicæ, } ana . . . . Unciam ß.
Foliorum Menthæ criſpæ,
Cinnamomi,

Macis

Macis . . . . *Drachmas ij.*
Balauſtiorum, } *ana* . . . . *Scrupulos ij.*
Piperis longi, }
Sacchari albi . . . . *Uncias ij.*

Fiat ex omnibus Pulvis.

PULVIS STERNUTATORIUS.

℞. Foliorum Majoranæ, } *ana* . . . . . . *Drachmam iß.*
Salviæ, }
Betonicæ, }
Pulegii, } *ana* . . . . *Drachmam ß.*
Florum Lilii convallium, }
Radicum Pyrethri, }
Hellebori albi, }

Fiat ex omnibus Pulvis.

PULVIS TEMPERANS, STAHLI.

℞. Tartari vitriolati, } *ana* . . . . *Drachmas iij.*
Nitri puriſſimi, }
Cinnabaris factitiæ præparatæ . . . . . *Scrupulos ij.*

Fiat ex omnibus Pulvis.

PULVERES PURGANTES.

CARYOCOSTINUM.

℞. Caryophyllorum, } *ana* . . . . *Drachmas ij.*
Coſti arabici, }
Zinziberis, }
Cumini, }
Hermodactylorum, } *ana* . . . . *Unciam ß.*
Scammonii. }

Fiat ex omnibus Pulvis.

PULVIS DE TRIBUS, CORNACHINI.

℞. Antimonii diaphoretici,
Cremoris Tartari,
Scammonii, } *ana* . . . . . *Partes æquales.*

Fiat ex omnibus Pulvis.

SPECIES DIACARTHAMI.

℞. Medullæ ſeminum Carthami,
Hermodactylorum, } *ana* . . *Unciam.*
Turbith electi . . . . *Unciam iß.*
Scammonii . . . . *Drachmas vj.*
Radicum Liquiritiæ raſæ,
Zinziberis, } *ana* . . . . *Unciam ß.*
Sacchari albiſſimi . . . . *Uncias ij.*

Fiat ex omnibus Pulvis.

SPECIES HIERÆ-PICRÆ, GALENI.

℞. Cinnamomi,
Ligni Aloës,
Radicum Aſari
Spicæ Nardi,
Maſtiches,
Croci vaſtinienſis, } *ana* . . . . *Drachmam.*
Aloës lucidæ . . . . { *Uncias ij. &* *Scrupulos ij.* }

Fiat ex omnibus Pulvis.

PULVIS HYDRAGOGUS.

℞. Cremoris Tartari . . . . *Unciam.*
Radicum Jalappæ,
Turbith,
Mechoacannæ,
Hermodactylorum,
Scammonii. } *ana* . . . . *Drachmas ij.*

Fiat ex omnibus Pulvis.

PULVIS VERMIFUGUS.

℞. Corallinæ levigatæ,
Seminum Contra,
Abſinthii majoris,
Tanaceti
Foliorum Scordii,
Sennæ,
Rhei electi,
Radicum Filicis maris,
} *ana . . . Partes æquales.*

Fiat ex omnibus Pulvis, quotannis renovandus.

ARTICULUS SEPTIMUS.

DE TROCHISCIS.

TROCHISCI inter Pulverum & Tabellarum claſſes medium videntur tenere locum; ſunt enim medicamenta ſicca pleraque ex Pulveribus, Pulpæ vel Mucilaginis ope, in *Orbiculos*, ſeu *Placentulas*, aut *parvos Panes* efformata.

Trochiſci ad fumigationes PASTILLI nuncupantur.

CANON. I. Pulverum Canones huc refer.

II. Ut ritè ſiccentur Trochiſci, imponantur cribro inverſo, in loco umbroſo, libero & perflabili, & ſæpiùs verſentur.

III. Trochiſcos in vaſis vitreis ſiccè ſerva.

TROCHISCI ALBI, RHASIS.

℞. Ceruſſæ venetæ Aquâ Roſarum lotæ . *Drachmas x.*
Sarcocollæ . . . . *Drachmas iij.*
Amyli . . . . *Drachmas ij.*
Gummi Arabici,
Tragacanthi, } *ana* . . . . *Drachmam.*
Camphoræ . . . . *Drachmam ß.*

Fiat ex omnibus Pulvis. Et cum Albumine ex Aquâ Rosarum quassato Trochiscos finge.

TROCHISCI BECHICI NIGRI.

℞. Radicum recentium Tussilaginis . . . . *Libram.*
Aquæ communis . . . . *Pintas xvj.*

Coque. Cola. Adde,

Extracti Glycyrrhizæ incisæ . . . . . . *Libras xij.*

Glycyrrhizâ solutâ, cola iterum. Evaporationem perge ad Extracti solidi consistentiam. Demùm adde,

Olei essentialis Anisi . . . . *Unciam.*

Trochiscos finge oblongos.

TROCHISCI DE CATECHU.

℞. Catechu purificati . . . . *Unciam ß.*
Sacchari albi . . . . *Unciam iß.*
Caryophyllorum . . . . *Scrupulum.*
Mucilaginis Gummi Tragacanthi in Aquâ Rosarum soluti . . . . *Quant. satis.*

Formentur Trochisci.

NOTA. Adde, si lubet, guttas aliquot Olei essentialis Cinnamomi, Corticum Citri, vel Tincturæ Ambari.

TROCHISCI ESCHARROTICI DE MINIO.

℞. Minii . . . . *Unciam ß.*
Mercurii sublimati corrosivi . . . . . *Unciam.*
Micæ Panis exsiccati pulveratæ . . . . *Uncias iiij.*
Aquæ Rosarum . . . . *Suffic. quantit.*

In mortario marmoreo, pistillo ligneo pinsa. Trochiscos finge oblongos.

TOCHISCI SCILLITICI.

℞. Scillæ coctæ . . . . *Uncias xij.*
Radicum Dictamni albi pulveratarum . *Libram ß.*

In massam redige. Fiant Trochisci.

PASTILLI.

℞.	Carbonum Salicis	*Libram.*
	Styracis calamitæ	*Uncias ij.*
	Benzoïni	*Unciam.*
	Caryophyllorum	*Unciam ß.*
	Labdani	*Drachmas vj.*

Fiat ex omnibus Pulvis, & cum ſufficienti quantitate Mucilaginis Gummi Tragacanti Aquâ Roſarum extractæ fiant Paſtilli ſeu *Baccilli pyramidati.*

ARTICULUS OCTAVUS.

DE ELECTUARIIS.

ELECTUARIA vel ELECTARIA è Medicamentis electis conficiuntur, duplicis ſunt generis, ſolida nempè, & mollioris conſiſtentiæ.

PARAGRAPHUS PRIMUS.

DE ELECTUARIIS SOLIDIS.

Electuaria ſolida vel Paſtæ ſunt, vel Tabellæ. TABELLÆ ſiccæ, duræ, ſolidæ, in *morſulos* variæ figuræ formatæ, ſigillo ut plurimùm notantur. PASTÆ autem conſiſtentiam non itâ duram aut ſiccam obtinent, ſed in maſſam ſpiſſam & ſectilem parantur.

CANON. I. Ea quæ de Pulveribus dicta ſunt, Canonem quartum Articuli quinti, & Canones ſecundum & tertium Paragraphi ſequentis, conſule.

II. Sacchari ad Tabellarum conſiſtentiam coctionem peractam cognoſces, ſi in Saccharo Spumatorium immerſum dein remotum & ſufflatum, floccos exhibeat.

III. Tabellas ut efformes, maſſam calentem, liquidam, ſupra marmor Oleo perfuſum diſtribue; vel ſupra chartam Oleo imbutam, aut tabellam Amylo vel Saccharo pulverato aſperſam, cylindro ligneo extende.

IV. Tabellas in hypocauſto ſicca. In loco ſicco & in thecis aptè obturatis ſerva.

PASTÆ ET TABELLÆ.

PASTA DE ALTHÆA.

℞. Radicis Althææ recentis in taleolas diſſectæ *Uncias iiij.*

Bulliant in Aquæ fontanæ *Pintis vj*, ad dimidiæ partis conſumptionem, in colaturâ ſolve,

Gummi ſenegalenſis albiſſimi, Sacchari albiſſimi,	*ana* . .	*Libras ij.*

Cola. Vaporet igne lento ad Extracti ſpiſſitudinem, aſſidue ſpathulâ movendo. Ab igne remove: agita multùm & celeriter ut albus color concilietur. Tunc inſperge identidem Albumina ſex Ovorum recentium, in ſpumam redacta cum Aquæ Naphæ odoratiſſimæ *Unciâ ß*, maſſam inſpiſſa lento calore, agitatione perpetuâ, uſque dùm manui admota non adhæreat. Tandem Paſtam Amyli pulvere inſperſam ſerva.

TABELLÆ DE ALTHÆA.

℞. Pulpæ radicum Althææ coctarum. . . . *Uncias iij.*
Sacchari albi pulverati . . . . *Quantum ſatis.*

Fiat maſſa in Tabellas efformanda.

TABELLÆ BECHICÆ.

℞. Sacchari albiſſimi		*Libras iij.*
Ireos florentinæ, Gummi arabici,	*ana*	*Unciam.*
Glycyrrhizæ		*Unciam iß.*

Fiat ex omnibus Pulvis & cum Mucagine Gummi Tragacanthi in Aquâ Naphæ ſoluti ſubige in maſſam è quâ formentur Tabellæ.

TABELLÆ DE MANNA, *extemporè parandæ.*

℞. Mannæ electæ . . . . *Unciam.*

Sacchari albi in Aquâ ſoluti & ad Tabellarum conſiſtentiam cocti *Uncias iij*, in ſaccharo adhuc calenti liquetur Manna, & datâ ebullitione alterâ fiant Tabellæ.

TABELLÆ MARTIALES *D. Deſſault.*

℞. Croci Martis rore majali parati,
Coralli rubri,
Oculorum Cancrorum,
Millepedum præparatorum,
Benzoïni amygdaloïdes, } *ana. Unciam ß.*
Cinnamomi pulverati . . . . *Drachmas iij.*
Sacchari albiſſimi . . . . *Uncias viij.*

Miſce cum ſufficienti quantitate Gummi Tragacanthi in Aquâ ſoluti. Subige in maſſam è quâ formentur Tabellæ ponderis *Drachmarum ij.*

TABELLÆ DE SULPHURE, SIMPLICES.

℞. Florum Sulphuris . . . . *Drachmas iiij.*
Sacchari albi . . . . *Uncias iiij.*

Saccharo in Aquâ Roſarum ſoluto & ad Tabellarum conſiſtentiam cocto Flores Sulphuris admiſce. Ex maſſâ ſubactâ Tabellas finge.

TABELLÆ DIASULPHURIS.

℞. Florum Sulphuris . . . . *Unciam iß.*
Benzoïni . . . . *Scrupulum.*
Radicum Enulæ campanæ,
Liquiritiæ,
Amyli, } *ana* . . . *Drachmas iij.*
Ireos florentinæ pulveratorum . . . . . *Drachmam.*
Sacchari albiſſimi . . . . *Uncias xij.*

Fiat ex omnibus Pulvis & cum sufficienti quantitate Mucaginis Gummi Tragacanthi, fiat massa è quâ formentur Tabellæ.

TABELLÆ ANTIMONIALES.

℞. Amygdalarum dulcium . . . . *Unciam.*
Cinnamomi acuti . . . . *Drachmas ij.*
Cardamomi minoris . . . . *Drachmam ß.*
Antimonii crudi præparati . . . . *Unciam ß.*
Sacchari albi . . . . *Uncias vij.*

Fiat ex omnibus pulvis, & cum sufficienti quantitate Mucaginis Gummi Tragacanthi in Aquâ Rosarum soluti fiat massa è quâ formentur Tabellæ ponderis *Drachmarum ij.*

TROCHISCI SEDANTES.

℞. Capitum Papaveris albi siccatorum, minutim incisorum, rejectis seminibus . *Unciam iß.*
Florum Tussilaginis siccatorum . . . . *Unciam.*
Hordei mundati . . . . *Unciam ß.*

Coque in Aquæ communis *Pintis v*, ad *Pintas iij*, Cola. In colaturâ solve,

Extracti Glycyrrhizæ, }
Gummi Tragacanthi, } *ana* . . . . . . *Uncias v.*
Sacchari albi, }

Cola iterum. Vaporationem perge ad Extracti solidi consistentiam; & Trochiscos finge.

PARAGRAPHUS SECUNDUS.

DE ELECTUARIIS MOLLIORIS CONSISTENTIÆ.

ELECTUARIA ad Mellis consistentiam parata, ANTIDOTA dicuntur si contra venena sint composita, CONFECTIONES quæ modo perfectiori confecta creduntur. OPIATA cum Opio parata olim dicebantur; hodie Electuaris omnibus *Opiatæ* nomen impropriè datur.

CANON.



M. Debacq
pharmacien
à Clichy
(Seine)

CANON. I. Quæ de Decoctis & Pulveribus parandis dicta ſunt, ad Electuaria quoque pertinent.

II. Gummi, ſuccos ſpiſſatos, aliaque pulveratu difficilia, in parcâ quantitate idonei liquoris ſolve.

III. Ut Tabellarum & Electuarii miſtura ſit æquabilis & uniformis, ſtrenuè materiam agita, & identidem paulatim Pulveres per cribrum trajiciendos adjice.

IV. Electuaria aſtringentia, ut ea quæ pulpas fructuum recipiunt, parcâ quantitate aſſerva. Pulparum humiditas ſuperflua leni igne vaporet ante miſturam.

V. In Electuariis parandis ſæpiſſime ſtriplum Mellis ratione Pulveris, adhibetur.

VI. Electuariiia, Opiata præſertim & Antidota, ſi areſcant, Vino Canarino vel Hydromelite emolliantur, ut in priſtinam reducantur conſiſtentiam.

ELECTUARIA SOLUTIVA.

CASSIA COCTA.

℞. Pulpæ Caſſiæ . . . . *Libram ß.*
Syrupi Violacei . . . . *Uncias iiij.*

Coque balneo maris ad Mellis conſiſtentiam. Refrigeratam ſerva.

DIACATHOLICUM AD ENEMATA.

℞. Foliorum Malvæ . . . . *Uncias ij.*
Florum Chamæmeli . . . . *Unciam iß.*
Radicum Bryoniæ . . . . *Uncias v.*
Polypodii . . . . *Uncias iiij.*

Coque in ſufficienti quantitate Aquæ communis. Cola. Adde, Mellis crudi *Libras viiß.* Cola iterum. Ad conſiſtentiam ſpiſſam coque. Adde,

Pulpæ Prunorum . . . . *Libram iß.*
Foliorum Sennæ pulveratorum . . . . *Uncias x.*
Seminum Aniſi pulveratorum . . . . . *Uncias ij.*
Fœniculi pulveratorum . . . *Unciam.*

Fiat Electuarium.

DIACATHOLICUM CUM RHEO.

℞. Radicum Polypodii querni recentium & contusarum . . . . *Uncias viij.*

Bulliant in Aquæ fontanæ *Pintis vj*, ad medias, in Decocto colato & expresso solve,

Sacchari albi . . . . *Libras iij.*

Coque in Syrupum spissum. Admisce,

Pulparum Cassiæ,
Tamarindorum, adjectâ superioris Decocti portiunculâ extractarum & probè evaporatarum, } *ana Unc. v.*

Dilutis, adde sequentia pulverata,

Foliorum Sennæ . . . . *Uncias iiij.*
Mechoacannæ,
Rhei electi, } *ana* . . . . *Uncias ij.*
Liquiritiæ rasæ . . . . *Unciam.*
Seminum Anisi
Fœniculi dulcis, } *ana.* . . . . *Unciam ß.*
Cinnamomi . . . . *Drachmas ij.*

Fiat Electuarium.

DIAPHŒNICUM.

℞. Pulpæ Dactylorum in Aceto maceratorum, ritè evaporatæ . . . . *Uncias xij.*
Mellis optimi depurati . . . . *Libram iß.*

Permixtis, adde Pulveres sequentes,

Turbith electi . . . . *Uncias iiij.*
Amygdalarum dulcium excorticatarum . *Uncias ij.*
Scammonii . . . . *Unciam iß.*

Santali citrini,
Radicum Galangæ,
Zinziberis,
Foliorum Rutæ ſiccatorum,
Piperis longi,
Cinnamomi acuti,
Macis,
Seminum Aniſi,
Fœniculi dulcis,
Dauci noſtratis, } *ana . . . Drachmas ij.*

Fiat Electuarium.

CONFECTIO HAMECH.

℞. Myrobalanorum citrinarum . . . . . . *Uncias iiij.*
chebularum,
indarum,
Radicum Polypodii recentium,
Pulpæ Colocynthidis inciſæ, } *ana . Uncias iij.*
Abſinthii vulgaris,
Thymi, } *ana . . . . Unciam.*
Roſarum rubrarum . . . . *Unciam ß.*
Foliorum Sennæ mundatorum,
Agarici albi & levis,
Rhei electi,
Epithymi, } *ana . Uncias ij.*
Seri Lactis præparati . . . . *Quantum ſatis.*

Bulliant & coquantur ſuo ordine. Cola cum expreſſione. Adde,

Succi Fumariæ depurati . . . . *Pintam iß.*
Sacchari albi,
Mellis deſpumati, } *ana . . . . Libram iß.*

Coque ad Mellis conſiſtentiam. Cola iterum. Adde,

Pulparum ritè evaporatarum Prunorum,
Caſſiæ, } *ana Unc. iiij.*

Pulparum ritè evaporatarum Uvarum passarum, Tamarindorum, } *ana. Unc.iiij.*

Mannæ electæ purissimæ . . . . *Uncias iij.*

Dilutis, adde sequentia pulverata,

Foliorum Sennæ mundatorum . . . . . *Uncias iij.*

Agarici albissimi, Rhei electi, Scammoni, } *ana* . . . . *Unciam iß.*

Cinnamomi . . . . *Unciam ß.*

Zinziberis . . . . *Drachmas iij.*

Seminum Fumariæ, Fœniculi, Anisi, Spicæ Nardi indicæ, } *ana* . . . . *Unciam ß.*

Fiat Electuarium.

Electuarium Hieræ-picræ, Galeni.

℞. Specierum Hieræ-picræ . . . . *Quantum vol.*

Cum Mellis despumati *triplo* fiat Electuarium.

Electuarium lenitivum.

℞. Foliorum Sennæ . . . . *Uncias iiij.*

Glycyrrhizæ . . . . *Uncias ij.*

Seminum Coriandri. . . . . *Unciam.*

Aquæ bullientis . . . . *Pintas iij.*

Digere per noctem in vase clauso. Cola cum expressione. Adde,

Sacchari albi . . . . *Libras iiß.*

Coque ad Syrupi consistentiam. Adde,

Pulparum rite evaporatarum Prunorum, *Uncias xij.*

Cassiæ, Tamarind. } *ana Uncias vj.*

Fiat Electuarium.

ANTIDOTA, CONFECTIONES ET OPIATÆ.

DIASCORDIUM, FRACASTORIS.

℞. Foliorum Scordii recenter ſiccatorum, } ana Unciam.
Roſarum rubrarum exungulatarum, }
Boli armenæ . . . . Uncias ij.
Radicum Biſtortæ }
Gentianæ, }
Tormentillæ, }
Caſſiæ ligneæ, }
Cinnamomi, }
Dictamni cretici, } ana . . Unciam ß.
Seminum Acetoſæ, }
Styracis calamitæ, }
Gummi Arabici ſplendentis, }
Galbani puri, }
Opii nitidi, }
Zinziberis, } ana . . . . Drachmas ij.
Piperis longi, }
Omnia pulverata miſceantur cum,
Mellis deſpumati . . . . Libris ij.
Fiat Electuarium.

THERIACA, ANDROMACHI.

℞. Trochiſcorum ſcilliticorum . . . . . . Uncias vj.
Carnis viperinæ, probè exſiccatæ, }
Piperis longi, } ana. Uncias iij.
Opii nitidi, }
Opobalſami, }
Cinnamomi acuti, } ana . . . . Drachm. xiij.
Roſarum rubrarum, }
Iridis florentinæ, }
Succi Glycyrrhiſæ condenſati, } ana . Unciam iß.
Seminum Buniadis, }
Cimarum Scordii, }
Agarici albi & levis, }

Myrrhæ Trogloditicæ, } *ana* . *Unciam.*
Croci,
Seminum Cardamomi minoris,
Caſſiæ ligneæ,
Spicæ Nardi indicæ,

Junci odorati, } *ana* . . . . *Drachmas vij.*
Coſti arabici,

Radicum Valerianæ hortenſis, } *ana.* . . *Drachmas. vj.*
Acori veri,

Gentianæ, } *ana* . *Unciam* ß.
Mei Athamantici,
Spicæ Nardi celticæ,
Polii montani,
Cimarum Chamædryos,
Chamæpithyos,
Hyperici
Baccarum Juniperi,
Seminum Ammeos,
Aniſi,
Fœniculi,
Seſeleos maſſilienſis,
Thlaſpios,
Terræ Lemniæ,
Chalcitidis factitiæ,
Succi Acaciæ veræ,
Hypociſtidis,
Styracis calamitæ,
Gummi Arabici,
Sagapeni,

Thuris maſculi, } *ana* . *Drachmas vj.*
Piperis nigri,
Foliorum Dictamni cretici,
Calaminthæ vulgaris,
Praſſii albi,
Malabathri,

Stœchados arabicæ, } *ana* . . . . . . *Drachmas vj.*
Radicum Pentaphylli,

Radicum Rhapontici,
Zinziberis,
Seminum Petroſelini macedonici,
Terebinthinæ chiæ, } *ana* . *Drachmas. vj.*

Ligni Aloës,
Corticum ligni Saſſafras,
Foliorum Majoranæ,
Mari veri,
Radicum Aſari,
Maſtiches, } *ana* . . . . *Drachmam.*

Radicum Ariſtolochiæ tenuis,
Summitatum Centaurii minoris,
Seminum Dauci cretici,
Galbani puri,
Opopanacis,
Bituminis judaïci,
Caſtorei, } *ana* . *Drachmas ij.*

Mellis optimi deſpumati . . . . *Libras xß.*

Omnia, exceptis Terebinthinâ, Opobalſamo & Chalcitide, in tenuiſſimum pulverem redigantur & cum Melle miſceantur: ſub finem adde Chalcitidem in pauco Vini ſolutam, Terebinthinam & Opobalſamum. Miſce, fiat Electuarium.

CONFECTIO ALKERMES.

℞. Santali citrini . . . . *Unciam.*
Cinnamomi . . . . *Unciam iß.*
Coſti arabici,
Vanillæ,
Coccinellæ, } *ana* . . . . *Drachmam iß.*
Radicis Galangæ minoris,
Seminum Cardamomi minoris,
Macis, } *ana* . . *Drachmam ß.*

Omnia pulverata miſceantur cum,

Syrupi Kermeſini . . . . *Librâ.*

Fiat Electuarium cui admiſce,

Foliorum Auri . . . . *Scrupulum.*

CONFECTIO HYACINTHINA.

℞. Hyacinthorum præparatorum, } ana . . *Drachmas ij.*
Terræ Catechu ,
Coralli rubri præparati, } ana . . . *Unciam.*
Boli Armenæ ,
Santali citrini ,
Cinnamomi ,
Radicum Tormentillæ , } ana . . . *Unciam ß.*
Contrayervæ ,
Angelicæ ,
Foliorum Dictamni ,
Rosarum rubrarum ,
Croci ,
Myrrhæ Trogloditicæ ,
Caryophyllorum aromaticorum . . . . *Drachmam.*

Omnia pulverata misceantur cum ,

Syrupi de floribus Tunicæ , ... *Librâ.*
Mellis narbonensis . . . . *Unciis ij.*

Fiat Electuarium. Cui admisce ,

Foliorum Argenti . . . . *Scrupulos ij.*

DENTIFRICIUM.

℞. Lapidis Pumicis , } ana . . . . *Unciam ß.*
Aluminis usti ,
Oculorum Cancrorum ,
Coccinellæ ,
Sanguinis Draconis ,
Ireos florentinæ ,
Cremoris Tartari , ... *Unciam.*

Omnia pulverata subtiliter misce cum ,

Mellis narbonensis . . . . *Suffic. quantit.*

Electuario probè facto adde odoris gratiâ ,

Olei

Olei eſſentialis Caryophyllorum . . . *Scrupulos ij.*

Miſce.

ARTICULUS NONUS.

DE PILULIS.

PILULÆ ſeu PARVÆ PILÆ, aut CATAPOTIA Electuariis duriores, ſufficientem requirunt conſiſtentiam, ut poſſint pro Medici præſcripto in ſpherulas efformari.

CANON. I. Canones pro parandis Pulveribus datos conſule.

II. Gummi & ſuccos ſpiſſatos liquore idoneo priùs emollias. Pulveres ſenſim injice, maſſam ſtrenuè tundendo ut æquabilis evadat.

III. Ne Pilularum maſſæ glutinoſiores digitis adhæreant, pulvere Glycyrrhizæ aſpergantur, vel digitis Oleo amygdalino imbutis tractentur.

IV. Maſſas Pilularum in veſicis Oleo oblitis, ſerva.

PILULÆ ALUMINOSÆ.

℞. Aluminis rupei . . . . *Uncias iiij.*
Sanguinis Draconis . . . . *Drachmas ij.*

Omnia tenuiſſime pulverata miſce cum,

Mucaginis Tragacanthi . . . . *Suffic. quantit.*

Fiant Pilulæ *xij* ex quâque *Drachmâ.*

PILULÆ BALSAMICÆ, MORTONI.

℞. Millepedum præparatorum . . . . . . *Drachmas vj.*
Gummi Ammoniaci electi . . . . *Drachmas iij.*
Florum Benzoïni . . . . *Drachmas ij.*
Croci optimi,
Balſami peruviani ſicci, } *ana* . . . . . *Scrupulum.*
Balſami Sulphuris aniſati . . . . *Suffic. quantit.*

Fiat maſſa pilularis ſecundum Canones.

PILULÆ BALSAMICÆ, STAHLI.

℞. Gummi Hederæ, } Juniperi, electorum, } *ana* . . *Uncias iiß.*
Myrrhæ electæ, } Aloës foccotrinæ, } *ana* . . . . *Uncias ij.*
Extracti Abfinthii, } Menyanthes, } Cardui benedicti, } *ana* . . . { *Unciam & Drac. vij.*
Fumariæ, } Hellebori nigri, } Rhei, } *ana* . . . . *Drachmas v.*
Terebinthinæ . . . . *Unciam.*

Fiant Pilulæ ponderis *unius Grani.*

PILULÆ BENEDICTÆ, FULLERI.

℞. Aloës lucidæ . . . . *Unciam ß.*
Affæ fetidæ, } Galbani, } Myrrhæ, } *ana* . . . . *Drachmam.*
Foliorum Sennæ . . . . *Drachmas ij.*
Salis Martis . . . . *Drachmas vj.*
Croci, } Macis, } *ana* . . . . *Drachmam ß.*
Olei Succini . . . . *Guttas xxxx.*
Syrupi de Artemifiâ . . . . *Suffic. quantit.*

Fiat maffa pilularis.

PILULÆ COCCIÆ, RHASIS.

℞. Aloës foccotrinæ, } Scammonii, } *ana* . . . . *Uncias ij.*
Fructus Colocynthidis . . . . *Unciam.*
Olei Caryophyllorum aromaticorum . . *Drachmas ij.*
Syrupi de Rhamno cathartico . . . . *Suffic. quantit.*

Fiat maffa pilularis.

PILULÆ DE CYNOGLOSSO.

℞. Corticis radicum Cynoglossi siccati, Opii thebaïci, Seminum Hyosciami albi,	*ana Unciam ß.*
Myrrhæ electæ	*Drachmas vj.*
Thuris masculi	*Drachmas v.*
Croci, Styracis calamitæ, *ana*	*Drachmas ij.*
Caryophyllorum aromatic. Castorei, *ana*	*Drachmam.*
Mellis rosati	*Suffic. quantit.*

Fiat massa pilularis.

PILULÆ HYSTERICÆ.

℞. Gummi Ammoniaci, Galbani, Sagapeni, *ana*	*Unciam ß.*
Myrrhæ, Assæ fetidæ, Castorei, *ana*	*Drachmas iij.*
Gummi Opopanacis	*Unciam.*
Olei Succini	*Scrupulum.*
Theriacæ	*Suffic. quantit.*

Fiat massa, secundum Canones.

PILULÆ MERCURIALES.

℞. Mercurii è Cinnabari redivivi, Scammonii, Jalappæ, *ana.*	*Unciam.*
Cremoris Tartari	*Unciam ß.*
Syrupi de Capillis Veneris	*Suffic. quantit.*

Mercurium perfecte extingue in mortario marmoreo cum Cremore Tartari & pauco Vini. Dein adde paulatim cætera pulverata, cum Syrupo. Fiat massa exactè miscendo, diù & fortiter tundendo.

PILULÆ RUFFI.

℞. Aloës lucidæ	*Uncias ij.*
Myrrhæ	*Unciam.*
Croci	*Unciam ß.*

Seorsim pulvera, & cum sufficienti quantitate Vini generosi massam forma pilularem.

PILULÆ SAPONACEÆ.

℞. Saponis albi optimi	*Uncias iiij.*
Liquiritiæ pulveratæ	*Unciam ß.*

Fiat massa, addendo, si opus sit, aliquantulum Syrupi de Althæâ.

PILULÆ SCILLITICÆ.

℞. Scillæ recentis, Gummi Ammoniaci electi, Millepedum, } *ana*	*Unciam* :
Saponis albi purissimi	*Unciam.*
Balsami de Copaïbâ	*Suffic. quantit.*

Fiat massa, secundùm Canones.

PILULÆ STOMACHICÆ.

℞. Aloës optimæ	*Drachmas vj.*
Mastiches, Rosarum rubrarum, } *ana*	*Drachmas ij.*
Syrupi absinthites	*Suffic. quantit.*

Fiat massa pilularis.

PILULÆ TARTAREÆ, BONTII.

℞. Aloës lucidæ . . . . *Drachmas iij.*
Tartari vitriolati . . . . *Drachmam ß.*
Gummi Ammoniaci . . . . *Unciam iß.*
Aceti ſcillitici . . . . *Suffic. quantit.*

Fiat maſſâ, ſecundùm Canones.

PILULÆ TEREBINTHINATÆ.

℞. Succi Liquiritiæ,
Rhei,
Maſtiches,
Boli Armenæ,
Olibani,
Succini præparati,
Oſſis Sæpiæ,
} *ana* . . . . *Drachmas ij.*
Terebinthinæ chiæ . . . . *Quant. ſuffic.*

Fiat maſſa pilularis.

ARTICULUS DECIMUS.

DE OLEIS, BALSAMIS, UNGUENTIS ET EMPLASTRIS.

OMnia hujus Articuli Remedia pinguia ſunt, & conſiſtentiâ aut nomine tenùs diſcrepant. Ex Oleo, Cerâ, Butyro, Adipe, Axungiâ aut Sebo, Reſinis, &c. conficiuntur. Omiſſis Oleis & Balſamis naturalibus quæ in primâ Pharmacopœæ parte recenſentur, de artificialibus Galenicis ſolum acturi ſumus.

OLEA SIMPLICIA è ſeminibus emulſivis, & præſertim *Olivis* contuſis preloque expoſitis eliciuntur. OLEA verò COMPOSITA infuſione aut decoctione parantur.

BALSAMA ſunt Olea virtute balſamicâ impraegnata.

LINIMENTA litui inſerviunt, conſiſtentiam inter Balſama & Unguenta mediam expoſcunt.

UNGUENTA ab ungendo dicta, Linimentis ſpiſſiora, Ceratis molliora ſunt.

CERATA è Cerâ facta mediam inter Unguenta & Emplaſtra conſiſtentiam deſiderant.

EMPLASTRA, magis ſolida & dura, in *Magdaleones* ſeu cylindros efformantur.

SPARADRAPA ſunt telæ Emplaſtro ex utrâque ſuperficie illitæ.

CEREI vernaculè *Bougies* ſunt ſparadrapa ad urethræ morbos accommodata & in teretem formam torſa.

Huc referri poſſunt CATAPLASMATA & SINAPISMI, Remedia topica Emplaſtrorum modo applicanda.

CANON. I. Olea per expreſſionem torculari exprime, & quantum fieri poteſt ſine igne.

II. Quoad Decocta & Infuſiones, pulverationes & Pulverum incorporationes, vide, ſuis locis, Canones hùc pertinentes.

III. Pro Unciâ Olei, Ceræ Semi-drachmam ad Linimentum dabis; Drachmas duas ad Unguentum.

IIII. Cùm Emplaſtra & Unguenta pleraque, Aquæ communis admiſtionem poſtulent, ad humiditatis conſumptionem ea igne lento coque.

V. Plumbi præparationes cum oleoſis & pinguibus coque primò: ſub finem Gummi & Pulveres immiſce.

VI. Emplaſtra & Unguenta cocta, piſtillo ligneo, vel ſpathulâ agita donec refrixerint.

VII. Manibus Aquâ madidis vel Oleo illitis, Emplaſtra frigore nondum indurata, in magdaleones redige.

PARAGRAPHUS PRIMUS.

DE OLEIS ET BALSAMIS.

OLEA PER EXPRESSIONEM.

OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

℞. Amygdalarum dulcium ſiccatarum non rancidarum . . . . *Quantùm vis.*

Tunde in mortario marmoreo, piſtillo ligneo. Sacco cannabino aut cilicio include. Torculari fortiter exprime. Oleum ſerva in vaſe idoneo.

Simili modo eliciuntur OLEA AMYGDALARUM AMARARUM,
Seminum PAPAVERIS ALBI,
LINI,
HYOSCIAMI,
CANNABIS, &c.

OLEUM ANISI.

℞. Seminum Aniſi mundatorum & aptè contuſorum . . . . *Quantum vis.*

Supra cribrum inverſum extende. Cooperta vapori Aquæ ferventis per horæ ſemiquadrantem expone ut penitùs humeſcant. Sacco denſo include. Prelo calido promptè ac fortiter exprime.

Simili modo eliciuntur OLEA ſeminum { ANETHI, CUMINI, CARVI, FŒNICULI, NUCIS MOSCHATÆ, &c.

OLEUM seu BUTYRUM CACAO.

℞. Fructuum Cacao . . . . *Quantum vol.*

Leviter in sartagine ferrea torrefactos & à cortice mundatos, in mortario ferreo calido contunde. Tum in sufficienti quantitate Aquæ communis bulliant donec Oleum supernatet. Aquâ refrigeratâ, Oleum concretum collige. Balneo maris in Aquâ multoties liquefac ut albescat.

Eodem modo elicitur OLEUM è BACCIS LAURI, *sed sine torrefactione fructuum.*

OLEUM OVORUM.

℞. Ova recentia ad duritiem elixa . . . . . *Quot volueris.*

Vitellos comminutos in sartagine, igne moderato, continuè spathulâ agitando, assa donec Oleum exsudare incipiat. Tunc, sacculo cannabino inclusos, prelo calido promptè exprime.

OLEA PER INFUSIONEM ET DECOCTIONEM.

OLEUM DE CASTOREO.

℞. Castorei optimi minutim incisi . . . . *Unciam.*
Vini rubri . . . . *Uncias iij.*
Olei Olivarum . . . . *Uncias xij.*

Inde cucurbitæ vitreæ coopertæ. Digere balneo maris per viginti quatuor horas sæpe agitando; tunc humiditas vaporet balneo maris. Oleum serva in lagenâ ritè obturatâ, Castoreo in fundo remanente.

OLEUM DE CATELLIS.

℞. Catellos recens natos & necatos . . . . *Numero iij.*
Conjice in,
Olei Olivarum . . . . *Libris iij.*
Vini generosi albi . . . . *Unciis iiij.*

Coque igne lento ad ossium compaginis separationem. Cola cum expressione. Colaturæ calenti adde,

Summitatum

Summitatum ſiccatarum & inciſarum Origani, Serpilli, Pulegii, Hyperici, Majoranæ, ana . . . *Uncias ij.*

Inſolentur per quindecim dies vaſe clauſo. Cola cum expreſſione, per ſubſidentiam & decantationem depura, & ſerva.

Oleum de Euphorbio.

℞. Euphorbii pulverati . . . . *Drachm. xiij.*
Olei Olivarum . . . . *Libram.*

Liquefac igne lento. Cola & ſerva.

Oleum de Hyperico.

℞. Florum Hyperici leviter contuſorum . *Libram.*
Olei Olivarum . . . . *Libras ij.*
Vini rubri . . . . *Pintam.*

Macera per tres dies. Coque igne lento ad humiditatis conſumptionem. Cola cum expreſſione. Novam eâdem methodo infunde Florum & Vini quantitatem. Idque ter repete. Per ſubſidentiam & decantationem defeca. Adde,

Terebinthinæ claræ . . . . *Libram iß.*

Repone ad uſum.

Oleum de Lumbricis.

℞. Lumbricorum terreſtrium recentium . *Libras ij.*

Mundentur à terrâ. Aquâ pluries ablue. Rejectâ aquâ, conjice in,

Vini albi . . . . *Uncias iiij.*
Olei Olivarum . . . . *Libras ij.*

Bulliant igne lento ad Vini conſumptionem. Oleum

Gg

cola, per ſubſidentiam & decantationem depura. Serva in lagenis obturatis.

OLEUM DE MUCAGINIBUS.

℞. Radicum Althææ recentium in taleolas ſectarum . . . . *Uncias viij.*
Seminum integrarum Fœnugreci, Lini, } *ana*. *Uncias iiij.*
Aquæ communis . . . . *Pintas v.*

Bulliant igne leni ad radicum mollitiem. Cola cum expreſſione, adde,

Olei Olivarum . . . . *Libras ij.*

Coque igne moderato ad humiditatis ferè totam evaporationem. Cola ſine expreſſione. Per ſubſidentiam & decantationem depura.

OLEUM IRINUM.

℞. Radicum ireos noſtratis . . . . *Libram.*
Florum Ireos noſtratis . . . . *Libram ß.*
Olei Olivarum . . . . *Libras ij.*

In Oleo radices contuſas digere per viginti quatuor horas. Cola cum expreſſione. Vaporet humiditas. Flores in Colaturâ digere per duodecim horas. Cola, iterum vaporet humiditas, dein per ſubſidentiam & decantationem depura & ſerva.

OLEUM ROSATUM.

℞. Roſarum pallidarum recentium cum calycibus leviter contuſarum . . . . . . *Libras iiij.*
Olei Olivarum . . . . *Libras x.*

Leni balnei maris calore in vaſe clauſo digere. Cola cum expreſſione. Novas eâdem methodo digere Roſas, idque ter repete. Leniſſimo calore vaporet humiditas. Per ſubſidentiam & decantationem defeca. Serva in lagenis bene obturatis.

NOTA. Ut oleum rubrum habeas, radicis Anchusæ ope, tinge.

Eodem modo parantur OLEA
- è floribus CHAMÆMELI, GENISTÆ, KEIRI, LILIORUM ALBORUM, MELILOTI, NYMPHÆÆ ALBÆ. SAMBUCI, VIOLARUM,
- è comis florentibus ABROTANI, ABSINTHII, ANETHI, HYOSCIAMI, MAJORANÆ, MENTHÆ, ROSMARINI, RUTÆ,
- è fructibus SOLANI, &c.

OLEUM DE SCARABÆIS.

℞. Proscarabæorum . . . . *Libram ß.*
Olei Laurini . . . . *Libram.*

Proscarabæos quassa & in Oleo Laurino infunde. Post aliquot dies leni calore vaporet humiditas. Cola cum expressione ; per subsidentiam & decantationem depura & serva.

BALSAMA.

BALSAMUM LUCATELLI.

℞. Ceræ citrinæ . . . . *Uncias iiij.*
Olei Olivarum, Terebinthinæ claræ, } *ana* . . . . *Uncias viij.*

Liquefac igne leni. Ab igne remove. Adde,

Olei Hyperici recentis . . . . *Uncias ij.*
Balsami peruviani . . . . *Unciam iß.*
Santali rubri pulverati . . . . *Unciam.*

Misce & agita donec refrixerint.

BALSAMUM VIRIDE, METENSIUM.

℞. Viridis Æris subtilissime triti . . . . . . *Drachmas iij.*

Vitrioli albi . . . . *Drachmam iß.*

Tere in mortario ſenſim immittendo,

Olei Lini expreſſi, } *ana.* . . . . *Uncias vj.*
Olivarum, }
Laurini . . . . *Unciam.*
Terebinthinæ claræ . . . . *Uncias ij.*

Simul aliquandiù digerantur, dein permiſce,

Aloës Soccotrinæ pulveratæ . . . . . . *Drachmas ij.*
Oleorum ſtillatit. baccarum Junniperi . *Unciam ß.*
Caryophillorum . . . *Drachmam.*

Et factum erit Balſamum.

BALSAMUM TRANQUILLANS.

℞. Foliorum Stramonii,
Solani officinarum,
Phytolaccæ,
Belladonæ,
Mandragoræ,
Nicotianæ,
Hyoſcyami nigri,
Papaveris albi,
nigri, } *ana* . . *Uncias iiij.*

Summitatum recentium Roſmarini,
Salviæ,
Rutæ,
Abſinthii utriuſque,
Hyſſopi,
Lavandulæ,
Thymi,
Majoranæ,
Coſti hortenſis,
Menthæ,
Sambuci,
Hyperici,
Perſicariæ, } *ana Unciam.*

Bufones . . . . *Numero v.*

Herbas inodoras concide minutim, injice in

Olei Olivarum . . . . *Libras vj.*

Coque leviter. Herbis coctis, Bufones vivi in Oleum coquantur. Cola. Adde Herbas fragrantes concisas. Digere balneo maris per duodecim horas. Cola iterum. Per subsidentiam & decantationem defeca. Serva ad usum.

PARAGRAPHUS SECUNDUS.
DE UNGUENTIS ET CERATIS.

UNGUENTUM ALBUM, RHASIS.

℞. Olei rosati . . . . *Libram.*
Ceræ albæ, } ana . . . . *Uncias iiij.*
Sevi ovini, }

Simul liquatis, adde,

Cerussæ præparatæ . . . . *Libram ß.*

Misce. Agita donec perfrixerint.

NOTA. Camphoratum fiet, si singulis Unguenti libris, Camphoræ in Spiritûs Vini modico solutæ Drachma immisceatur.

UNGUENTUM *vulgò dictum* BALSAMUM ARCEI.

℞. Terebinthinæ claræ, } ana . . . . *Unciam iß.*
Gummi Elemi, }
Sevi hircini . . . . *Uncias ij.*
Axungiæ Porci recentis . . . . *Unciam.*

Simul liquentur. Cola. Agita donec refrixerint.

UNGUENTUM DE ALTHÆA.

℞. Olei de Mucaginibus . . . . *Libram iß.*
Ceræ flavæ . . . . *Uncias vj.*
Picis albæ . . . . *Uncias iij.*
Terebinthinæ claræ . . . . *Unciam iß.*

Simul liquentur, ab igne remove & agita donec refrixerint.

UNGUENTUM AUREUM.

℞. Olei Olivarum . . . . *Libram iß.*
Ceræ flavæ . . . . *Uncias vj.*
Terebinthinæ claræ . . . . *Uncias ij.*
Picis albæ, Coloponiæ, } *ana* . . . . *Unciam iß.*
Olibani, Masticheſ, } *ana* . . . . *Unciam.*
Croci pulverati . . . . *Drachmam.*

Cera, Pix, Colophonia liquentur. Ab igne ſemotis adde Terebinthinam. Agita donec ſpiſſeſcere incipiant. Tum Olibanum, Maſtichem pulverata & Crocum immiſce. Fiat Unguentum.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM.

℞. Æruginis . . . . *Uncias v.*
Aluminis crudi . . . . *Unciam.*
Mellis puri . . . . *Uncias xiiij.*
Aceti Vini acerrimi . . . . *Uncias vij.*

Bulliant ſimul ad Unguenti conſiſtentiam.

UNGUENTUM BASILICUM.

℞. Picis albæ, navalis, Ceræ flavæ, } *ana* . . . . *Uncias vj.*
Olei Olivarum . . . . *Libram iß.*

Omnibus ſimul liquentur. Cola. Serva ad uſum.

UNGUENTUM CITRINUM.

℞. Mercurii crudi purificati . . . . *Uncias ij.*

Diſſolve in ſufficienti quantitate Spiritûs Nitri, calore leni balnei arenæ, tum,

℞. Axungiæ ſuillæ recentis . . . . *Libras ij.*

Liquefac in vaſe figulino vitreato, leni calore. Adde, ſenſim affundendo, Mercurii diſſolutionem. Aſſiduè agita, donec coagulatio incipiat. Citò chartis in quadratam formam plicatis inde. Paulò poſt indureſcet Axungia in formam Tabellarum.

UNGUENTUM DEFENSIVUM RUBRUM.

℞. Olei Lini,
Sebi arietini, } *ana* . . . . *Uncias xij.*
Lithargyri aurei præparati,
Ceræ flavæ,
Boli Armenæ præparatæ,
Minii pulverati, } *ana* . . . . *Uncias ij.*
Camphoræ . . . . *Drachmam.*
Aceti Vini . . . . *Uncias vj.*

Lithargyrum cum tertiâ Olei parte, injecto per vices Aceto, coque. Adde Oleum reſiduum, Ceram, Minium, Bolum & Sevum. Liquatis & refrigeratis immiſce Camphoram in Spiritûs Vini modico ſolutam, aſſiduè movendo ad Unguenti perfectionem.

UNGUENTUM DIAPOMPHOLYGOS.

℞. Olei Solani . . . . *Libram.*
Ceræ flavæ . . . . *Uncias v.*

Liqueſcant igne leni. Ab igne ſemotis adde,

Pompholygis,
Ceruſſæ præparatæ, } *ana* . . . . *Uncias ij.*
Plumbi uſti . . . . *Uncias iiij.*

Paululum refrigeratis inſperge,

Thuris maſculi pulverati . . . . *Unciam.*

Agita aſſiduè ad Unguenti formam.

UNGUENTUM FUSCUM.

℞. Axungiæ Porci . . . . *Uncias viij.*

Butyri recentis insulsi,
Ceræ flavæ,
Sebi arietini,
Lithargyri præparati, } *ana . . . . . Uncias viij.*
Olei Olivarum . . . . *Libram.*

Coque agitando donec fuscum acquisiverit colorem.

Unguentum griseum mercuriale.

℞. Axungiæ Porci . . . . *Libram iß.*
Saponis nigri . . . . *Uncias vj.*
Sulphuris vivi pulverati . . . . *Uncias ij.*
Staphisagriæ pulveratæ . . . . *Unciam ß.*
Mercurii crudi . . . . *Uncias ij.*

Mercurium in Axungiâ extingue, tùm cætera misce ad Unguentum.

Unguentum mundificativum de Apio.

℞. Foliorum recentium Apii . . . . *Libram.*
Nicotianæ,
Solani,
Sempervivi maj. } *ana Libram ß.*
Vincæ Pervincæ,
Agrimoniæ,
Betonicæ,
Chelidonii major.
Marrubii albi,
Millefolii,
Pimpinellæ,
Plantaginis,
Brunellæ,
Absinthii,
Anagallidis,
Summitatum recentium Centaurii minoris,
Scordii,
Veronicæ, } *ana Uncias ij.*

Olei

Olei Olivarum . . . . *Libras iiij.*
Ceræ flavæ . . . . *Uncias xij.*
Sebi arietini . . . . *Libram ß.*
Picis albæ, } *ana* . . . . *Uncias v.*
Terebinthinæ claræ, }

Herbas contusas in Oleo & Sebo per viginti quatuor horas macera. Bulliant ad humiditatis consumptionem. Cola cum expressione, per subsidentiam & decantationem depura. Adde Ceram, Picem & Terebinthinam. Post liquationem cola. Unguento semi refrigerato adde sequentia pulverata,

Myrrhæ,
Aloës,
Radicum Aristolochiæ clematitis,
Iridis florentinæ,
Scrophulariæ majoris,
Cyperi longi,
} *ana* . . . *Unciam.*

Misce. Fiat Unguentum.

UNGUENTUM NEAPOLITANUM.

℞. Axungiæ porcinæ, } *ana* . . . . *Quantum vol.*
Mercurii purificati, }

Misce diligenter, incipiendo cùm paululo Axungiæ, donec globuli mercuriales dispareant.

UNGUENTUM NERVINUM.

℞. Foliorum recentium Abrotani,
Absinthii,
Apii,
Chamæmeli,
Costi hortensis,
Chamæpithyos luteæ,
Lavandulæ,
Lauri,
Meliloti, cum floribus,
} *ana Unciam.*

Foliorum recentium Primulæ veris, Rosmarini, Rutæ, Salviæ, Thymi,		ana Unciam.
Menthæ romanæ, Betonicæ, Petroselini, Pulegii, Summitatum recentium Hyperici, Centaurii minoris,		ana Unciam ß.

Contusa omnia macerentur per aliquot dies in,

Sebi ovini . . . . *Librâ iß.*
Medullæ ex cruribus bovinis . . . . . *Libris iiij.*

Tum bulliant ad humiditatis consumptionem. Cola cum expressione. Adde,

Olei de Spicâ . . . . *Unciam ß.*

Agita donec Unguentum refrixerit.

UNGUENTUM NUTRITUM.

℞. Lithargyri præparati . . . . *Uncias vj.*
Aceti acerrimi . . . . *Uncias viij.*
Olei Olivarum . . . . *Libram.*

Lithargyrum in mortario agita, affundendo modo Oleum, modo Acetum, donec Lithargyrus liquorem ebiberit & Unguenti debitam acquisiverit crassitiem.

UNGUENTUM OPHTHALMICUM.

℞. Tuthiæ . . . . *Unciam.*
Lapidis Calaminaris, Boli Armenæ, Cerussæ, } *ana* . . . . . . *Drachmas ij.*
Camphoræ . . . . *Scrupulum ß.*
Unguenti rosati . . . . *Uncias vj.*

Omnia ut decet præparata, Unguento roſato excipiantur & fiat Unguentum.

UNGUENTUM POPULEUM.

℞. Axungiæ porcinæ . . . . *Libras vj.*
Gemmarum ſeu Oculorum Populi arboris *Libras iij.*

Liquatæ Axungiæ Gemmas immiſce, & in vaſe figulino vitrato ſerva, donec ſequentes Herbæ colligi poſſint, tùm,

℞. Foliorum Bardanæ,
Hyoſciami nigri,
Lactucæ,
Craſſulæ,
Papaveris nigri,
Sedi majoris,
minoris, } *ana* . . . *Uncias vj.*
Solani . . . . *Uncias xij.*

Contuſa omnia, commiſce Axungiæ prius liquatæ cum Oculis Populi. Coque igne leni aſſiduè agitando ad dimidiam humiditatis conſumptionem. Inter coquendum adjice per vices,

Succi Solani . . . . *Libram iß.*

Cola cum expreſſione forti. Refrigeſcat; humiditatem in fundo vaſis ſuperſtitem aufer. Liqueſac iterum; per ſubſidentiam & decantationem depura. Unguentum ſerva.

UNGUENTUM ROSATUM.

℞. Axungiæ Porci,
Roſarum pallidarum cum calycibus, } *ana Quant. vol.*

Roſas in mortario marmoreo contuſas, igne leni cum Axungiâ detine ad humiditatis conſumptionem. Anchuſâ tinge. Cola & ſerva.

UNGUENTUM DE STYRACE.

℞. Olei Nucum . . . . *Uncias xj.*
Colophoniæ . . . . *Uncias xv.*

Gummi Elemi, } ana . . . . *Uncias viiß.*
Ceræ flavæ, }

Igne moderato liquefiant, liquefactis, colatis, adde,

Styracis liquidæ purgatæ . . . . *Uncias viiß.*

Fiat Unguentum.

Unguentum potabile viride.

℞. Herbarum recentium Abrotani,
Artemisiæ,
Bellidis,
Betonicæ,
Fœniculi,
Hyssopi,
Menthæ,
Asperulæ,
Millefolii,
Majoranæ,
Plantaginis,
Veronicæ,
Salviæ,
Rutæ, } *ana Unciam.*

Baccarum Juniperi viridium . . . . . . *Uncias iij.*
Butyri recentis insulsi . . . . *Libras iiß.*

Incisa & contusa coque cum Butyro, leni igne, ad humiditatis evaporationem. Cola cum expressione. Serva ad usum.

Ceratum refrigerans, Galeni.

℞. Olei Olivarum . . . . *Libram.*
Ceræ albæ . . . . *Uncias iiij.*

Vase fictili vitrato excepta, igne moderato liquentur; ab igne remota pistillo ligneo agitentur donec refrixerint. Aquâ frigidissimâ sæpius renovatâ laventur, & fiat Ceratum.

Simili modo paratur Ceratum amygdalinum cum Oleo Amygdalarum dulcium, loco Olei Olivarum.

CERATUM LITHARGYRATUM.

℞. Olei Olivarum . . . . *Uncias iiij.*
Ceræ albæ . . . . *Unciam.*

Liquentur igne leni in vase figulino vitrato, ab igne remove & agita donec refrixerint, tum adde,

Aceti lithargyrati . . . . *Unciam.*

Spathulâ ligneâ agita cum Aquæ puriſſimæ ſufficienti quantitate, ad Ceratum.

PARAGRAPHUS TERTIUS.

DE EMPLASTRIS, SPARADRAPIS ET CEREIS.

EMPLASTRA.

EMPLASTRUM ANDREÆ A CRUCE.

℞. Reſinæ Pini . . . . *Libram.*
Gummi Elemi . . . . *Uncias iiij.*
Terebinthinæ venetæ, } *ana* . . . . . . *Uncias ij.*
Olei Laurini, }

Liquefac igne moderato, cola & fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DE BETONICA.

℞. Herbarum recentium Betonicæ . . . . *Libras iij.*
Apii vulgaris, } *ana Libras iij.*
Plantaginis, }
Ceræ flavæ, } *ana* . . . . *Libram.*
Reſinæ Pini, }

Herbas contuſas coque cum Cerâ & Reſinâ donec humiditas ſit conſumpta, Cola cum expreſſione. Poſtea immiſce,

Gummi Elemi, } *ana* . . . . *Libram.*
Terebinthinæ claræ, }

Liquatis omnibus, cola. Fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DE CERUSSA.

℞. Ceruſſæ præparatæ . . . . *Libras iij.*
Olei roſati . . . . *Libras vj.*
Aquæ fontanæ . . . . *Libras ij.*

Bulliant ad humiditatis conſumptionem ſub finem adde,

Ceræ Albæ . . . . *Uncias ix.*

Omnibus liquatis & fere refrigeratis Magdaleones efforma, manibus Aquâ madidis.

EMPLASTRUM DE CICUTA.

℞. Succi foliorum Cicutæ . . . . *Libram.*
Aceti ſcillitici, } Gummi Ammoniaci, } *ana* . . . . *Libram ß.*

Poſt Gummi ſolutionem in Aceto, ſuccum adde, cola, vaporet ad Emplaſtri conſiſtentiam. Magdaleones efforma.

EMPLASTRUM DIACHYLUM SIMPLEX.

℞. Lithargyri levigati . . . . *Libras iij.*
Olei de Mucaginibus, } Decocti Fœnugræci, } *ana* . . . . *Libras vj.*

Coque igne lento ad Emplaſtri conſiſtentiam.

EMPLASTRUM DIACHYLUM GUMMATUM.

℞. Emplaſtri Diachyli ſimplicis . . . . . . *Libras iij.*
Ceræ flavæ . . . . *Uncias iiij.*

Liquefac. Ab igne remove. Adde ſequentia pulverata.

Gummi Galbani, } Ammoniaci, } Opopanacis, } Sagapeni, } *ana* . . . . *Uncias ij.*
Terebinthinæ . . . . *Uncias iiij.*

Miſce exactè ut fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DIAPALMA.

℞. Lithargyri præparati, } Olei Olivarum, } Axungiæ ſuillæ, } *ana* . . . . *Libras iij.*
Aquæ communis . . . . *Suffic. quantit.*

Coque aſſiduè agitando ſpathulâ ligneâ, ſub finem coctionis adde,

Vitrioli albi in Aquâ ſoluti . . . . . . *Uncias iiij.*
Ceræ albæ . . . . *Uncias ix.*

Perage coctionem ad Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DIVINUM.

℞. Olei Olivarum, } Lithargyri præparati, } *ana* . . . . . *Uncias xviij.*

Miſce in cacabo æneo. Adde;

Aquæ communis . . . . *Suffic. quantit.*

Coque ad Emplaſtri conſiſtentiam. Tùm adjice,

Ceræ flavæ . . . . *Uncias viij.*

Liqueſcat. Cacabum ab igne remove, immiſce ſequentia pulverata,

Opopanacis, } Maſtiches, } Ariſtolochiæ longæ, } Æruginis, } *ana* . . . . *Unciam.*
Olibani . . . . *Drachm. ix.*
Galbani, } Myrrhæ, } *ana* . . . . *Drachmas x.*
Terebinthinæ claræ, } Bdellii, } *ana* . . . . *Uncias ij.*
Gummi Ammoniaci . . . . *Uncias iij & Drachm. iij.*
Magnetis præparati . . . . *Uncias iij.*

Ritè permiſceantur, erit Emplaſtrum coloris viridis.

NOTA. Si quis Emplaſtrum rubrum exoptet, Ærugi-nem cum Lithargyro coquat.

EMPLASTRUM EPISPASTICUM.

℞. Cantharidum recèns pulveratarum . . . *Uncias iiij.*
Euphorbii pulverati . . . . *Unciam ß.*
Picis albæ, } Terebinthinæ, } *ana* . . . . *Uncias vj.*
Ceræ flavæ . . . . *Uncias ij.*

Ceræ, Terebinthinæ & Pici liquatis, ab igne ſe-motis, admiſce pulveres. Fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRUM GRISEUM.

℞. Lithargyri aurei, } Sebi ovilli, } Olei Olivarum, } *ana* . . . . *Uncias iiij.*
Lapidis Calaminaris præparati . . . . . *Uncias ij.*
Ceruſſæ præparatæ . . . . *Unciam.*
Aquæ communis . . . . *Libram.*

Bulliant igne moderato, aſſiduè agitando, ad Em-plaſtri conſiſtentiam, adde,

Ceræ albæ . . . . *Uncias iij.*

Cerâ liquatâ ab igne remove aſſiduè agitando. Em-plaſtro ſemi frigido adde,

Terebinthinæ . . . . *Unciam iß.*

Et ſequentia pulverata ſimul mixta,

Tutiæ præparatæ . . . . *Drachmas ij.*
Thuris . . . . *Drachmas x.*
Maſtiches . . . . *Drachmas vj.*
Myrrhæ . . . . *Unciam ß.*

Sub finem immiſce,

Camphoræ in pauco Oleo ſolutæ . . . *Drachmas iij.*

Fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRUM AD HERNIAM.

℞. Picis navalis . . . . *Libram.*
Ceræ flavæ, } *ana* . . . . *Uncias iiij.*
Terebinthinæ claræ, }

Simul liquatis cola. Adde ſequentia pulverata,

Maſtiches, } *ana Uncias ij.*
Radicis Conſolidæ majoris ſiccæ, }
Labdani, }
Hypociſtidos, } *ana* . . . . *Unciam iß.*
Terræ ſigillatæ, }
Nuces Cupreſſi . . . . *Numero xij.*

Fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DE MELILOTO.

℞. Summitatum Meliloti floridarum & recentium . . . . *Libras iij.*

Contunde in mortario marmoreo, miſce cum

Sebi Ovilli liquefacti . . . . *Libris iiij.*

Coque ferè ad humidi conſumptionem. Cola cum expreſſione. Adde,

Picis albæ . . . . *Libras vj.*
Ceræ flavæ . . . . *Libras iij.*

Fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DE MUCAGINIBUS.

℞. Olei de Mucaginibus . . . . *Uncias vj.*
Ceræ citrinæ . . . . *Uncias xx.*

Liqueſcant. Ab igne remove; agita donec refrixerint tantiſper; adde ſequentia in Aceto ſoluta,

Gummi Ammoniaci, } *ana* . . . . *Unciam ß.*
Galbani, }
Sagapeni, }

Ritè mixtis adde,

Terebinthinæ	*Uncias ij.*
Croci pulverati	*Drachmas ij.*

Fiat Emplaſtrum.

Emplastrum Norimbergense.

℞. Olei Olivarum	*Uncias ix.*
Céruſſæ præparatæ	*Uncias v.*

Coque igne lento ad Emplaſtri conſiſtentiam. Adde,

Ceræ flavæ	*Uncias viij.*

Liquefac. Ab igne Emplaſtrum remove, & ſemi-refrigerato admiſce,

Camphoræ in modico Olei Olivarum ſo-lutæ	*Unciam.*

Fiat Emplaſtrum.

Emplastrum Oxycroceum.

℞. Colophoniæ, Picis albæ, Ceræ flavæ, } *ana*	*Uncias iiij.*
Terebinthinæ	*Unciam iß.*

Liquefac igne lento. Cola. Emplaſtro ab igne ſemoto, immiſce ſequentia pulverata,

Gummi Ammoniaci, Galbani, Olibani, Myrrhæ, Maſtiches, Croci, } *ana*	*Unciam & Drachmas iij.*

Fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRUM SAPONACEUM.

℞. Minii . . . . *Libram*
Cerussæ . . . . *Libram ß.*
Olei Olivarum . . . . *Libram iiß.*
Aquæ communis . . . . *Quant. suffic.*
Saponis albi derasi . . . . *Uncias iiij.*

Coque omnia ad debitam consistentiam, tùm adde ut liquantur,

Ceræ flavæ . . . . *Uncias iij.*

Misce, fiat Emplastrum.

NOTA. Addi potest extemporè Camphoræ tritæ quantum libuerit & erit EMPLASTRUM SAPONACEUM CAMPHORATUM.

EMPLASTRUM STIPTICUM, CROLLII.

℞. Minii,
Lapidis Calaminaris præparati, } *ana* . *Uncias iij.*
Lithargyri præparati . . . . *Uncias vj.*
Oleorum Lini,
Olivarum, } *ana* . . . . . . *Uncias ix.*
Aquæ communis . . . . *Suffic. quantit.*

Coque assiduè agitando, spathulâ ligneâ ad Emplastri consistentiam. Adde,

Olei laurini . . . . *Uncias iij.*
Ceræ flavæ,
Colophoniæ, } *ana* . . . . *Uncias vj.*

Liquatis omnibus, ab igne remove. Emplastro semi-refrigerato, immisce sequentia pulverata,

Resinæ Sandaracæ . . . . *Uncias iij.*
Gummi Ammoniaci,
Bdellii,
Galbani,
Opopanacis,
Sagapeni, } *ana* . . . . . . *Unciam iß.*
Succini præparati,
Olibani,
Myrrhæ, } *ana* . . . . *Unciam ß.*

Aloës,
Ariſtolochiæ longæ, } *ana* . . . . . *Unciam* ß.
rotundæ,
Hæmatitæ præparatæ . . . . *Uncias* iiij.
Radicis Tormentillæ . . . . *Drachmas* vj.
Sanguinis Draconis,
Boli Armenæ, } *ana*. . . . . *Unciam* ß.
Vitrioli albi,
Florum Antimonii rubrorum, } *ana* . . *Drachmam*.
Croci Martis aſtringentis.,

Miſce exactè, Emplaſtro ferè frigido, adde,

Camphoræ in Olei eſſentialis Juniperi *Seſquidrachmâ* ſolutæ . . . . *Unciam* ß.

Fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DE VIGO.

℞. Ranas aquaticas viventes boni habitûs . *Numero* vj.
Lumbricorum terreſtrium à Terrâ purgatorum . . . . *Uncias* iiiß.
Vini generoſi . . . . *Libras* iiß.

Digere per aliquot horas. Bulliant ad tertiæ partis conſumptionem. Sub finem adde,

Matricariæ recentis cum floribus . . . . . *Unciam*.
Junci odorati, } *ana* . . . . *Unciam* ß.
Stœchados,

Reſideant ad teporem. Cola cum expreſſione. Adde,

Succi radicum Ebuli, } *ana* . . . . . . *Uncias* ij.
Helenii,
Olei anethini, } *ana* . . . . *Uncias* iij.
Chamæmeli romani,
Axungiæ Taxi . . . . *Uncias* iiß.
Porci . . . . *Uncias* xj.
Pinguedinis Vituli . . . . *Uncias* vj.
Lithargyri aurei præparati . . . . *Uncias* xviij.

Coque, assiduè movendo, ad Emplastri consistentiam; tùm adjice, ut liquescant,

Ceræ flavæ . . . . *Uncias vj.*
Olei laurini . . . . *Unciam iß.*

Omnibus liquatis adde,

Styracis liquidæ,
Terebinthinæ claræ, } *ana* . . . . . . *Uncias ij.*

Omnibus ritè permixtis, ex Emplastro ferè frigido dimidiam partem aufer & seorsim serva. Tum,

Reliquo Emplastri, adde,
Olei essentialis Lavandulæ . . . . *Unciam.*

Misce & erit EMPLASTRUM DE VIGO SINE MERCURIO.

℞. Dimidiam partem Emplastri supradicti seorsim servati.

Liquefac, adde,

Mercurii è Cinnabari revivificati & extincti in *Unciâ* Axungiæ Porci rancidæ *Uncias iiij.*

Ritè mixtis & Emplastro ferè frigido adde,

Olei essentialis Lavandulæ . . . . *Unciam.*

Misce, & erit EMPLASTRUM DE VIGO CUM MERCURIO.

SPARADRAPA.

SPARADRAPUM RUBRUM.

℞. Ceræ flavæ . . . . *Uncias viij.*
Terebinthinæ . . . . *Uncias iiij.*

Liquefac. Adde sequentia pulverata,

Minii . . . . *Drachm. iiiß.*
Cinnabaris . . . . *Drachmas iij.*
Ireos florentinæ . . . . *Drachmam iß.*

Fiat Emplaſtrum. In Emplaſtro liquato immerge Telas vetuſtate attritas & fiat Sparadrapum, ſupra marmor cylindro ligneo levandum.

SPARADRAPUM ALBUM.

℞. Ceræ albæ,
Emplaſtri de Ceruſſâ, } *ana* . . . . . *Uncias iiij.*
Olei Olivarum,
Camphoræ, } *ana* . . . . *Drachmas ij.*

Fiat Emplaſtrum, inquo liquido Telam vetuſtate detritam immerge. Fiat Sparadrapum ſupra marmor cylindro ligneo levandum.

CEREI.

PRIMA CEREI SPECIES.

℞. Ceræ flavæ liquatæ . . . . *Libram iß.*
Aceti Lithargyrati . . . . *Unciam.*

Liquefac igne lento, agitando; ab igne remotis immerge Telas vel filamenta Goſſipii: & fiant Cerei.

ALTERA CEREI SPECIES.

℞. Ceræ flavæ liquatæ . . . . *Uncias vj.*
Aceti Lithargyrati . . . . *Unciam.*

Fiant ut ſupra Cerei.

APPENDIX.

CATAPLASMA EMOLLIENS.

℞. Herbarum quatuor emollientium . . *Uncias iiij.*
Florum Chamæmeli,
Meliloti, } *ana* . . . . *Unciam.*

Omnibus pulveratis adde,

Farinæ Lini . . . . *Uncias iij.*
Aquæ communis . . . . *Quant. ſuffic.*

Miſce fiat Cataplaſma.

CLASSIS SECUNDA.

DE OPERATIONIBUS CHYMICIS.

ARTICULUS PRIMUS.

DE DISTILLATIS.

Diſtillationis ope eliciuntur,

1.° AQUÆ vel SIMPLICES, vel è pluribus ingredientibus COMPOSITÆ.

2.° AQUÆ VINOSÆ, cum Vino elicitæ.

3.° SPIRITUS: hi triplicis ſunt generis. *Primò*, ARDENTES ſeu cum Spiritu Vini diſtillati, vel fermentatione vinoſâ producti. *Secundò*, ACIDI à fermentatione acidâ orti, vel è quibuſdam naturalibus ſubſtantiis eliciti. *Tertiò* ALKALINI vel VOLATILES è fermentatione putridâ nati, vel è ſubſtantiis ſucco aut Sale volatili præditis, extracti.

4.° OLEA ESSENTIALIA, odorem ſubſtantiarum referentia.

5.° SUBLIMATA, ſubſtantiæ volatiles, ſolidæ, vaſorum diſtillatoriorum ope obtentæ.

CANON. I. Subſtantias diſtillandas cucurbitæ inde. Super ignem cucurbitam capitello inſtructam impone. Juncturis veſicâ madidâ lutatis, refrigeratorium aquâ frigidâ reple. Recipiens roſtro adapta. Ignem ſenſim auge ad liquoris ebullitionem; ab exploſione ſeu expanſione cavendo. Diſtillationem protrahe quamdiù elicitus liquor diſtillandorum odorem & ſaporem refert, cavendo ab empyreumate. Melior & tutior quandoquè erit diſtillatio ex cucurbitâ balneo maris aut arenæ impoſitâ.

II. In diſtillatione Spirituum ardentium & ſublimatione Salium volatilium, vaſa quò altiora, eo meliora; è contrario in Spirituum acidorum diſtillatione, quò humiliora, èo meliora ſunt.

PARAGRAPHUS PRIMUS.

DE AQUIS STILLATITIIS SIMPLICIBUS.

CANON. I. Herbæ & Flores ſint recentes, odoræ & in vigore ætatis. Ut plurimùm tripla quantitas Aquæ, major ſiccioribus, affundatur.

II. Species vel integras, vel pro re natâ inciſas aut contuſas, maceratas ſi opus ſit, vaſi diſtillatorio immitte, tertiâ ejus parte vacuâ remanente.

III. Plantas Cruciferas (*Tetradynamas*,) & ſimiles, alkali volatili turgentes, vaſis non metallicis ſed vitreis vel terreis diſtilla.

IV. Aquæ ſtillatitiæ non odoræ, utpotè nullâ virtute præditæ rejiciuntur: Aquam communem ſtillatitiam vel ebullitam ubique eis ſubſtitue.

MODUS DISTILLANDI.

1.° Plantas *Cruciatas* ſeu *Cruciferas* & ſimiles, volatili ſucco prægnantes, leviter conciſas, non contuſas, cum Aquæ communis pondere duplo diſtilla, & elice quartam partem. In harum familiâ ſunt,

BECCABUNGA,
COCHLEARIA,
NASTURTIUM,
LEPIDIUM,
RADICES RAPHANI RUSTICANI *ſcobinâ deraſæ*, *&c.*

2.° Plantas *odoras*, recentes & cum floribus mundatis ac diſcarptis diſtilla, ex Aquæ communis triplo & elice tertiam partem. Huc veniunt,

ABSINTHIUM,
ANGELICA,
ARTEMISIÆ,
CHAMÆMELUM,
FÆNICULUM,
HYSSOPUS,
MAJORANA,
MELISSA,

MENTHA,

MENTHA,
RUTA,
SALVIA,
SCORDIUM,
TANACETUM,
THYMUS, &c.

3.° Floribus *Odoris & Succosis*, recens mundatis Aquæ quadruplum affunde, & partes duas elice: hi sunt,

Flores { AURANTIORUM,
TUNICÆ,
ACACIÆ,
LILII CONVALLIUM,
LILIORUM ALBORUM,
ROSARUM PALLIDARUM,
SAMBUCI,
TILIÆ,
PRIMULÆ VERIS, &c.

NOTA. Hi flores mundati possunt balneo maris perse, id est sine Aqua distillari; & elicies *Aquæ* distillatæ, (*essentialis* dictæ) Uncias circiter sex, ex singulis florum libris.

4.° Flores *odoros*, *minùs succosos* cum calycibus, quadruplo Aquæ communis affuso, macera per viginti quatuor horas. Aquæ partes duas distilla. Inter has recense,

Flores { CHAMÆMELI,
LAVANDULÆ,
MATRICARIÆ,
MELILOTI,
ROSMARINI,
STÆCHADOS, &c.

NOTA. Horum florum *Aquas essentiales*, methodo supradictâ elicies; è singulis florum libris Uncias circiter sex distillabis.

5.° Baccas & Semina contunde, octuplum Aquæ communis affunde, per viginti quatuor horas digere, ad medias distilla. Verbi gratia,

Baccæ LAURI,

Semina { ANGELICÆ,
APII HORTENSIS,
CORIANDRI,
CARVI,
CUMINI,
FŒNICULI, &c.

6.° *Cortices Citrei & Aurantiorum* cum ſextuplo Aquæ communis per biduum macera & ad medias diſtilla.

7.° *Ligna*, *Cortices*, *Radices ſiccas* & ſimilia, radulâ abrade, cum octuplo Aquæ communis per aliquot dies digere, & diſtilla ad medias.

PARAGRAPHUS SECUNDUS.

DE AQUIS STILLATITIIS COMPOSITIS.

CANON. I. Herbæ earumque partes ſint mediocriter & recenter ſiccatæ, exceptis quæ recentes præſcribuntur.

II. Finitâ maceratione debitâ, tantum Aquæ fontanæ adjice quantum empyreumati cavendo ſufficit.

III. Liquorem primò diſtillatum, non ſeorſim ſub nomine Spiritûs ſerva, ſed cum poſtremis miſce.

AQUA CASTOREI.

℞. Caſtorei optimi . . . . *Unciam.*
Summitatum florentium Botryos americanæ, Matricariæ, } *ana Uncias iiij.*
Flavedinis ſiccæ aurantiorum . . . . . . *Unciam ß.*

Infunde per aliquot horas in quantitate Aquæ communis ſufficienti ut evitetur empireuma. Diſtilla balneo maris & elice Aquæ *Pintas iij.*

AQUA CINNAMOMI.

℞. Cinnamomi acuti contuſi leviter . . . . *Libram.*
Vini generoſi . . . . *Pintas viij.*

Macera per duos dies vaſe clauſo. Diſtilla ſecundum Canones, donec liquor elicitus Cinnamomi odorem & ſaporem referre neget.

AQUA THERIACALIS.

℞. Radicum Vincetoxici, Angelicæ, Dictamni albi, Petasitidis, Gentianæ, } *ana* . . . . *Uncias ij.*
Carlinæ, Contrayervæ, Zedoariæ, } *ana* . . . . . *Unciam.*
Corticum recentium Citri, Baccarum Juniperi } *ana* . . . . *Uncias ij.*
Herbarum Rutæ, Scordii, Galegæ, } *ana* . . . . *Unciam.*
Theriacæ Andromachi . . . . *Uncias vj.*
Vini generosi . . . . *Pintas xij.*

Incidenda incide, contundenda contunde. Macera, vase clauso per triduum. Distilla lege artis.

PARAGRAPHUS TERTIUS.

DE SPIRITIBUS.

SPIRITUS ARDENTES.

CANON. Spiritus ardentes facillime flammam concipiunt, ideo cave ab ignis nimio gradu & à flammæ appropinquatione.

AQUA VITÆ.

℞. Vini generosi . . . . *Quant. suffic.*

Ad implendam mediam cucurbitæ partem. Lento igne distilla secundum Canones, donec liquor prodiens flammam concipere neget.

NOTA. SPIRITUS VINI CAMPHORATUS fit ex Camphoræ *Unciâ* ß. in Aquæ vitæ *Unciis viij.* solutâ.

SPIRITUS VINI RECTIFICATUS.

℞. Aquæ vitæ . . . . *Quant. ſatis,*

Ut impleatur dimidia pars cucurbitæ. Diſtilla ut artis eſt ad medias.

NOTA. Spiritum Vini omninò dephlegmatum & alkoolisatum cognoſces dùm totus accenſus conſumitur; vel dùm Pulveri Pyrio affuſus & accenſus illum deflagrando conſumit; vel tandem quando Oleum amygdalinum ſupernatat.

SPIRITUS ANISI.

℞. Seminum Aniſi contuſorum . . . . *Libram ß.*
Aquæ vitæ, }
Aquæ communis, } *ana* . . . . *Pintas iiij.*

Per diem macera. Diſtilla donec *Pintæ iij.* ſint elicitæ.

Eodem modo parantur SPIRITUS { ANETHI, CARVI, CORIANDRI, FŒNICULI, &c.

SPIRITUS CARMINATIVUS, SYLVII.

℞. Radicum Angelicæ . . . . *Drachmam.*
Imperatoriæ, }
Galangæ, } *ana* . . . . *Drachmam iß.*
Foliorum Roſmarini, }
Majoranæ, }
Rutæ, }
Ocimi, } *ana* . . . . . . *Unciam iß.*
Baccarum Lauri . . . . *Drachmas iij.*
Seminum Angelicæ, }
Leviſtici, }
Aniſi, } *ana* . . . . *Unciam ß.*
Zinziberis, }
Nucis moſchatæ, }
Macis, } *ana* . . . . *Drachmam iß.*
Cinnamomi. . . . . *Drachmas iij.*

Caryophyllorum,
Corticum Aurantiorum, } *ana* . . . . . *Drachmam.*
Aquæ vitæ . . . . *Pintas vj.*

Incide & crasse contunde. Macera per triduum, vase clauso. Distilla cum Aquæ communis sufficienti quantitate ad evitandum empyreuma, donec elicitæ sint *Pintæ iij.*

AQUA VULNERARIA.

℞. Florum Lavandulæ,
Herbarum recentium Salviæ,
Angelicæ,
Absinthii,
Satureiæ,
Fœniculi,
Menthæ Crispæ,
Hyssopi,
Melissæ,
Ocimi,
Rutæ,
Thymi,
Majoranæ,
Rosmarini,
Origani,
Calaminthæ,
Serpilli, } *ana Unc. iiij.*
Aquæ vitæ . . . . *Pintas xij.*

Incisa omnia, macera per viginti quatuor horas, vase clauso. Cum Aquæ communis sufficienti quantitate, ad evitandum empyreuma, balneo maris distilla donec elicitæ sint *Pintæ xij.*

AQUA MELISSÆ, COMPOSITA.

℞. Herbæ Melissæ recentis . . . . *Libram iß.*
Flavedinis corticum recentium Citri . *Uncias iiij.*
Nucis moschatæ,
Seminum Coriandri, } *ana* . . . . . . *Uncias ij.*

Cinnamomi,
Caryophyllorum, } *ana* . . . . *Unciam.*
Radicum Angelicæ,
Aquæ vitæ . . . . *Pintas ix.*

Incisa & contusa ut artis est, macera per triduum. Cum sufficienti quantitate Aquæ communis ad evitandum empyreuma, distilla donec *Pintæ xij.* sint elicitæ.

AQUA REGINÆ HUNGARIÆ.

℞. Florum Rosmarini recentium, cum calycibus . . . . *Libras ij.*
Aquæ vitæ . . . . *Pintas xvj.*

Distilla illico, cum sufficienti quantitate Aquæ communis ad evitandum empyreuma, donec elicitæ sint *Pintæ viij.*

Simili modo eliciuntur SPIRITUS { LAVANDULÆ, CORTICUM CITRI, &c.

SPIRITUS ARDENS CERASORUM NIGRORUM.

℞. Cerasorum nigrorum maturorum rejectis nucleis . . . . *Libras xx.*

Contunde. Vase figulino inde. Affunde,

Aquæ communis . . . . *Pintas x.*
Mellis optimi . . . . *Libras ij.*

Macera in hypocausto donec vinosus odor exhaletur. Ex arte balneo maris distilla. Spiritum indè elicitum rectifica.

Eodem modo parantur SPIRITUS ARDENTES { Fructuum FRAMBŒSIÆ, FRAGARIÆ, Baccarum JUNIPERI, SAMBUCI, &c.

Spiritus ardens Cochleariæ.

℞. Herbæ Cochleariæ recentis & floridæ . *Libras v.*
Aquæ vitæ . . . . *Pintas x.*

Herbam contusam cum Aquâ vitæ macera per biduum vase Clauso. Juncturas ritè obtura ; Distilla donec liquoris *Libræ v.* elicitæ sint.

Sic parantur *Spiritus ardentes* plantarum omnium *Cruciferarum* & *Antiscorbuticarum.*

SPIRITUS ACIDI.

Spiritus Aceti.

℞. Aceti acerrimi . . . . *Quantum vol.*

Mitte in ollam humilem , lento calore balnei arenæ vaporet circiter tertia pars quæ phlegma est. Duas partes alteras inde cucurbitæ vitreæ. Distilla, prodibit Spiritus. Ab operatione cessabis , ubi primùm stillans liquor empyreumaticum odorem spiraverit.

Nota. Si distillatio instituatur cum Aceto gelu ad medias concentrato , statim prodibit spiritus.

Spiritus et Oleum Vitrioli.

℞. Vitrioli viridis ad levem flavedinem calcinati & pulverati . . . . *Quant. satis.*

Inde retortæ loricatæ ita ut dimidia pars vacua remaneat. Adaptato amplissimo recipiente , distilla igne primùm leni , prodibit guttatim phlegma (*Ros Vitrioli*) si libuerit servandum. Phlegmate exempto , recipiente iterùm adaptato. Juncturis ritè lutatis distillationem perge igne graduato , mox acriori , tandem acerrimo , per tres aut quatuor dies.

Operatione finitâ , materia superstes in retortâ Colcothar appellatur.

Liquorem elicitum balneo arenæ diſtilla ad medias, erit *Spiritus*, *Oleum* (impropriè dictum) in retorta ſupererit.

NOTA. OLEUM ſeu SPIRITUS SULPHURIS *per campanam* nihil aliud eſt quam SPIRITUS VITRIOLI, ſeu ACIDUM VITRIOLICUM.

LIQUOR ANODYNUS MINERALIS, HOFFMANNI.

℞. Olei Vitrioli concentratiſſimi, } *ana* . . *Libram iß.*
Spiritûs Vini rectificatiſſimi, }

Mitte Spiritum Vini in retortam vitream ſatis amplam, huic affunde paulatim & cautè Oleum Vitrioli, in gyrum agitando retortam ut liquores miſceantur accuratè. Mixtura incaleſcit, colorem acquirit rubrum. Diſtilla igne arenæ ita adminiſtrato ut liquor ſemper leviter bulliat. Prodibit primò *Spiritus Vini fragrans* quem exime & ſerva.

Diſtilla iterùm eodem caloris gradu donec ſulphureus odor prodire incipiat, obtinebis ſecundò *Spiritum volatilem fragrantiorem & ſuaviorem* quem excipe & ſerva.

Deindè igni leniſſimo materiam ſuperſtitem expones, (ne offa nigra, in fundo retortæ apparens aſcendat ac tranſeat in recipiens,) prodibit *Phlegma acidum, ſulphureum & volatile.*

Tandem apparebit *Oleum Vini dulce*, à Phlegmate acido ſtatim & accuratè ſeparandum. Tùm,

℞. Spiritûs Vini fragrantis primò diſtillati . }
Spiritûs volatilis fragrantioris ſecundò } *ana Unciam.*
diſtillati . . . . }
Olei Vini dulcis ultimò diſtillati . . . *Gutas xij.*

Miſce, & erit *Liquor anodynus mineralis.*

NOTA. I. Si Liquor anodynus mineralis aliquid ſulphurei odoris ſpiraverit, cum Salis Tartari tantillo digeratur.

II. Liquorem ſecundò elicitum balneo arenæ, igne omnium leniſſimo, lampadis flammæ ope, lentè diſtilla, obtinebis liquorem ÆTHER dictum.

SPIRITUS

SPIRITUS NITRI.

℞. Nitri puri triti . . . . *Libras ij.*
Argillæ exſiccatæ pulveratæ . . . . . . *Libras vj.*

Mixta inde retortæ terreæ, capaci, luto loricatæ. Igne leni primùm phlegma elice, quod abjicito. Adaptato recipiente amplo, ritè lutato, ſenſim ignem auge ad ſummum gradum. Elapſis horis quatuordecim finita erit operatio.

NOTA. I. Diſſolve Mercurii crudi *Unciam* in matratio cum ſufficienti quantitate Spiritûs Nitri & erit SOLUTIO ſeu AQUA MERCURII CAUSTICA.

II. Spiritûs Vini rectificati *Unciis xij.* affunde cautè & ſenſim Spiritûs Nitri *Uncias vj.* digere per aliquot dies in vaſe circulatorio amplo & habebis SPIRITUM NITRI DULCIFICATUM.

SPIRITUS NITRI CONCENTRATUS.

℞. Nitri puri ſicciſſimi pulverati . . . . . *Partes iij.*
Olei vitrioli concentrati . . . . *Partem j.*

Inde Nitrum retortæ ſatis capaci. Super affunde Oleum Vitrioli. Statim balneo arenæ igne leni diſtilla. Ignem auge gradatim & cautè Liquorem elicitum in lagenâ epiſtomio vitreo obturatâ ſervabis.

NOTA. Inter diſtillandum, recipientis foraminulum identidem aperies, ne vaſa frangantur.

AQUA FORTIS.

℞. Nitri puri ſiccati,
Vitrioli viridis ad albedinem calcinati, } *ana Libras ij.*

Seorſim tere. Mixta ſimul inde retortæ capaci loricatæ recipienti ampliſſimo inſtructæ. Igne primùm leni phlegma elice, quod abjicito. Juncturis ritè lutatis diſtilla igne graduato ad reverberii gradum. Intra duodecim horas abſolvetur operatio.

NOTA. I. Reſiduum in Aquâ calidâ ſolutum, filtratum, ad pelliculam vaporatum, ad cryſtalliſationem repone. Erit ARCANUM DUPLICATUM.

II. Immitte matratio capaci, Salis Ammoniaci puri *Uncias iiij.* cum Aquæ fortis vel Spiritûs Nitri *Librâ*, digere ad integram Salis ſolutionem. Erit AQUA REGIA.

SPIRITUS SALIS COMMUNIS.

℞. Salis communis exſiccati & pulverati . *Libram.*
Argillæ exſiccatæ & pulveratæ . . . . . *Libras viij.*

Diſtilla ut de Spiritu Nitri dictum eſt.

NOTA. Inde matratio capaci Spiritûs Vini rectificati *Uncias viij.* ſenſim affunde Spiritûs Salis *Uncias iiij.* digere per aliquot dies. Erit SPIRITUS SALIS DULCIFICATUS.

APPENDIX.

AQUA RABELLIANA.

℞. Spiritûs Vini rectificatus . . . . *Uncias xij.*

Mitte in vas vitreum ſatis amplum. Huic inſtilla paulatim, cautè vas in gyrum aſſiduè movendo,

Olei Vitrioli . . . . *Uncias iiij.*

Digere vaſe aperto, & ſerva.

SPIRITUS VOLATILES.

SPIRITUS SALIS VOLATILIS OLEOSUS, SYLVII.

℞. Cinnamomi . . . . *Uncias ij.*
Macis . . . . *Unciam ß.*
Caryophyllorum . . . . *Drachmam.*
Corticum Citri . . . . *Unciam iß.*
Salis Ammoniaci . . . . *Uncias iiij.*
Aquæ vitæ . . . . *Pintam iß.*

Digere per aliquot dies vaſe probè clauſo. Tùm adde,

Salis Tartari . . . . *Uncias iiij.*

Diſtilla balneo arenæ ad medias.

SPIRITUS, OLEUM ET SAL VOLATILE CORNU CERVI.

℞. Cornu Cervi frustulatim secti . . . . . *Quantum vol.*

Imple retortam. Distilla igne primùm leni. Primò prodibit phlegma rejiciendum. Gradatim aucto igne, Spiritum, Sal volatile & Oleum obtinebis.

Vasa refrigerata agitato, ut Oleum, Sal volatile & Spiritus commisceantur. Hæc inde retortæ, & balneo maris sublime fiat Sal volatile, affuso Spiritu Vini rectificandum. Superstes liquor filtretur ut Oleum spissum separetur à Spiritu.

Simili ratione distillantur { OSSA ANIMALIUM, VIPERÆ, &c.

OLEUM, SPIRITUS ET SAL VOLATILE SUCCINI.

℞. Succini flavi contriti . . . . *Quant. voluer.*

Inde retortæ loricatæ, capaci, & orificii ampli, cujus impleantur duæ tertiæ partes. Recipiens amplissimum adapta. Igne primùm leni distilla, stillabit phlegma. Auge ignem gradatim; Spiritus, Sal volatile & Oleum prodibunt.

Sal, recipientis parietibus adhærens, Aquâ calidâ collige & solve. Oleum à Spiritu per chartam bibulam priùs Aquâ madefactam separa. Spiritum Sale imbutum in cellâ repone: concrescent crystalli, quas à liquore seu Spiritu separabis.

Oleum cum ossibus ad albedinem calcinatis misce in retortâ. Distilla igne graduato. Prodibunt Olea, primò album, Dein flavum, postremò rubrum: singula seorsim excipe & serva.

NOTA. I. Primum Oleum diu servabitur album, si cum Aquâ iterum balneo arenæ ex retortâ distilletur.

II. Sal volatile Succini acidum est, & inter Salia essentialia recensendum.

Spiritus Salis Ammoniaci cum Calce.

℞. Salis Ammoniaci . . . . *Uncias viij.*
Calcis vivæ . . . . *Libram iß.*

Seorſim pulvera. Mixta inde cucurbitæ vitreæ ita capaci ut media pars ſit vacua. Affunde,

Aquæ communis . . . . *Uncias vj.*

Materiam agita, à vaporibus cavendo, & ſtatim capitellum impone ſatis amplum ac recipiente inſtructum; juncturis non lutatis, ſed arctè conniventibus. Eductis per horæ quadrantem ſine igne primis Spiritibus, juncturas luta. Ignem adhibe leniſſimum gradatim augendum. Aſcendit primò Sal volatile ſiccum capitello adhærens; ſecundò ſequitur Spiritus Sal ſolvens. Unà in recipiens delabuntur. Refrigeratis vaſis Spititum ſerva in lagenâ probè obturatâ epiſtomio vitreo.

Nota. Maſſam ſuperſtitem calcina, erit SAL AMMONIACUM FIXUM. Aëri humido expoſitum deliqueſcit, & vocatur OLEUM CALCIS.

Spiritus Salis Ammoniaci cum Alkali fixo.

℞. Salis Tartari, } *ana* . . . . *Partes æquales.*
Salis Ammoniaci, }

Procede ut in operatione Spiritûs Salis Ammoniaci cum Calce.

Nota. Maſſa reſidua in Aquâ ſoluta, filtrata & evaporata, dat SAL DIGESTIVUM ſeu FEBRIFUGUM SYLVII.

APPENDIX.

Spiritus Mindereri.

℞. Spiritûs Salis Ammoniaci cum Alkali fixo parati . . . . *Quantum vis.*
Spiritus Aceti . . . . *Quant. ſuffic.*

Ad ſaturationem.

PARAGRAPHUS QUARTUS.

DE OLEIS ET BALSAMIS DISTILLATIS.

CANON. I. Pro Oleorum eſſentialium diſtillatione, plantas aromaticas vigentes adhibe.

II. Cortices fructuum recentium nullâ maceratione indigent, corpora tenerrima vix ullam, tenuia & mollia macerationem per biduum triduumve, viſcoſa diuturniorem exigunt.

III. Ante macerationem ſemina, baccas & aromata contunde. Ligna radulâ abrade.

IV. Olea eſſentialia ipſemet Pharmacopœus præparet ut adulteratio evitetur.

OLEUM ESSENTIALE ABSINTHII.

℞. Herbarum Abſinthii conciſarum . . . . *Quantum. vol.*
Aquæ communis . . . . *Quant. ſuffic.*

Ut Herbæ innatare poſſint. Macera per aliquot dies. Diſtilla igne nudo, paulò intentiore quàm qui Aquis diſtillandis adhibetur. Oleum ab Aquâ ſepara.

Eodem modo diſtillantur OLEA ESSENTIALIA,

- Herbarum
  - MENTHÆ,
  - ORIGANI,
  - PULEGII,
  - SABINÆ,
  - ROSMARINI, *cum floribus*,
  - RUTÆ, *cum ſeminibus.*
- Florum LAVANDULÆ.
- Seminum
  - ANISI,
  - CARVI,
  - FŒNICULI.
- Baccarum JUNIPERI.
- Corticum
  - AURANTIORUM,
  - CITREORUM,
- Ligni
  - SASSAFRAS,
  - RHODII.

Eodem modo distillantur { Olea Essent. { Caryophyllorum; Cinnamomi, Nucis moschatæ. Spiritus Terebinthinæ, &c. }

Oleum Ceræ.

℞. Ceræ flavæ odoratissimæ . . . . *Libram.*

Distilla ex retortâ loricatâ igne graduato. Prodibit primo *phlegma acidulum*, & *Spiritus fœtens*. Igne aucto sequetur *Oleum* instar Butyri collo retortæ adhærens. Admotâ prunâ Oleum redde fluidum ut in recipiens fluat; ex retortâ lenissimo igne distilla iterùm. Rectifica & Oleum clarum evadet.

Oleum Guajaci.

℞. Ligni Guajaci radulâ abrasi . . . . . . *Quant. satis*,

Ut dimidiam partem retortæ adimpleas. Recipiens amplissimum adapta. Foraminulum identidem aperiendo, distilla igne graduato. Prodibit primò *phlegma* rejiciendum. Lutatis juncturis, distillatione continuatâ prodibit *Spiritus acidus*, & tandem *Oleum* nigrum crassum & fetidum fundum liquoris petens. Oleum à Spiritu separatum rectifica & serva ad usum.

Eodem modo eliciuntur Olea Fetida ex quibuscumque lignis.

Oleum de Lateribus.

℞. Lateres confractos . . . . *Quot volueris.*

Candefac & illico immerge Oleo claro Olivarum, Statim vas cooperiendo ne accendatur Oleum. Sinito donec refrixerint. Exemptos Lateres terito. Retortæ loricatæ recipiente capaci instructæ indito. Commissuris lutatis, Oleum igne reverberii elicito. Prolectum Oleum rectifica & serva.

Balsamum Fioraventi.

℞. Baccarum recentium Lauri . . . . *Uncias iiij.*
Styracis liquidæ . . . . *Uncias ij.*

Gummi Elemi,
Tacamahacæ, } *ana* . . . . . . *Unciam.*
Galbani,
Thuris,
Myrrhæ, } *ana* . . . . *Uncias iij.*
Hederæ,
Ligni Aloës,
Galangæ minoris,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Nucis moſchatæ,
Zedoariæ, } *ana* . . . *Unciam.*
Zinziberis,
Foliorum Dictamni cretici,
Aloës Soccotrinæ,
Succini præparati,
Spiritûs Vini rectificati . . . . *Pintas vj.*

Digere vaſe clauſo per dies novem. Tùm adde,

Terebinthinæ venetæ . . . . *Libram.*

Diſtilla balneo maris.

APPENDIX.

OLEUM CAMPHORÆ.

℞. Camphoræ tritæ . . . . *Uncias iij.*

Mitte in matratium, affunde,

Spiritûs Nitri . . . . *Uncias vj.*

Vaſe obturato digere ad integram Camphoræ ſolutionem. Oleum Camphoræ ſupernatans ſepara & ſerva.

OLEUM MYRRHÆ PER DELIQUIUM.

℞. Ova recentia, cocta ad duritiem & per medium ſecta.

Vitellis exemptis, Myrrhâ tenuiſſimè tritâ imple cava,

Æmulas Albuminum medietates coadunatas filo ligabis, & craticulæ ligneæ ſuper paropſidem impones. Stent in cellâ. È Myrrhâ liqueſcente Oleum ſtillabit.

BALSAMUM SULPHURIS TEREBINTHINATUM.

℞. Florum Sulphuris . . . . *Uncias ij.*
Olei eſſentialis Terebinthinæ . . . . . . *Uncias viij.*

Digere balneo arenæ. Leviter bulliant donec Oleum rubeſcat. Decanta & ſerva ad uſum.

Eodem modo paratur BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM,
SUCCINATUM,
JUNIPERINUM, &c.

PARAGRAPHUS QUINTUS.

DE FLORIBUS ET SUBLIMATIS.

FLORES ANTIMONII RUBRI.

℞. Antimonii crudi,
Salis Ammoniaci, } *ana* . . . . *Uncias iiij.*

Tere ſeorſim. Miſce. Inde cucurbitæ figulinæ. Adaptato receptaculo digere. Igne moderato per duas treſve horas ſublima. Tota ferè maſſa aſcendet. Flores exime quos Aquâ tepidâ multoties ablue & edulcora, lotiones Floribus admixtas per chartam bibulam trajiciendo. Pulverem chartæ inſidentem exſicca.

FLORES BENZOINI.

℞. Benzoïni electi, triti . . . . *Quant. vol.*

Mitte in ollam fictilem. Chartam in modum capitelli ad coni formam convolutam adapta. Igne leni ſublima. Singulis horis chartaceum conum muta; Flores albos colliges donec flavi ſuccedant.

FLORES SALIS AMMONIACI MARTIALES.

℞. Salis Ammoniaci pulverati . . . . *Libram ß.*
Limaturæ Martis . . . . *Uncias iiij.*

Miſce

Miſce. Aëri humido per viginti-quatuor horas expone. Inde retortæ vitreæ. Balneo arenæ, igne graduato ſublima. Primò ſtillabit liquor ſalinus penetrantiſſimus; dein Flores ad collum retortæ ſublimabuntur. Flores elicitos, ex reſiduo pulverato, bis, tervè cohoba.

FLORES SULPHURIS.

℞. Sulphuris communis triti . . . . *Quantum vol.*

Inde cucurbitæ in balneo arenæ poſitæ. Affixâ, capitelli vice, cucurbitâ alterâ non vitreatâ, inverſâ, vel ſuperappoſitis vaſculis *Aludels* dictis, ſublima igne graduato. Identidem capitellum renova & Flores collige.

CINNABARIS FACTITIA.

℞. Florum Sulphuris. . . . . *Libram ß.*

Liquefac in patellâ terreâ non vitreatâ. Adde ſtatim,

Mercurii vivi . . . . *Libras ij.*

Agita perpetuò ſpathâ ferreâ, donec ambo coëant & Mercurius fiat inconſpicuus. Maſſam hanc pulveratam ſublima in vaſe idoneo, igne nudo. Sublimationem ſemel aut iterùm repete.

HYDRARGYRI REVIVIFICATIO.

℞. Cinnabaris factitiæ pulveratæ, }
Limaturæ Ferri non rubiginoſæ, } *ana* . *Quant. ſatis,*

Ut impleatur dimidia pars retortæ loricatæ. Receptaculum Aquâ plenum adapta. Igne graduato reverberii diſtillationem inſtitue, donec Hydrargyrus in totum tranſierit.

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.

℞. Mercurii è Cinnabari redivivi . . . . . *Uncias xij.*

Mitte in matratium. Affunde,

Spiritûs Nitri optimi . . . . *Uncias xiv.*

Impone arenæ tepenti ad dissolutionem Mercurii. Hanc decapula in cucurbitam vitream: igne leni vaporet ad siccitatem. Massam superstitem in mortario vitreo pulvera. Adde,

Vitrioli ad albedinem calcinati, } *ana* . . *Uncias xij.*
Salis Marini decrepitati, }

Mixturam inde matratio triplo capaciori. Igne graduato, balneo arenæ sublima. Intra duodecim horas perfecta erit operatio.

MERCURIUS SUBLIMATUS DULCIS.

℞. Mercurii sublimati corrosivi . . . . . . *Uncias viij.*
Hydrargyri è Cinnabari redivivi . . . . *Uncias vj.*

Sublimatum in mortario vitreo tere, Mercurii portiunculam identidem adjiciendo donec Mercurius penitùs fiat inconspicuus. Inde matratio vel plurimis phialis. Igne arenæ graduato sublima. Rejecto pulvere rubente in fundo & circa collum albicante; sublimatum exime. Iterùm eodem modo pulvera & sublima, idque tertiò repete.

NOTA. I. Mercurius sublimatus septies CALOMELAS RIVERII vocatur.

II. Mercurius sublimatus undecies PANACEA MERCURIALIS nuncupatur.

BUTYRUM ET CINNABARIS ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi, } *ana* . . . *Part. æquales.*
Mercurii sublimati corrosivi, }

Pulvera seorsim. Misce. Inde retortæ loricatæ brevioris & latioris colli, cujus media pars remaneat vacua. Distilla igne graduato. Egredietur & in collo concrescet Butyrum, quod ibi prunâ admotâ liquabis, ut in recipiens decidat. Distillare perge donec vapores rubri exire incipiant: tùm Butyrum exime. Adapta alterum recipiens aquæ ad quartam partem repletum, ut Mercurius super abundans colligatur: juncturis non lutatis,

iterùm ad retortæ candeſcentiam diſtilla. Intra tres aut quatuor horas abſoluta erit operatio. Collo retortæ Cinnabarim Antimonii adhærentem invenies.

NOTA. Producta hujus proceſſûs rectificabis ſeorſim ſi opus ſit.

ARTICULUS SECUNDUS.

DE TINCTURIS ET ELIXIRIIS.

MEdicamentorum partes viribus præſtantiores à ſubſtantiâ inutili per Tincturam ſeparantur ac ſolvuntur. Quapropter TINCTURÆ ad extracta pertinere videntur, & à quibuſdam *Extracta liquida* improprie vocantur.

ELIXIRIA ſeu ENCHILOMATA non differunt ab Extractis liquidis.

CANON. I. Vide Canones pro Vinis & Cereviſiis parandis.

II. Vaſa circulatoria ampliſſima adhibe.

III. Digeſtionis tempore, crebro vas agita.

IV. Tincturas ſubſidentiâ depuratas filtra.

TINCTURA ABSINTHII.

℞. Summitatum floridarum Abſinthii majoris ſiccatarum . . . . *Uncias iiij.*
Aquæ vitæ . . . . *Pintam iß.*

Digere vaſe clauſo per aliquot dies. Cola cum expreſſione. Filtra. Serva ad uſum.

Simili modo parantur TINCTURÆ SCORDII,
RUTÆ,
SALVIÆ, &c.

TINCTURA BENZOINI COMPOSITA.

℞. Benzoïni optimi . . . . *Drachmas vj.*
Styracis Calamitæ . . . . *Unciam ß.*
Moſchi orientalis . . . . *Grana iij.*

Contunde leviter. Affunde,

Spiritûs Vini rectificati . . . . *Uncias x.*

Digere vaſe clauſo per duos treſve dies. Decanta, filtra, & ſerva in lagenis benè obturatis.

TINCTURA *vulgò dicta* BALSAMUM COMMENDATORIS.

℞. Radicis ſiccæ Angelicæ Bohemicæ minutim inciſæ . . . . *Unciam ß.*
Florum Hyperici ſiccorum . . . . . . *Unciam.*
Spiritûs Vini rectificati . . . . *Libras ij & Uncias iiij.*

Digere balneo arenæ, vaſe clauſo identidem agitando, ad perfectam tincturam. Cola cum expreſſione. Adde,

Myrrhæ, Olibani, } *ana* . . . . *Unciam ß.*

Digere ut ſupra, tum adde ſequentia contrita;

Styracis calamitæ . . . . *Uncias ij.*
Benzoïni amygdaloïdes . . . . *Uncias iij.*
Balſami tolutani . . . . *Unciam*
Aloës ſoccotrinæ . . . . *Unciam ß.*

Digere per quadraginta dies. Cola. Filtra. Serva ad uſum.

TINCTURA CEPHALICA, SENNERTI.

℞. Radicum Pæoniæ maris, Foliorum ſalviæ ſiccatorum, } *ana* . . . *Unciam.*
Florum ſiccatorum Lilii convallium, Stœchados arabicæ, Lavandulæ, Roſmarini, Seminum Aniſi, Pæoniæ, } *ana Drac. ij.*

Corticum exteriorum Citri ſiccatorum, }
Caryophyllorum, } *ana Drach. j.*
Cubebarum, }
Spicæ Nardi indicæ, }
Cardamomi minoris, } *ana* . . . . *Scrupulum.*
Macis, }

Omnibus contuſis ut artis eſt, affunde,

Spiritûs Vini rectificati . . . . *Libras ij.*

Digere vaſe clauſo per octo dies, ſæpè agitando. Torculari exprime. Filtra. Serva in lagenis optimè clauſis.

TINCTURA HELLEBORI NIGRI.

℞. Radicum Hellebori nigri . . . . *Uncias iiij.*
Coccinellæ . . . . *Drachmam ß.*

Contuſis, affunde,

Aquæ vitæ . . . . *Pintas ij.*

Digere per triduum. Cola. Filtra, & ſerva.

TINCTURA ANTI-HYSTERICA.

℞. Radicum ſiccatarum Bryoniæ . . . . . *Uncias ij.*
Baccarum Sambuci maturarum & moderato clibani calore ſiccatarum . . . *Unciam iß.*
Foliorum Artemiſiæ recenter in umbrâ ſiccatorum, }
Foliorum Dictamni cretici, }
Matricariæ, }
Nepetæ, }
Ocymi, } *ana* . . . *Unciam ß.*
Pulegii, }
Rutæ, }
Sabinæ, }
Seminum Leviſtici, }
Dauci ſylveſtris, }

Corticum exteriorum Aurantiorum ſiccatorum, . . . Unciam iß.
Myrrhæ electæ, Caſtorei, } ana . . . . Drachmas iij.
Croci . . . . Drachmam.

Omnia ritè conciſa & contuſa, digere vaſe clauſo, per aliquot dies in,

Spiritûs Vini rectificati . . . . Libris iiiß.

Cola cum expreſſione. Filtra & ſerva.

TINCTURA JALAPPÆ.

℞. Radicum reſinoſarum Jalappæ . . . . Uncias ij.
Ireos florentinæ, Cinnamomi acuti, ... } ana Drach. j.

Craſſiuſculè tere. Adde,

Aquæ vitæ . . . . Libram.

Digere vaſe clauſo per octo dies. Filtra & ſerva.

TINCTURA LACCÆ.

℞. Gummi Laccæ electæ . . . . Unciam.
Aluminis uſti . . . . Drachmam.
Spiritûs ardentis Cochleariæ . . . . . Uncias viij.

Digere balneo arenæ, vaſe clauſo, ad Tincturæ rubræ perfectionem. Decanta, filtra, & ſerva.

TINCTURA MARTIS APERIENS.

℞. Limaturæ Ferri . . . . Uncias vj.
Tartari albi pulverati . . . . Libram.

Mitte in ollam ferream capaciſſimam. Super affunde,

Aquæ pluvialis . . . . *Suffic. quantit.*

Fiat maſſa per viginti quatuor horas reponenda. Tùm adde,

Aquæ pluvialis . . . . *Pintas xij.*

Bulliant omnia per horam. Identidem agita, Aquam ferventem addendo, eo fine ut evaporatione, liquidi quantitas non imminuatur. Ebullitione factâ quieſcant. Supernatantem liquorem decanta. Filtra. Vapora ad Syrupi liquidioris conſiſtentiam. Adde,

Spiritûs Vini rectificati . . . . *Unciam.*

Serva ad uſum.

TINCTURA MARTIS CUM SUCCO POMORUM.

℞. Limaturæ Ferri . . . . *Libram.*
Succi Pomorum accidorum . . . . *Pintas iij.*

Procede ut ſupra.

LAUDANUM LIQUIDUM, SYDENHAMI.

℞. Opii ſelecti in taleolas ſecti . . . . *Uncias ij.*
Croci . . . . *Unciam.*
Cinnamomi pulverati,
Caryophyllorum pulveratorum, } *ana Drachmam.*
Vini Hiſpanici . . . . *Pintam.*

Digere balneo maris per aliquot dies, vaſe clauſo identidem agitando, cola, filtra, & ſerva.

TINCTURA MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ electæ contritæ . . . . *Uncias ij.*
Spiritûs Vini rectificati . . . . *Libram*

Digere balneo maris. Filtra & ſerva.

Eodem modo parantur TINCTURÆ { ALOES, SUCCINI, KINÆ-KINÆ, CASTOREI, CROCI, CINNAMOMI, &c.

NOTA. TINCTURA BALSAMI TOLUTANI ad Syrupum parandum, fit ex Balſami Tolutani *Unciis ij.* & Spiritûs Vini *Librâ ß.*

TINCTURA ſeu LIQUOR VISCERALIS.

℞. Corticum exteriorum recentium & inciſorum Aurantiorum, } *Unciam.*
Spiritûs Vini rectificati . . . . *Uncias vj.*

Digere. Cola cum expreſſione. Adde,

Extracti Chamædryos,
Abſinthii,
Menyanthes,
Tincturæ Martis aperientis, } *ana* . . . *Drachmas iij.*
Spiritûs Nitri dulcis . . . . *Uncias ij.*
Aquæ ſtillatitiæ corticum Citreorum . . *Uncias vj.*

Digere iterum. Filtra.

TINCTURA METALLORUM.

℞. Reguli Antimonii Martialis . . . . . . *Uncias iiij.*
Cupri puriſſimi *vulgò de Roſette,*
Stanni anglicani optimi, } *ana* . *Uncias ij.*

Igne violento fundantur. Fuſa effundantur in conum fuſorium. Tum,

℞. Reguli hujus in pulverem redacti . . . *Uncias ij.*
Nitri puri, ſicci & pulverati . . . . . *Uncias vj.*

Miſce exactè, & paulatim in crucibulum candens injice; detonatione peractâ, crucibulum tegulâ tege. Igne violentiſſimo liquefac & calcina. Materiam è cru-

cibulo

cibulo extractam & crassiusculè tritam, adhuc calentem mitte in matratium & illicò affunde,

Spiritûs Vini rectificatissimi . . . . . . *Libras ij.*

Digere donec Tinctura rubescat.

TINCTURA SALIS TARTARI.

℞. Salis Tartari . . . . *Uncias iiij.*

Fundantur in crucibulo. In mortarium ferreum calefactum effunde; illico indurescit; pulvera. Calens matratio inde. Statim affunde Spiritûs Vini *Libram.* Digere ad perfectam Tincturæ ruborem. Filtra & serva.

NOTA. LILIUM PARACELSI maximè accedit ad TINCTURAM SALIS TARTARI.

ELIXIR AMARUM.

℞. Radicis gentianæ . . . . *Uncias ij.*
Flavedinis Aurantiorum amarorum . . *Unciam.*
Coccinellæ . . . . *Drachmam.*
Spiritûs Vini . . . . *Libram iß.*

Digere per triduum. Filtra & serva.

ELIXIR PROPRIETATIS.

℞. Tincturarum Myrrhæ, Croci, Aloës, } *ana* . . . . . *Partes æquales.*

Misce, serva ad usum.

NOTA. Has Tincturas simul mixtas distilla & erit ELIXIR PROPRIETATIS ALBUM.

ELIXIR STOMACHICUM.

℞. Ligni Aloës, Santali rubri, } *ana* . . . . *Unciam ß.*
Radicum Liquiritiæ . . . . *Unciam.*
Cinnamomi . . . . *Uncias ij.*

Galangæ minoris, } ana . . . . Drachmam.
Caryophyllorum,
Zedoariæ,
Cardamomi minoris,

Seminum Anisi, } ana . . . . Drachmas ij.
Fœniculi,
Granorum Kermes,
Salis prunellæ,
Terræ Japonicæ,

Passularum mundatarum . . . . Uncias ij.
Dactylorum . . . . Numero x.
Florum Papaveris rhæados siccatorum, } ana Drach. ij.
Rosmarini,
Spiritûs Vini . . . . Libras iiij.

Digere per aliquot dies. Adde,

Sacchari albissimi . . . . Libram.

Filtra. Serva ad usum.

Elixir Vitrioli, A. Mynsicht.

℞. Galangæ minoris . . . . Unciam iß.
Calami aromatici . . . . Unciam.
Menthæ crispæ, } ana . . . . Unciam ß.
Salviæ,

Cinnamomi, } ana . . . . Drachmas iij.
Caryophyllorum,
Zinziberis,

Nucis Moschatæ, } ana . . . . Drachmas ij.
Cubebarum,

Corticum Citrei, } ana . . . . Drachmam.
Ligni Aloës,

Sacchari albi . . . . Uncias iij.
Spiritûs Vini rectificati . . . . Libras ij.

Digere per triduum lenissimo calore, balneo arenæ, tum instilla paulatim,

Olei Vitrioli . . . . Uncias iiß.

Digere rursùs per triduum, eodem modo. Filtra per infundibulum vitreum, & ſerva.

ARTICULUS TERTIUS.

DE SALIBUS.

SAL eſt corpus ſapidum, cryſtallinum, diaphanum & ſolubile. Triplicis eſt generis.

1.° SAL ACIDUM, ſine caliditatis ſenſu linguam pungit, dentes hebetat, cum Alkali effervefcit & Tincturæ Violarum aut *Tourneſol* (*Heliotropium tricoccum.* PIN. 253. *Croton tinctorium.* LIN. SP. 1425.) admixtum, rubrum colorem excitat.

2.° SAL ALKALI cum Acido effervefcit, linguam urinoſi ſaporis inficit & acri ac urenti ſtimulo vellicat; Tincturam Violarum vel *Tourneſol* viridem reddit.

3.° SAL NEUTRUM, ex Alkali & Acido combinatis ad ſaturationem, oritur. Iterum diſtinguntur,

SALIA ESSENTIALIA quæ odorem, ſaporem, vel alias proprietates corporum è quibus excerpta ſunt retinent.

SALIA FIXA, ſublimationis incapacia ſunt. Solutio Salis Alkalini fixi LIXIVIUM dicitur.

SALIA LIXIVIALIA, è cineribus eliciuntur.

SALIA VOLATILIA, in auras avolant.

PARAGRAPHUS PRIMUS.

SALIA ESSENTIALIA.

SAL ESSENTIALE ACETOSÆ.

℞. Succi Acetoſæ per ſubſidentiam depurati. *Quantum. vol.*

Vaporet ita ut tertia pars circiter remaneat. Cola per chartam bibulam. Fiat vaporatio ad pelliculam. In vas Vitreum immitte. In cellâ repone, ut concreſcant cryſtalli,

Aquâ purâ abluendæ & exſiccandæ. Vaporationem, Cryſtalliſationem, & ablutionem denuò inſtitue donec cryſtallos omnes exhauſeris.

Nota. I. Simili modo parantur Salia ex omnibus plantis acidis, auſteris, aſtringentibus & amarulentis pauco oleo donatis.

II. Non abſimili modo præparantur Salia eſſentialia ex ſuccis fructuum.

III. Herbæ ſicciores, inter contundendum pauxillo Aquæ irrorentur, vel ſufficienti quantitate Aquæ elixentur; viſcoſæ, igne leni emolliantur.

PARAGRAPHUS SECUNDUS.

SALIA FIXA ACIDA.

Gilla Theophrasti.

℞. Vitrioli albi pulverati . . . . *Quantum vol.*

Diſſolve in ſufficienti quantitate Aquæ puræ. Filtra. Evapora ad pelliculam, balneo arenæ, in vaſe vitreo. Repone ad cryſtalliſationem.

Vitrioli calcinatio.

℞. Vitrioli viridis . . . . *Quantum vol.*

Calcina in crucibulo. Maſſa evadet ex albo cineritia; erit Vitriolum ad albedinem calcinatum.

Igne intenſiori maſſam urge. Colorem induet rubrum; & erit Colcothar. Vide *Aqua fortis.*

Nota. Æſtivo tempore Vitriolum romanum æſtuantis Solis ardore calcina; erit Pulvis Sympathicus.

Vitiolum Martis.

℞. Limaturæ Martis . . . . *Libram.*
Aquæ communis . . . . *Pintas iij.*
Spiritûs Vitrioli . . . . *Libram iß.*

Digere igne arenæ in matratio vitreo amplo, per viginti quatuor horas, sæpius agitando. Decanta. Filtra. Vaporet ad pelliculam. Repone in cellâ. Concrescent crystalli. Has collige. Decantationem, filtrationem, evaporationem & crystallisationem repete donec crystallos omnes exhauseris; collectas siccè in lagenâ ritè obturatâ serva.

SAL MARTIS, RIVERII.

℞. Spiritûs Vini rectificati . . . . *Libram ß.*
Olei Vitrioli . . . . *Uncias iiij.*

Simul mixta, inde sartagini novæ ferreæ, asserva donec crystalli formentur, quas abrade & serva.

LAPIS INFERNALIS.

℞. Limaturæ Argenti purissimi . . . . . . *Partem unam.*
Spiritûs Nitri . . . . *Partes iij.*

Argentum in Spiritu Nitri dissolve. Balneo arenæ dissolutio vaporet ad medias. Tùm crucibulo capaci inde, iterum igne moderato vaporet, donec cessante ebullitione, materia Olei instar liquescat. In modiolum fusorium calefactum prius & Sebo illitum effunde. Concretam massam exime, & siccè in lagenâ apprimè obturatâ serva.

PARAGRAPHUS TERTIUS.

SALIA ALKALINA FIXA.

SAL TARTARI.

℞. Tartari crudi triti . . . . *Quantum vol.*

Corniculis chartaceis siccis include; tùm Aquâ madefiant. Stratifica cum carbonibus. Igne aperto calcina ad albedinem. Massam calcinatam Aquâ solve. Lixivium filtra. Vaporet ad siccitatem.

NOTA. Sal Tartari in loco humido repone, in liquorem liquescet, filtra, erit OLEUM TARTARI PER DELIQUIUM.

NITRUM TARTARO FIXATUM.

℞. Nitri puri, } ana . . . . *Partes æquales.*
Tartari crudi, }

Pulvera. Misce. Mitte in patellâm. Materiam prunâ accende. Detonatione factâ, massam in Aquâ calente solve. Filtra. Vaporet ad siccitatem.

NOTA. Nitrum Tartaro fixatum in loco humido repone, in liquorem liquescet. Filtra. Erit ALKAEST HELMONTII.

NITRUM CARBONIBUS FIXATUM.

℞. Nitri puri . . . . *Quantum vol.*

Liquefac in crucibulo capaci. Projice,

Carbonis pulverati . . . . *Cochlear j.*

Peractâ detonatione alterum cochlear projice. Repete, donec Nitrum nec fluat nec detonet. Calens è crucibulo exime. In Aquâ calente solve. Filtra. Vaporet ad siccitatem.

NOTA. Nitrum Carbonibus fixatum, in cellâ repositum, in liquorem vertitur, ALKAEST GLAUBERI vel LIQUOR NITRI FIXI nuncupatum.

SALIA ALKALINA VOLATILIA.

SAL VOLATILE AMMONIACUM.

℞. Salis Ammoniaci . . . . *Libram.*
Salis Tartari . . . . *Libras ij.*

Scorsim pulverata Misce. Inde retortæ. Affunde,

Spiritûs Vini rectificati . . . . *Uncias iiij.*

Receptaculum adapta. Commissuris obseratis stent simul per horas viginti quatuor. Balneo arenæ, igne primùm leni, postea aucto distilla. Distillatione absolutâ, vasis refrigeratis Sal volatile à Spiritu separatum servabis.

NOTA. Spiritus elicitus, SPIRITUS SALIS AMMONIACI VINOSUS ſeu DULCIFICATUS nominatur.

PARAGRAPHUS QUARTUS.

SALIA LIXIVIALIA.

SAL FIXUM LIXIVIALE PLANTARUM.

℞. Herbarum virentium & maturarum cum ſtipitibus . . . . *Quantum vol.*

Igne aperto combure in cineres. Calcina ad albedinem. Fiat Lixivium. Filtra. Vaporet ad ſiccitatem. In Aquâ purâ ſolve iterùm. Filtra, & vaporet ad ſiccitatem. Sal ſerva.

SAL PLANTARUM, TACHENII METHODO PARATUM.

℞. Plantæ cujuſlibet, recèns collectæ . . *Quantum vol.*

In cacabo ferreo combure; flammam, operculi ope impediendo, & maſſam virgâ ferreâ indeſinenter agitando. Cineres per unam alteramve horam calcina. Fiat Lixivium Aquâ fervente. Cola. Ad ſiccitatem vaporet. Siccè ſerva.

LAPIS CAUSTICUS.

℞. Cinerum clavellatorum . . . . *Libras ij.*
Calcis vivæ . . . . *Libram.*

Mitte in vas idoneum. Affunde paulatim,

Aquæ ferventis . . . . *Pintas xvj.*

Fiat Lixivium. Filtra. Vaporet ad ſiccitatem. Maſſam crucibulo inde. Calcina donec Olei inſtar fluat. In patinam calidam effunde. Lenteſcentem in fruſtula ſeca. Adhuc calentem in lagenis bene obturatis ſiccè ſerva.

PARAGRAPHUS QUINTUS.

SALIA NEUTRA.

SAL POLYCHRESTUM SOLUBILE.

℞. Cinerum Kali hiſpanici . . . . *Quantum vol.*

Fiat lixivium. Cola. Dùm ebullit, injice cochleatim,

Cremoris Tartari pulverati . . . . *Quant. ſuffic.*

Ad ſaturationem. Liquorem calidum filtra. Vaporet ad pelliculam. Ad cryſtalliſationem reponè.

TARTARUM SOLUBILE.

℞. Salis Tartari . . . . *Uncias vj.*
Aquæ communis calentis . . . . *Pintas iiiiß.*

Solve. Lixivio calenti adde,

Cremoris Tartari tenuiſſimè triti, *circiter Uncias xij.*

Scilicet ad punctum ſaturationis. Bulliant leviter. Cola. Vaporatio fiat ad ſiccitatem.

TARTARUM CHALYBEATUM.

℞. Tartari ſolubilis . . . . *Uncias iiij.*
Tincturæ Martis . . . . *Libram.*

Vaporent ſimul balneo arenæ, ad ſiccitatem. Serva ſiccè in lagenâ benè obturatâ.

NOTA. Difficilius deliqueſcit ſi cum Sale polychreſto ſolubili paretur.

TARTARUM EMETICUM.

℞. Vitri Antimonii ſubtiliter pulverati, } *ana Partes æqual.*
Cremoris Tartari pulverati, }

Mixta bulliant in vaſe fictili vitreato per ſemi horam, cum,

Aquæ

Aquæ puræ . . . . *Quant. ſuffic.*

Liquorem calentem filtra. Repone in cellâ. Concreſcent cryſtalli. Cryſtallos exime. Evaporationem & cryſtalliſationem repete donec Sal totum exhauſeris. Cryſtallos omnes miſce & leviga.

TARTARUM VITRIOLATUM.

℞. Olei Tartari per deliquium . . . . . . *Quantum vis.*

Inde vaſi vitreo. Affunde guttatim,

Spiritûs Vitrioli . . . . *Quant. ſufficit,*

Ad perfectam ſaturationem. Filtra. Vaporet ad pelliculam. Repone ad cryſtallos obtinendas.

TERRA FOLIATA TARTARI.

℞. Salis Tartati puriſſimi . . . . *Partem unam.*

Inde in cucurbitam vitream. Affunde per vices, & agitando,

Spiritûs Aceti acerrimi, *circiter* . . . . *Partes xvj.*

Scilicet, ad punctum ſaturationis. Filtra. Vaporet igne leni ad ſiccitatem. Salinam maſſam ſolve in,

Aquæ communis . . . . *Suffic. quantit.*

Filtra. Vaporet ad ſiccitatem. Solutionem & evaporationem repete donec materia ſuperſit ſicca & foliacea. Serva in vaſe optime clauſo.

SAL PRUNELLÆ.

℞. Nitri puri . . . . *Uncias iiij.*

Mitte in crucibulum igni impoſitum. Nitro liquefacto injice per vices,

Florum Sulphuris . . . . *Drachmam ß.*

Peractâ deflagratione, crucibulo parùm refrigerato, Nitrum in pelvim ſiccam & calefactam effunde & continuò undequaque verſa ut expandatur. Exemptum ſerva.

SAL MIRABILE, GLAUBERI.

℞. Salis marini decrepitati . . . . *Uncias viij.*

Mitte in crucibulum. Senſim affunde ſub camino,

Olei Vitrioli . . . . *Uncias vj.*

Vaporibus albis ceſſantibus, materiam è crucibulo exime. In Aquâ calidâ ſolve. Filtra. Vaporet. Cryſtalli quiete concreſcant.

SAL SEDATIVUM, HOMBERGII.

℞. Boracis depuratæ . . . . *Uncias iiij.*

Solve in Aquæ communis ferventis *ſufficienti quantitate.* Filtra. Affunde per vices ſaltem ad perfectam ſaturationem,

Olei Vitrioli concentrati, *circiter* . . . *Unciam iß.*

Effervescentiâ pacatâ, ſine cryſtallos concreſcere. Sal exemptum Aquâ frigidâ ablue. Supra chartam bibulam ſicca & ſerva.

NOTA. Sal ſedativum paratur quoquè per ſublimationem longiori proceſſu; ſed utriuſque eadem eſt virtus.

LAPIS OPHTHALMICUS.

℞. Vitrioli cærulei, }
Nitri, } *ana* . . . . *Uncias vj.*
Aluminis rupei, }

Pulvera. Miſce. Crucibulo inde. Liquefac balneo arenæ. Liquefactis adde,

Camphoræ pulveratæ . . . . *Drachmas ij.*

Miſce. Maſſam refrigeratam ſerva.

LAPIS MEDICAMENTOSUS.

℞. Aluminis, }
Lithargyri, } *ana* . . . . *Libram iß.*
Boli Armenæ, }

Colcotharis . . . . *Uncias iij.*

Omnibus pulveratis, fiat maſſa cum ſufficienti quantitate Aceti. Maſſam exſicca igne aperto ſæpius agitando ſpathulâ ligneâ.

SAL SATURNI.

℞. Ceruſſæ pulveratæ . . . . *Quantum vol.*

Inde vaſi vitreo. Affunde,

Acetum diſtillatum,

Ad eminentiam quatuor digitorum. Effervescentiâ peractâ, digere balneo arenæ per tres dies, identidem agitando. Liquorem decanta. Superſtiti materiæ novum Acetum affunde. Digere & decanta ut ſuprà. Liquores omnes decantati & mixti vaporent lento igne ad pelliculam. Repone in loco frigido. Cryſtalli concreſcent. Per evaporationem & cryſtalliſationem repetitam, cryſtallos omnes ſine formari. Sicca & ſerva.

NOTA. Liquor primò decantatus eſt ACETUM SATURNI.

ARTICULUS QUARTUS.

DE SAPONIBUS.

SAPO ALBUS.

℞. Calcis vivæ fruſtulatim effractæ . . . . *Libras v.*
Cinerum Kali hiſpanici pulveratorum *Libras x.*

Bulliant in vaſe ferreo, cum,

Aquæ communis . . . . *Suffic. quantit.*

Coletur lixivium. Vaporet donec ponderando, menſura continens Aquæ communis Drachmas octo, contineat hujus lixivii concentrati Drachmas undecim. Tùm repone ad ſubſidentiam in vaſe vitreo clauſo.

℞. Hujus Lixivii . . . . *Partem j.*
Olei Amygdalarum dulcium . . . . *Partes ij.*

Misce in vase figulino vitreato. Sæpius spathulâ ligneâ donec materia spissescat agita, post aliquot dies in Saponem coalescet.

ARTICULUS QUINTUS.

DE CROCIS.

Crocus Martis aperiens rore maiali paratus.

℞. Limaturæ Ferri . . . . *Quant. vol.*

Rori maiali expone vel Aquâ pluviali irrora, donec in rubiginem facessat. Super porphyritem leviga.

Crocus Martis cum Sulphure paratus.

℞. Limaturæ Martis, } *ana* . . . . *Quantum vol.*
Florum Sulphuris, }
Aquæ fontanæ . . . . *Quant. suffic.*

Ut fiat pasta. Stet in fermentatione per quinque horas. Igne acerrimo calcina, sæpius spathâ ferreâ movendo, donec colorem purpureum acquisierit. Leviga & serva ad usum.

Crocus Martis astringens.

℞. Limaturæ Ferri . . . . *Quantum vis.*

In ollâ terreâ igne reverberii continuo per plures horas calcina, donec in pulverem rubicundum abierit. Aquâ multoties ablue. Exsicca. Leviga, & serva ad usum.

Globuli martiales.

℞. Limaturæ Ferri . . . . *Partem j.*
Tartari crudi albi pulverati . . . . *Partes ij.*

Misce. Cucurbitæ inde. Affunde Aquæ vitæ ad eminentiam digiti. Radiis solaribus vel balneo maris digere ad siccitatem. Massæ exsiccatæ & pulveratæ Aquæ vitæ eandem quantitatem affunde. Digere ut supra. Toties id repete donec massa exsiccata, quasi resinosa appareat. Tum globulos ad ovi magnitudinem efforma.

APPENDIX.

ÆRUGO.

℞. Laminas Cupri . . . . *Quot volueris.*

Stratifica cum vinaceis Vino madidis, in cellâ repone donec Ærugine efflorescant, quam abrade & serva.

CERUSSA.

℞. Plumbi in laminas tenues redacti . . . . *Quantum vol.*

Læmellæ suspensæ bullientis Aceti vapores excipiant. Vase obturato digere donec pulvis albus laminarum superficiei adhæreat. Pulverem à lamellis abrade & serva.

ARTICULUS SEXTUS.

DE SULPHUREIS.

KERMES MINERALE.

℞. Antimonii hungarici in frustula effracti. *Libras iiij.*

Ollæ satis amplæ inde. Super affunde,

Alkaest Glauberi . . . . *Libram.*
Aquæ pluviæ . . . . *Pintas viij.*

Per duas horas bulliant. Duas tertias liquoris bullientis partes per chartas bibulas filtra. Adde, in ollâ,

Aquæ pluviæ bullientis . . . . *Pintas v.*
Alkaeſt Glauberi . . . . *Uncias xij.*

Bulliant ut ſupra & duas tertias partes bullientes filtra. Tandem tertiæ parti ſuperſtiti adde,

Alkaeſt Glauberi . . . . *Uncias viij.*
Aquæ pluviæ ferventis . . . . *Pintas v.*

Bulliant ut ſupra. Liquorem bullientem filtra & cum aliis liquoribus repone. Subſidebit pulvis rubicundus; hunc pulverem rubicundum ſuper chartas bibulas edulcora Aquâ purâ. Sicca & ſerva ad uſum.

ÆTHIOPS MINERALIS.

℞. Mercurii puri . . . . *Unciam.*
Florum Sulphuris . . . . *Unciam iſſ.*

In mortario vitreo tere, piſtillo quoque vitreo, donec mercurius ſit extinctus & pulvis intenſe nigreſcat. Serva ad uſum.

ÆTHIOPS ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi præparati . . . . *Uncias ij.*
Mercurii puri . . . . *Unciam.*

Tere in mortario vitreo donec Mercurius ſit extinctus.

HEPAR SULPHURIS.

℞. Florum Sulphuris . . . . *Uncias vj.*
Salis Tartari . . . . *Uncias ij.*

Pulvera. Miſce. In patellâ terreâ vitreatâ funde. Materiam ubi colorem ſpadiceum induerit, effunde, & maſſam refrigeratam ſerva.

ARTICULUS SEPTIMUS.

DE MAGISTERIIS ſeu *PRÆCIPITATIS.*

LAC ET MAGISTERIUM SULPHURIS.

℞. Hepatis Sulphuris . . . . *Uncias iiij.*
Aquæ communis . . . . *Pintas vij.*

Bulliant ad Sulphuris perfectam ſolutionem. Filtra. Acetum diſtillatum affunde. Liquorem LAC SULPHURIS dictum poſt debitam quietem decanta. Pulverem præcipitatum ſeu MAGISTERIUM pluries Aquâ ablue, ſicca in umbrâ & ſerva.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

℞. Mercurii ſublimati corroſivi . . . . *Quantum vis.*

In ſufficienti quantitate Aquæ calidæ ſolve. Affunde guttatim Spiritus Salis Ammoniaci donec præcipitatio ſit abſoluta. Filtra. Aquâ calidâ pluries ablue. Sicca & ſerva.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

℞. Aquæ Mercurii cauſticæ . . . . *Quantum vis.*

Lento igne vaporet ad ſiccitatem. In crucibulo materiam calcina ad rubedinem intenſam. Exime & ſerva.

NOTA. Hæc operatio impropriè dicitur Præcipitatio.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS FLAVUS.

℞. Mercurii è Cinnabari redivivi, } *ana* . . *Uncias ij.*
Olei Vitrioli rectificati, }

Mercurium mitte in matratium amplioris colli. Affunde Oleum Vitrioli. Balneo arenæ digere ad diſſolutionem perfectam. Ignem auge ad ſiccitatem. Materiam exime. Tere in mortario vitreo. Conjice in Aquam

calentem. Præcipitatum pulverem flavum Aquæ lotionibus repetitis edulcora, ſicca & ſerva.

RESINA JALAPPÆ.

℞. Jalappæ optimæ reſinoſæ contuſæ . . . *Libram.*
Spiritûs Vini rectificati . . . . *Libras iij.*

Digere balneo arenæ ut tinctura extrahatur. Filtra. Superſtiti materiæ novam Spiritûs Vini quantitatem affunde. Tincturam filtra. Repete donec Tincturæ amplius extrahi nequeant. Tincturas omnes miſce. Vaporent ad medias. Reſiduo affunde Aquæ frigidæ quantum ſufficit ut præcipitetur Reſina. Liquorem decanta. Magiſterium Aquâ ablue multoties. Exſicca, & ſerva.

Simili modo parantur RESINÆ { GUAJACI, SCAMMONII, &c.

ARTICULUS OCTAVUS.

DE REGULIS.

REGULUS ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi. . . . . *Libram.*
Tartari crudi . . . . *Uncias xij.*
Nitri puri . . . . *Uncias vj.*

Seorſim pulverata, miſce. In crucibulum candens cochleatim injice; ſingulis vicibus detonent cooperto crucibulo. Detonatione peractâ, auge ignem donec fluida ſit materia. Hanc fluentem in conum fuſorium calefactum & Sebo illitum effunde: antequam ſolideſcat materia conum concute ut Regulus præcipitetur. Materiam refrigeratam exime, & Regulum ictu mallei à ſcoriis ſepara.

REGULUS ANTIMONII MARTIALIS.

℞. Apicum clavorum ferreorum . . . . . *Uncias viij.*
Antimonii hungarici pulverati . . . . . *Libram.*

Clavis

Clavis candefactis in crucibulo, Antimonium adde. Antimonio liquato cum clavis, per vices injice,

Nitri . . . . *Uncias iij.*

Ad fusionem perficiendam. In conum fusorium, Sebo illitum & calefactum, materiam effunde: inter refrigerationem conum concute. Regulum à scoriis ictu mallei separa. Separatum tere. Liquefac in crucibulo cum,

Antimonii pulverati . . . . *Unciis ij.*

Injice per vices,

Nitri . . . . *Uncias iij.*

In conum fusorium effunde. Dùm refrigescit conum concute. Regulum à scoriis ut supra separa. Semel & iterum Reguli fusionem repete Nitro solo addito.

ARTICULUS NONUS.

DE TERRIS, CALCIBUS ET CALCIFORMIBUS.

CALX JOVIS.

℞. Stanni . . . . *Quantum vis.*

Liquefac in vase fictili plano non vitreato. Assiduè agita spathulâ ferreâ, donec in Calcem abeat.

PLUMBUM USTUM.

℞. Laminarum Plumbi, }
Sulphuris pulverati, } *ana* . . . . . . *Quantum vis.*

Stratifica in crucibulo, ita ut primum & ultimum stratum sit Sulphuris. Materiam prunâ accende, donec Sulphur totum consumptum sit.

MINIUM.

℞. Plumbi . . . . *Quantum vis.*

Liquefac in vase fictili plano non vitreato. Agita spathulâ

ferreâ donec abeat in pulverem primò ſubnigrum, dein flavum, tandem ruberrimum, cavendo ne vehementiori igne in maſſam vitream abeat.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM NITRATUM.

℞. Antimonii electi pulverati . . . . *Partem j.*
Nitri puri . . . . *Partes iij.*

Seorſim pulverata & commixta, cochleatim in crucibulum candens injice. Peractâ detonatione, materiam albam adhuc calentem aufer & ſerva.

NOTA. I. Hoc Antimonium Aquâ calidâ edulcora & ſicca, erit ANTIMONIUM DIAPHORETICUM LOTUM: uſitatius.

NOTA. II. Loturas omnes commiſce & filtra. Leni igne vaporent ad pelliculam, in frigore præbebunt NITRUM STIBIATUM.

ANTIHECTICUM, POTERII.

℞. Reguli Antimonii martialis, } *ana* . . . *Unciam.*
Stanni anglicani, }

Liquefac ſimul in crucibulo. Refrigerata tere in pulverem. Adde,

Nitri puriſſimi pulverati . . . . *Uncias vj.*

Simul mixta cochleatim injice in crucibulum candens. Peractâ detonatione ignem materiam ex cinereo albeſcentem in Aquam calentem projice. Edulcora, exſicca & ſerva.

BEZOARDICUM MINERALE.

℞. Butyri Antimonii rectificati . . . . . . *Uncias ij.*

Affunde guttatim, à vaporibus cavendo,

Spiritûs Nitri optimi circiter . . . . . *Uncias vj.*

Donec ceſſet efferveſcentia. Diſtilla ad ſiccitatem: igne lento maſſam albam ſuperſtitem calcina. Aquâ ablue multoties, ſicca & ſerva.

Nota. Liquor in diſtillatione elicitus eſt Spiritus Nitri bezoardicus.

Magnesia alba.

℞. Aquæ matris Nitri . . . . *Quantum vis.*

Vaporet ad ſiccitatem. Materiam ſuperſtitem calcina. In pulverem redige. Aquâ tepidâ edulcora. Exſicca & ſerva.

APPENDIX.

Aqua Calcis prima.

℞. Calcis vivæ . . . . *Libram.*

In vaſe idoneo loca. Senſim affunde,

Aquæ communis . . . . *Pintas x.*

Calce ritè extinctâ, miſturam conturba. Sine reſidere. Cola.

Aqua Calcis secunda.

Magmati Aquæ Calcis primæ affunde,

Aquæ communis . . . . *Pintas vj.*

Miſce. Sine reſidere per viginti quatuor horas. Filtra.

Aqua phagedænica.

℞. Aquæ Calcis primæ recentis, } *ana* . . *Pintam ß.*
Spiritûs Vini, }
Sublimati corroſivi . . . . *Grana xxx.*

Miſce in mortario vitreo. Serva ad uſum.

ARTICULUS DECIMUS.

DE VITRIS.

VITRUM ANTIMONII.

℞. Antimonii pulverati . . . . *Libram.*

In ollâ fictili planâ non vitreatâ, igne leni in cinereum pulverem calcina, ſpathâ indeſinenter movendo donec nullos fumos edat. Pulverem hunc in crucibulum immitte: liquefac igne vehementi. Fuſam materiam ſupra patinam æneam effunde. Concreſcet in Vitrum hyacinthinum ſi proſperè ſucceſſerit operatio.

APPENDIX.

HEPAR ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi pulverati, } *ana* . . . . *Partes æquales.*
Nitri pulverati, }

Miſce in mortario ferreo, latere cooperto. Prunâ accende: fiet detonatio, flammam coerce operculi ope. Materiâ refrigeratâ, Hepar à ſcoriis ſepara.

CROCUS METALLORUM.

℞. Hepatis Antimonii tenuiſſime triti . . *Quantum vol.*

Aquâ calente edulcora. Sicca & ſerva.

FINIS.

INDEX SIGNORUM CHYMICORUM.

INDEX RERUM ET VERBORUM.

A.

B.

Ceratum

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

Polytrichum,

S.

U.

W.

X.

Z.

FINIS.

ERRATA.

Pag. 6, *Lin.* 2, *Col.* 2, Citrulus, *lege* Citrullus.
—— 24, —— 15, Kempf. *lege* Kæmpf.
—— 24, —— 23-28, Attriplex, *lege* Atriplex.
—— 31, —— 8, *idem.*
—— 32, —— 9, differt, *lege* non differt.
—— 34, —— 27, Amen. *lege* Amœn.
—— 37, —— 14, Hemorhoïdalis, *lege* Hæmorrhoïdalis.
—— 37, —— 25, Xerantemos, *lege* Xeranthemos.
—— 71, —— 9, *le Giroflier*, lege *la Giroflée.*
—— 83, —— 24, *Myrthe*, lege *Myrte.*
—— 83, —— 24-28, Myrthus, *lege* Myrtus.
—— 87, —— 31 & 32, Oriza, *lege* Oryza.
—— 103, —— 23, Satiryum, *lege* Satyrium.
—— 176, —— 15, insusionem, *lege* infusionem.
—— 217, —— 7, trajiciendos, *lege* trajiciendo.
—— 264, —— 28, gutas, *lege* guttas.
—— 284, —— 25, Aqua fortis, *lege* Spiritus & Oleum Vitrioli.
—— 190, —— 22, *Pintas ij*, lege *Pintas iiij.*